Autori di Wikipedia

BASI DI RADIOLOGIA



Wikipedia

Prefazione

Anni fa era possibile creare dei libri in formato PDF utilizzando una funzione specifica del software MediaWiki che ormai da parecchio è disabilitata. Questa funzione a mio parere era molto comoda perché permetteva di creare dei manuali che gli utenti potevano direttamente comparare con i testi reperibili in libreria e che potevano anche essere consultati e scaricati GRATUITAMENTE. Un uso interessante dei PDF creati in questa maniera poteva essere ad esempio la pubblicazione di libri di testo per le scuole completamente gratuiti, ove per ovvie ragioni non è possibile utilizzare un cellulare o un tablet connesso ad internet durante le lezioni. In questo modo con pochissimi sforzi si potrebbero far risparmiare centinaia di euro a famiglia!...motivo per cui io e molti altri utenti dell'enciclopedia da anni ci battiamo perché questa caratteristica venga riattivata, senza successo!

Allo stato attuale l'unico modo disponibile per creare i libri in PDF di Wikipedia è acquistarli online stampati tramite il servizio PediaPress...ed in tutta sincerità non sono così contento che una società privata ed a scopo di lucro sia l'unica che attualmente possieda questo algoritmo e non lo condivida con il resto della comunità che giornalmente contribuisce scrivendo ed aggiornando le voci! (vengono concessi solo alcuni spiccioli per ogni copia ordinata alla Wikimedia Foundation...) Un altro fatto a mio parere grave è l'impossibilità di esportare facilmente Wikipedia in formato HTML in modo che possa essere clonata o utilizzata anche su siti diversi e senza ricorrere a software appositi (sto da tempo pianificando di portare Wikipedia dentro ZeroNet in modo che sia possibile raggiungerla facilmente anche dove è censurata o la connessione non è sempre disponibile).

Ho creato questo "libro" semplicemente esportando le singole voci (molte scritte anche da me) in formato PDF ed unendole fra di loro con un software; così facendo non è sempre stato possibile ottenere una buona impaginazione, ma spero che questo "esperimento" abbia successo e possa portare la comunità ad apprezzare questi libri ed a richiederne con più forza la riattivazione gratuita per tutti!

Questo testo è tratto da Wikipedia, per cui è pubblicato nei termini della sua stessa licenza, la Creative Commons Attribuzione – Condividi allo Stesso Modo V 4.0. L'elenco completo degli autori delle singole voci è consultabile direttamente da Wikipedia (i singoli PDF sono stati creati in data 28/3/2022).

Galati Antonello

WIKIPEDIA

Radiologia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia medica** è la branca della medicina che si occupa della produzione e dell'interpretazione a fini diagnostici o terapeutici di immagini radiologiche. È detta anche **radiologia diagnostica** o **radiodiagnostica**. Questi termini sono di fatto equivalenti e derivano dal principio base per l'ottenimento delle immagini radiologiche, ovvero l'utilizzo di radiazioni ionizzanti.



Radiografia di un soggetto che ha inalato antrace



Riproduci file multimediale

Dr. Macintyre's X-Ray Film (1896)

Indice

Descrizione
Le tecniche radiodiagnostiche
Storia
Terapia
Informatizzazione
Radiologia pediatrica
Radiologia domiciliare
Note
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni

Descrizione



Visto che esse non sono l'unica forma di energia utilizzabile per ottenere immagini diagnostiche, attualmente si predilige il termine diagnostica per immagini, sottolineando come la radiologia medica debba essere inquadrata in realtà nel campo più ampio delle scienze per immagini. Quest'ultimo si avvale infatti di tutte le tecniche oggi a disposizione per la produzione di immagini mediche a scopo diagnostico, differenziate a seconda del principio fisico che permette di ottenerle. In questo senso si distinguono oltre alla radiologia (che impiega raggi X producendo immagini radiografiche e immagini TC) anche l'ecografia (che utilizza ultrasuoni) e la risonanza magnetica (che fa uso del fenomeno fisico della risonanza dei nuclei atomici).

La PET (tomografia ad emissione di positroni) e la scintigrafia fanno capo, invece, alla medicina nucleare, impiegando isotopi radioattivi, anziché radiazioni ionizzanti, allo scopo di produrre immagini; lo specialista in questo ultimo campo è il medico nucleare.

La branca della medicina che si occupa della produzione e utilizzo di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico è, infine, detta radioterapia. Essa sfrutta il principio secondo il quale alcuni tipi di radiazioni ionizzanti, a determinati dosaggi, risultano citotossiche per i tessuti biologici umani (patologici e fisiologici).

La radiologia ha subito negli ultimi cinquanta anni uno sviluppo travolgente in ambito diagnostico e terapeutico ed occupa oggi un ruolo fondamentale ed imprescindibile nella diagnosi e nel trattamento di un numero sempre maggiore di patologie umane.

Il medico radiologo clinico (sei anni di percorso accademico con laurea magistrale in medicina e chirurgia più quattro o cinque anni di formazione specialistica in radiologia diagnostica e interventistica) è uno specialista che, grazie alle capacità clinico-radiologiche acquisite e sfruttando le metodologie diagnostiche tecnologicamente avanzate si occupa, in collaborazione con gli altri specialisti medici, della gestione diagnostica e terapeutica del paziente.

Il tecnico sanitario di radiologia medica (tre anni di percorso formativo con laurea triennale appartenente alla classe delle lauree sanitarie) collabora con il medico radiologo nello svolgimento tecnico-pratico degli esami diagnostici, occupandosi in particolare della produzione delle immagini biomediche che verranno in seguito elaborate e interpretate dal medico radiologo, con formulazione finale da parte di quest'ultimo di una dettagliata relazione scritta (referto radiologico).

Le tecniche radiodiagnostiche

La radiologia sfrutta essenzialmente i raggi X per la produzione di immagini mediche, ma non solo. Le principali tecniche, come in precedenza accennato sono le seguenti:

- Radiografia convenzionale
- Ecografia
- Tomografia computerizzata (TC), già detta Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
- Angiografia
- Imaging a risonanza magnetica (RM)
- Radiografia con tecnica a basso dosaggio di radiazioni (EOS)

L'ecografia e la risonanza magnetica non necessitano di radiazioni ionizzanti. Appartengono in ogni caso a pieno titolo al corpus radiologico; in particolare, per la risonanza magnetica la complessità di tale tecnica rende il medico radiologo meglio preparato rispetto ad altre figure professionali, essendo la specializzazione in radiologia diagnostica e interventistica l'unica scuola a prevedere la formazione per l'imaging a risonanza magnetica.

In realtà, la figura del medico radiologo risulta centrale e necessaria non solo per la corretta esecuzione ed interpretazione delle immagini mediche, ma anche da un punto di vista squisitamente medico-legale, in quanto le tecniche che prevedono l'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico sono utilizzabili per legge solo e unicamente da questa figura professionale.

Inoltre, il medico radiologo è l'unico medico in grado di prospettare correttamente l'impiego di una, piuttosto che di un'altra tecnica di diagnostica per immagini, al fine di rispondere in maniera ottimale al quesito posto dal medico clinico; oltre a ciò, egli è l'unico in grado di effettuare un bilancio della dose di radiazione erogata al paziente e mettere in atto tutte le tecniche disponibili al fine di ridurla al minimo, riducendo i rischi di cancerogenesi radio-indotta.

Infine, ma non per ultimo, il medico radiologo, proprio in virtù della conoscenza della maggior parte delle tecniche di diagnostica per immagini, risulta l'unico in grado di operare una sintesi, integrando le informazioni derivanti da ciascuna di esse.

Storia

Storicamente nasce qualche anno dopo la scoperta dei raggi X da parte di Wilhelm Conrad Röntgen, avvenuta nel 1895. Nel 1896 Antoine Henri Becquerel scopre la radioattività naturale dell'uranio. Nel 1898 Marie e Pierre Curie scoprono la radioattività del polonio e del radio.

Nel 1899 venne aperto il primo laboratorio italiano, ad opera di Emilio Tiraboschi.

Wilhelm Conrad Röntgen

Becquerel in laboratorio

Marie e Pierre Curie

Tubo di Crookes

Apparecchio radiologico del 1918

Esecuzione di una radioscopia nel 1910: non veniva presa nessuna misura radioprotezionistica.

Fino alla seconda metà del XX secolo, la radiologia restava l'unico metodo di esplorazione indiretto dell'interno del paziente; sul finire del Novecento vennero inventate ed assorbite nella branca radiologica altre tecniche di esplorazione non basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Per questo motivo, pur restando il nome "radiologia" come indicativo delle indagini interne, oggi, talvolta, si preferisce la terminologia *diagnostica per immagini*.

Le immagini da raggi X sono ottenute generando, appunto, un potente fascio di raggi X per mezzo di un tubo radiogeno e facendolo passare attraverso il corpo del paziente. Tali raggi possono essere assorbiti dai tessuti del paziente, deviati dagli urti con gli atomi del corpo, oppure passare indisturbati e le frazioni in gioco dipendono dall'energia dei raggi utilizzati e dal tipo di tessuto irradiato.

Il fascio uscente dal paziente deve essere reso visibile; per questo motivo, nella prima metà del Novecento venivano usati opportuni strati di fosfori su vetro (fluoroscopia): i raggi X colpivano lo strato, che emetteva luce, ed il radiologo, di fronte al paziente (ed al fascio di radiazione), osservava quanto visibile sul vetro.

Questa geometria, date le quasi nulle protezioni dalle radiazioni, generò molti casi di morte tra i radiologi.

La situazione migliorò notevolmente con l'uso di film fotografici messi a contatto con il paziente, all'interno di speciali contenitori che nascondevano il film alla luce. Impressionati dai raggi X, tali film (lastre) venivano poi sviluppati, tramite un procedimento fotografico; questo permetteva al radiologo di osservare con calma la radiografia, senza problemi di radiazione, su uno schermo illuminato in modo uniforme (negativoscopio o diafanoscopio).

Nella seconda metà del Novecento vennero introdotti schermi al tungstato di calcio da parte della francese DuPont, in grado di convertire i raggi X in luce: se posti a contatto con il film, dopo lo sviluppo, si aveva una radiografia, che da un lato era un po' meno definita nei dettagli, ma che in compenso permetteva di avere un'immagine con una dose di radiazioni ridotta almeno di un fattore 10, con riduzione del rischio per il paziente. Il film poteva anche essere sensibile su entrambe le facce, ciascuna a contatto con un schermo di rinforzo, in modo da ridurre ulteriormente la dose. La situazione è migliorata negli anni sessanta, con l'introduzione di schermi alle "terre rare" (ossisolfuro di gadolinio) da parte dell'italiana Ferrania Technologies: l'efficienza aumentò e in corrispondenza la dose per esame fornita al paziente diminuì ulteriormente.

Ulteriori perfezionamenti riguardarono sia il film (aumento della qualità dell'immagine, sviluppo a tempi ridotti) che gli schermi di rinforzo (aumento dell'efficienza), portando questi sistemi vicini al limite tecnologico.

Negli anni trenta il radiologo italiano Alessandro Vallebona ha proposto una metodica per rappresentare un solo strato del corpo sulla pellicola radiografica: questo esame porta il nome di stratigrafia. Sfruttando principi di geometria proiettiva, con la pendolazione del tubo radiogeno, tutti i piani al di sopra e al di sotto dello strato di interesse vengono eliminati. La stratigrafia ha rappresentato fino alla metà degli anni ottanta uno dei pilastri della diagnostica radiologica, ma grazie all'avvento del calcolatore è stata progressivamente soppiantata.

Nel 1947 Arturo Gilardoni immette sul mercato la **Ortogil** (di cui è presente un esemplare al Museo di Storia della Medicina del Salento[1]), una delle prime apparecchiature mobili di diagnostica per immagini[2].

Terapia

Oltre ad occuparsi del fondamentale momento diagnostico, la radiologia permette di effettuare anche interventi terapeutici. La radiologia interventistica garantisce oggigiorno procedure mini invasive sicure ed efficaci che affiancano e in diversi casi possono sostituire gli analoghi interventi di chirurgia tradizionale.

Informatizzazione

Per la quantità di dati da gestire, la radiologia è stata storicamente fra i primi servizi ospedalieri a dotarsi di sistemi informatici:

- per la gestione dei dati dei pazienti (RIS)
- per la gestione delle immagini (PACS)

Radiologia pediatrica

La radiologia pediatrica è la branca della radiologia che si occupa della diagnostica per immagini in ambito pediatrico: tale specialità nasce dall'esigenza che l'indagine radiologica nei bambini venga condotta con criteri diversi da quella degli adulti, sia per differenze morfologiche e anatomo-radiologiche sia per evidenti problemi di tipo protezionistico.

Radiologia domiciliare

La radiologia domiciliare è la branca della radiologia che si occupa della realizzazione di esami radiologici al domicilio del paziente; si tratta di un servizio complementare a quello di radiologia tradizionale, a causa delle limitazioni tecnologiche delle apparecchiature che possono essere portate al domicilio del paziente.

Note

1. **^** *Da Terni a Gallipoli per donare una Ortogil per "raggi X" del '47 – Salentolive24 in diretta dal Salento*, su *salentolive24.com*. URL consultato il 15 maggio 2019.
2. **^** *Raggi X per il medicale: una "Ortogil" del '47 al museo di Storia della Medicina del Salento*, su *Gilardoni*, 25 ottobre 2018. URL consultato il 15 maggio 2019.

Voci correlate

- Società italiana di radiologia medica
- Study Instance UID
- Radioprotezione
- Sala radiologica
- Tecnico sanitario di radiologia medica

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**radiologia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **radiologia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radiology?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Radiologia*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 4535 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=4535) · LCCN (EN) sh85110774 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85110774) · GND (DE) 4048213-3 (https://d-nb.info/gnd/4048213-3) · BNF (FR) cb11975713s (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975713s) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11975713s) · J9U (EN, HE) 987007558488305171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007558488305171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007558488305171) · NDL (EN, JA) 00563530 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00563530)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia&oldid=125234085"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 22 gen 2022 alle 21:57.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

METODICHE RADIOLOGICHE

Radiografia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

> **Questa voce o sezione sull'argomento ingegneria non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti**.

La **radiografia** è una tecnica di che fa uso di radiazioni ionizzanti per avere una visuale interna di un oggetto. Il termine può anche essere attribuito all'immagine ottenuta che più propriamente è detta **radiogramma**. La scienza relativa è detta radiologia.

Tale tecnica si basa sull'interazione tra un fascio di raggi X diretti da una sorgente a un recettore, e la materia interposta. Gli atomi di tale corpo interferente impediscono, in percentuale dipendente dal loro numero atomico, ad alcuni fotoni di raggiungere il recettore, che quindi riprodurrà un'immagine fedele del corpo "in negativo", essendo impressi sulla pellicola i fotoni che invece non vengono assorbiti.

Il principale utilizzo della radiografia è in campo medico come strumento diagnostico, ma trova applicazioni anche in ambito industriale, per esempio nei controlli non distruttivi dei materiali.

Radiografia di un cranio umano in laterale.

Indice

- **Storia**
- **Campi di utilizzo**
  - Diagnostica medica
    - Tecnica
    - Proiezioni radiologiche
  - Ambito industriale
  - Opere d'arte
- **Effetti sulla salute**
- **Note**
- **Bibliografia**
- **Voci correlate**
- **Altri progetti**
- **Collegamenti esterni**

Storia



Prime radiografie di prova su oggetti metallici, 1896.

La radiografia è nata nel 1895 con la scoperta dei raggi X, da parte del fisico Wilhelm Conrad Röntgen che descrisse per primo le loro proprietà. Questi raggi precedentemente sconosciuti (da qui l'X del nome) sono un tipo di radiazione elettromagnetica.

Non passò molto tempo dalla loro scoperta che i raggi X vennero utilizzati per una varietà di applicazioni: da un sistema per aiutarsi ad adattare le scarpe alla propria misura fino agli utilizzi medico-diagnostici. La prima radiografia effettuata per un intervento chirurgico venne realizzata soltanto un anno dopo la scoperta dei raggi, a Birmingham, dal maggiore John Hall-Edwards, vero pioniere della tecnica.

Durante la prima guerra mondiale, Marie Curie sostenne l'uso delle unità mobili di radiografia come mezzo di diagnosi per i soldati feriti. Inizialmente molte figure professionali furono incaricate di eseguire le radiografie in ambito sanitario: fisici, medici, fotografi, infermieri e tecnici.

Nel corso degli anni si è sviluppata, intorno a questa tecnologia, la specialità di radiologia medica e la figura del tecnico sanitario di radiologia medica.

Campi di utilizzo

Diagnostica medica

Oggigiorno il principale campo di utilizzo della radiografia è quello della diagnosi medica. Tra gli esami più comuni, lo studio dell'apparato scheletrico, che grazie alla sua densità, appare molto chiaro nell'immagine. Il suo utilizzo in ortopedia è comune per diagnosi di fratture delle ossa, lussazioni, artrosi, controlli post-operatori e di patologie a carico della colonna vertebrale come: spondilolistesi, spondiloartrosi, scoliosi.



Radiografia del torace.

La radiografia del torace è ampiamente utilizzata per l'esame dei campi polmonari (per la ricerca ad esempio di tumori, esiti di broncopolmoniti, pneumotorace, versamenti pleurici) e delle strutture mediastiniche come il cuore e l'arco aortico.

Anche gli organi addominali vengono studiati con la radiografia, a volte facendo uso dei mezzi di contrasto per esaltare l'immagine dell'organo da esaminare. L'apparato digerente viene generalmente studiato facendo assumere una soluzione di solfato di bario (o talvolta di soluzioni iodate) per via orale (nello studio dell'esofago e dello stomaco) o per via rettale per lo studio dell'intestino crasso (clisma opaco), queste tipologie di indagine diagnostica sono, al giorno d'oggi, desuete se non in casi selezionati. L'apparato urinario veniva studiato somministrando per via endovenosa un mezzo di contrasto a base di iodio che, in tempi diversi, opacizza i reni, gli ureteri, la vescica e l'uretra. Questi esami prendono il nome di urografia, ad oggi, sempre più spesso, sostituita da indagini più sensibili come uro-TC. Un altro esame dell'addome femminile è l'isterosalpingografia, utilizzato per la verifica della pervietà delle tube di Falloppio; la colpografia invece, utilizzata per lo studio della cavità vaginale,entrambe queste tecniche sono ormai cadute in disuso.

Tecnica

Per ottenere le immagini radiologiche di una precisa parte anatomica il tecnico sanitario di radiologia medica posizionerà il paziente su un apposito tavolo radiologico o su uno schermo. I raggi X sono radiazioni ionizzanti invisibili che non danno alcuna sensazione quando attraversano il corpo. Il fascio di raggi X al suo passaggio penetra il corpo umano e viene assorbito in maniera diversa a seconda delle diverse parti anatomiche incontrate e ne esce attenuato prima di raggiungere il sistema di rilevamento.

Fino ad alcuni decenni fa, questo era generalmente costituito da una pellicola fotografica accoppiata ad uno schermo di rinforzo, in grado di impressionare i raggi X che attraversavano il corpo del paziente. Oggigiorno con l'avvento della radiografia digitale, la pellicola è stata sostituita da cassette radiografiche contenenti sostanze fotostimolabili che poi saranno lette da opportuni lettori che visualizzeranno sul computer l'immagine ottenuta. Nei sistemi più moderni, una matrice di scintillatori e CCD sono in grado di acquisire direttamente le immagini.

Una volta che il tecnico avrà prodotto tutte le radiografie, nelle varie proiezioni richieste dal tipo di esame, le immagini verranno inviate (nei sistemi più moderni attraverso il sistema PACS) al medico radiologo che provvederà al referto.

La radiografia risulta particolarmente importante ed utilizzata nell'emergenza poiché è una metodica rapida, semplice e relativamente economica.

Per una maggior sicurezza del paziente si utilizza il sistema di controllo automatico dell'esposizione.

Proiezioni radiologiche

Le proiezioni radiologiche comprendono la tecnica di esecuzione atta a produrre immagini radiografiche che saranno poi refertate da un medico radiologo. La radiologia tradizionale studia prevalentemente i segmenti ossei basandosi sulla richiesta medica, pertanto le proiezioni possono suddividersi in varie classi a seconda della regione anatomica di interesse iconografico. Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) si avvale delle sue conoscenze di anatomia sfruttando i punti di repere, i piani corporei e le linee per la corretta centratura del raggio principale, del paziente e del piano di rivelazione dell'immagine radiante.

Ambito industriale

La radiografia è uno dei metodi di controllo non distruttivo dei materiali più utilizzato nel settore aerospaziale e nucleare. Si usa per la diagnostica di imperfezioni alla struttura dei materiali (serbatoi, tubazioni, reattori, eccetera).

Opere d'arte

Nello studio di un dipinto, si applica il recettore sopra la superficie dipinta e la fonte di radiazione dietro il dipinto. Il fascio penetra il supporto (pannello o tela) e produce un'immagine in negativo del dipinto. Il recettore è generalmente costituito da una particolare pellicola fotosensibile, le cui dimensioni possono essere adattate a quelle del dipinto. Quando ciò non è possibile si procede a delle prese parziali che vengono poi riunite per dare l'immagine radiografica completa del dipinto in esame. Gli strati pittorici bianchi (biacca), gialli (giallolino) o rossi che, ad esempio, nella pittura figurativa, vengono spesso usati per le vesti e per i tratti del viso, risultano bianchi il che consente di osservare eventuali modifiche nella composizione del dipinto, come pure di documentare lo sviluppo della tecnica pittorica in funzione dell'uso delle imprimiture e della superposizione di strati pittorici diversi, che possono il più delle volte essere distinti, contati e differenziati tramite la radiografia. Quest'ultima permette anche di evidenziare le lacune nell'applicazione del colore ed i pentimenti.[1]

La prima radiografia di un quadro fu realizzata nel 1896 in Germania, l'anno seguente un'opera di Dürer fu sottoposta ai raggi X a Londra. Oggi la tecnologia, dopo aver sviluppato la radioscopia (visione dell'immagine su di uno schermo), consente di ottenere direttamente delle immagini digitali della radiografia.

Effetti sulla salute

I raggi X sono radiazioni ionizzanti e quindi comportano un effetto biologico sulle strutture anatomiche che attraversano. Il sievert è l'unità di misura della dose equivalente di radiazione nel Sistema Internazionale ed è una misura degli effetti e del danno provocato dalla radiazione su un organismo.

causa o pratica medica	dose equivalente
fondo naturale di radiazione (media)	2,4 mSv/anno
massima dose di fondo naturale (Ramsar valore medio)	10,2 mSv/anno
radiografia articolare	0,01 - 1 mSv
tomografia computerizzata	2 ~ 15 mSv
PET, tomografia ad emissione di positroni	10 ~ 20 mSv
scintigrafia	10 ~ 20 mSv
radioterapia	30 ~ 70 mSv

Come si può vedere dalla tabella comparativa, la dose per una singola radiografia è molto bassa. Ma proprio per la sua potenziale dannosità, ogni esame radiologico deve essere, per legge, giustificato da un preciso quesito diagnostico non risolvibile con altre metodiche che non comportino esposizione a radiazioni ionizzanti e l'esame stesso deve essere ottimizzato al fine di somministrare meno dose possibile ottenendo comunque un buon risultato.

Note

1. ^ Van Asperen de Boer, cit., pag. 4

Bibliografia

- Robert Fosbinder, Kelsey, Charles, *L'immagine radiologica, tecnologie e tecniche di acquisizione*, McGraw-Hill, 2002, ISBN 88-386-1640-X.
- Fernando Mazzucato, *Anatomia radiologica*, Piccin, 2009, ISBN 978-88-299-1980-2.
- J.R.J. van Asperen de Boer, *Current Techniques in the Scientific Examination of Paintings*, in: John Shearman; Marcia B. Hall (eds.);*The Princeton Raphael Symposium. Science in the Service of Art History*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990, pagg. 3-6 ISBN 0-691-04079-6

Voci correlate

- Tecnologia nucleare
- Radiografia digitale
- Dosimetria
- Radioprotezione
- Tomografia computerizzata
- Mammografia
- Fluoroscopia
- Seriografo
- Riflettografia

- Rëbra

Altri progetti

- Wikiquote contiene citazioni sulla **radiografia**
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**radiografia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file sulla **radiografia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radiography?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Radiografia*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) *IUPAC Gold Book, "radiograph"*, su *goldbook.iupac.org*.
- Cliniche Radiologiche (http://www.puntoradiologia.it/cliniche-radiologiche/) in Italia

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 21826 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=21826) · LCCN (EN) sh00006374 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006374) · GND (DE) 4139158-5 (https://d-nb.info/gnd/4139158-5) · BNF (FR) cb119326954 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119326954) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119326954) · J9U (EN, HE) 987007558358705171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007558358705171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007558358705171)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiografia&oldid=126228519"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 12 mar 2022 alle 11:39.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Ecografia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**ecografia** o **ecotomografia** è un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. Tale metodica viene considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di Imaging più complesse come CT, imaging a risonanza magnetica, angiografia. Nelle mani del radiologo interventista è una metodica che può essere utilizzata per procedure terapeutiche mini invasive. L'ecografia è, in ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché vengono richieste particolari doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a cultura dell'immagine ed esperienza clinica.

Indice

Descrizione

Sistemi di scansione
- Scansione lineare
- Scansione settoriale
- Scansione convex

Modi di presentazione
- Modo A (modulazione di ampiezza)
- Modo B (modulazione di luminosità)
- Modo real-time
- Modo M (motion scan)

Amplificazione e compenso di profondità
- Amplificazione
- Compenso di profondità

Ecografia Doppler

Modo 3D

Mezzo di contrasto

Utilizzi

Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Ecografia

Procedura diagnostica

Esecuzione di una ecografia su un paziente pediatrico

Tipo	Esame radiologico
Anestesia	No
ICD-9-CM	88.7 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=88.7&Submit=Search&action=search)
MeSH	D014463 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D014463)

Descrizione

La frequenza degli ultrasuoni utilizzati (che per definizione è superiore ai 20 kHz) varia da 2 MHz a 15 MHz circa, ed è scelta tenendo in considerazione che frequenze maggiori hanno maggiore potere risolutivo dell'immagine, ma penetrano meno in profondità nel soggetto. Queste onde sono generate da un cristallo che sfrutta l'effetto piezoelettrico, inserito in una sonda mantenuta a diretto contatto con la pelle del paziente con l'interposizione di un apposito gel (che elimina l'aria interposta tra sonda e cute del paziente, permettendo agli ultrasuoni di penetrare nel segmento anatomico esaminato); la stessa sonda è in grado di raccogliere il segnale di ritorno, che viene opportunamente elaborato da un computer e presentato su un monitor.

Variando l'apertura emittente della sonda, è possibile cambiare il cono di apertura degli ultrasuoni e quindi la profondità fino alla quale il fascio può considerarsi parallelo.

Oggi ogni ecografo è dotato delle cosiddette *sonde real-time*, in cui gli ultrasuoni sono prodotti e raccolti in sequenza in direzioni diverse, tramite modulazioni meccaniche o elettroniche della sonda.

In un tessuto idealmente omogeneo (a impedenza acustica caratteristica costante) l'onda procede attenuandosi in funzione del tipo di tessuto. Quando l'onda raggiunge invece un punto di variazione di impedenza acustica, viene in varia misura riflessa, rifratta e diffusa. La percentuale riflessa porta informazioni sulla differenza di impedenza tra i due tessuti ed è pari a:

$$R = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

Vista la grande differenza di impedenza tra un osso ed un tessuto, con l'ecografia non è possibile vedere dietro di esso. Anche zone di aria o gas[1] (Z piccolo) fanno "ombra", per via di una riflessione totale.

Il tempo impiegato dall'onda nel percorso di andata, riflessione e ritorno viene fornito al computer, che calcola la profondità da cui è giunta l'eco, ossia della superficie o del punto di discontinuità dell'impedenza acustica, indice di ecostruttura dei tessuti disomogenea. Si possono così individuare le dimensioni dei vari organi e delle loro pareti, ed eventuali zone ipoecogene (con scarso riflesso del segnale ecografico) o iperecogene (con una riflettanza maggiore) all'interno o all'esterno dei vari organi.

Sostanzialmente un ecografo è costituito da tre parti:

- una sonda che trasmette e riceve il segnale
- un sistema elettronico che:
  - pilota il trasduttore
  - genera l'impulso di trasmissione
  - riceve l'eco di ritorno alla sonda
  - tratta il segnale ricevuto
- un sistema di visualizzazione

Sistemi di scansione

I sistemi di scansione sono caratterizzati dal formato dell'immagine che a sua volta deriva dal trasduttore che si usa.

Scansione lineare

- Formato dell'immagine rettangolare
- Trasduttori lineari

Sonda a scansione lineare

Gruppi di elementi (da 5 o 6) facenti parte di una cortina di cristalli (da 64 a 200 o più) posti in maniera contigua, vengono eccitati in successione in maniera da formare una scansione lineare.

Scansione settoriale

- Formato dell'immagine settoriale
- Trasduttori settoriali meccanici a singolo cristallo, anulari, array.

Nel caso di un settoriale meccanico (singolo cristallo o anulare) la scansione viene data tramite un sistema di ingranaggi che fa oscillare il cristallo di un settore (normalmente 90°). Durante l'oscillazione il cristallo viene eccitato con una certa tempistica, in maniera da inviare gli impulsi ultrasonori, ricevere gli echi di ritorno e quindi permettere di creare l'immagine ultrasonora all'interno del campo di vista.

Scansione convex

- Formato dell'immagine a tronco di cono
- Trasduttori convex

Nel caso di un trasduttore convex i cristalli vengono eccitati esattamente come nel trasduttore lineare, ma il campo di vista sarà a tronco di cono, dato che i cristalli sono posizionati su una superficie curva.

Modi di presentazione

Si possono ottenere diverse rappresentazioni delle strutture oggetto di esame a seconda delle elaborazioni effettuate sul segnale in output dalla sonda

Modo A (modulazione di ampiezza)

Il metodo A-mode (amplitude mode) è il metodo più basilare, ideato negli anni '40. Ogni eco viene presentata monodimensionalmente, tramite un oscilloscopio millimetrato, come un picco la cui ampiezza corrisponde all'intensità dell'eco stessa. Ogni eco rappresenta la profondità della struttura riflettente il segnale; tale modalità necessita quindi di una buona conoscenza dell'anatomia delle strutture che giacciono sul percorso del fascio di ultrasuoni. Al giorno d'oggi trova impiego in pochi campi come l'oculistica, la neurologia e l'ostetricia (valutazione encefalometrica)

Modo B (modulazione di luminosità)

Ogni eco viene presentata come un punto luminoso la cui tonalità di grigio è proporzionale all'intensità dell'eco.

Modo real-time

Le onde sono emesse e raccolte in direzioni diverse in sequenza, in modo da poter associare ad ogni istante una direzione. In questo modo è possibile avere un'immagine contemporaneamente su tutto il campo di osservazione. La maggior parte degli ecografi attuali opera in questo modo.

Modo M (motion scan)

È una rappresentazione in modo B, ma con la caratteristica aggiuntiva di essere cadenzata; viene utilizzata allo scopo di visualizzare sullo schermo in tempo reale la posizione variabile di un ostacolo attraverso l'eco da esso prodotta.

Amplificazione e compenso di profondità

Molto importante è il sistema di amplificazione degli echi ed il compenso di profondità.

Amplificazione

Gli echi ricevuti hanno un'ampiezza ridotta rispetto all'eco incidente. La tensione generata dal cristallo a seguito dell'eco di ritorno è molto bassa, deve essere quindi amplificata prima di essere inviata ai sistemi di elaborazione e quindi di presentazione.

Compenso di profondità

A causa dell'attenuazione degli ultrasuoni nel tessuto umano (1 dB/cm/MHz) gli echi provenienti da strutture distali saranno di minor ampiezza rispetto a quelli provenienti da strutture similari ma prossimali. Per compensare ciò è necessario amplificare maggiormente gli echi lontani rispetto a quelli più vicini. Ciò viene svolto da un amplificatore dove il guadagno aumenta in funzione del tempo (T.G.C. Time Gain Compensation) cioè in funzione della profondità di penetrazione.

Ecografia Doppler

Quando un'onda è riflessa su un oggetto in movimento, la parte riflessa cambia la propria frequenza in funzione della velocità dell'oggetto (effetto Doppler). L'ammontare del cambiamento della frequenza dipende dalla velocità del bersaglio.


Color Doppler di una Carotide

$$\triangle F = \frac{2 f_0}{C} V \cos \Theta$$

$\triangle F =$ Doppler shift (Variazione di frequenza)

$f_0 =$ Frequenza onda incidente

$C =$ Velocità di propagazione del suono nel tessuto umano (1540 m/s)

$V =$ Velocità di bersaglio

$\Theta =$ Angolo di incidenza del fascio ultrasonoro con il bersaglio.

Il computer dell'ecografo, conoscendo la differenza di frequenza, può calcolare la velocità del mezzo su cui l'onda si è riflessa, mentre la profondità è nota dal tempo impiegato. L'informazione della velocità è presentata a monitor con codifica a colori (normalmente rosso e blu) a seconda se si tratti di velocità in avvicinamento o in allontanamento; l'intensità del colore è questa volta legata alla frequenza dell'onda di ritorno. Uso tipico è lo studio vascolare (flussometro).

Sono possibili due modi interpretativi: *Color Doppler* (si hanno informazioni sulla velocità media del mezzo - adatto per un volume di studio ampio) e *Gated Doppler* (si ottiene lo spettro di tutte le velocità presenti nel mezzo, con la loro importanza - adatto per uno studio su un particolare).

Nella modalità Doppler, il sistema fornisce normalmente anche un segnale udibile che simula il flusso del sangue; si tratta comunque di un segnale virtuale che non esiste, utilizzato solo per comodità (si può conoscere quanto riprodotto sul monitor anche senza guardarlo).

Le immagini ecografiche sono a bassa risoluzione, tipicamente 256x256 ad 8 bit/pixel. Di solito il radiologo effettua la diagnosi direttamente sul monitor, passando alla stampa solo per documentazione.

Modo 3D

L'evoluzione più recente è rappresentata dalla tecnica tridimensionale, la quale, a differenza della classica immagine bidimensionale, è basata sull'acquisizione, mediante apposita sonda, di un "volume" di tessuto esaminato. Il volume da studiare viene acquisito e digitalizzato in frazioni di secondo, dopo di che può essere successivamente esaminato sia in bidimensionale, con l'esame di infinite "fette" del campione (sui tre assi x, y e z), oppure in rappresentazione volumetrica, con l'esame del tessuto o dell'organo da studiare, il quale appare sul monitor come un solido che può essere fatto ruotare sui tre assi. In tal modo si evidenzia con particolare chiarezza il suo reale aspetto nelle tre dimensioni. Con la metodica "real time", si aggiunge a tutto ciò l'effetto "movimento", per esempio il feto che si muove nel liquido amniotico.

"Ecografia 3d" di un feto di 29 settimane

Un'applicazione della tecnica tridimensionale è rappresentata dal sistema ecografico ABUS (Automated Breast Ultrasound System[2]). Questa tecnologia di ecografia in 3D rappresenta un’opzione di screening per le donne con tessuto mammario denso. Essa è in grado di migliorare la diagnosi precoce dei tumori invasivi della mammella rispetto all’utilizzo della sola tomosintesi; il volume 3D e l’accesso multiplanare consentono di analizzare il tumore della mammella in modo accurato, non invasivo, prima di procedere alla vista globale della mammella garantendo inoltre anche la riproducibilità dell'esame[3].

Mezzo di contrasto

In ecografia può essere usato un mezzo di contrasto endovenoso costituito da microbolle di esafluoruro di zolfo, che aumentano l'ecogenicità del sangue: questa tecnica può essere utilizzata sia per studi di ecografia vascolare, sia per caratterizzare lesioni degli organi addominali (soprattutto del fegato e del rene, a volte anche della milza e del pancreas). Il mezzo di contrasto ecografico presenta poche controindicazioni (allergia allo zolfo, cardiopatia ischemica) rispetto a quelli utilizzati in TC e risonanza magnetica: pertanto, può essere utilizzato come metodica meno invasiva, considerata anche l'assenza di radiazioni ionizzanti e di radiofrequenze o campi magnetici, tipici questi ultimi della risonanza magnetica.

In ecografia può essere usato un agente (anche chiamato mezzo) di contrasto endovenoso costituito da microbolle gassose rivestite (per esempio contenenti esafluoruro di zolfo[4]), che aumentano l'ecogenicità del sangue. Questa tecnica fu scoperta dal Dr. Raymond Gramiak nel 1968[5], e chiamata « contrast-enhanced ultrasound » (ecografia con mezzo di contrasto). Questa tecnica viene usata clinicamente in tutto il mondo[6], in particolar modo in ecocardiografia (principalmente in USA) ed in ecografia radiologica (Europa e Asia). Inoltre l'uso di microbolle specificamente ingegnerizzate per agganciarsi ai capillari tumorali tramite l'espressione biomolecolare delle cellule cancerogene[7][8][9] , originariamente create dal Dr. Alexander Klibanov nel 1997[10][11], fa prevedere un uso futuro dell'ecografia a mezzo di contrasto per identificare tumori in fase molto precoce.

Gli agenti di contrasto basati su microbolle vanno somministrati in via endovenosa durante l'esame ecografico. Le microbolle, grazie al loro diametro, restano confinate nei vasi sanguigni, non riuscendo a fuoriuscire nel liquido interstiziale. Per questa ragione gli agenti di contrasto ecografici sono completamente intravascolari, una caratteristica che li rende un mezzo ideale per rivelare la microvascolarizzazione degli organi durante la diagnostica. Un tipico utilizzo clinico dell'ecografia a mezzo di contrasto consiste nella localizzazione di tumori metastatici ipervascolari, che esibiscono un assorbimento del contrasto (cinetica della concentrazione delle microbolle nel sangue) più veloce rispetto al tessuto biologico circostante sano[12]. Altre applicazioni cliniche dell'ecografia a mezzo di contrasto sono ad esempio la delineazione del ventricolo sinistro durante ecocardiografia, per ispezionare visualmente la contrattilità del miocardio a seguito di un infarto. Infine sono anche emerse applicazioni in analisi quantitativa della perfusione[13][14] per identificare la risposta del paziente verso un trattamento antitumorale allo stadio precoce (metodologia e studio clinico presentati dal Dr. Nathalie Lassau nel 2011[15]), in modo da poter determinare la migliore terapia oncologica[16].

Nell'uso oncologico dell'ecografia con mezzo di contrasto, viene attualmente utilizzato il metodo di la tecnica delle immagini parametriche dei tratti distintivi della vascolarizzazione[17] inventato dal Dr. Nicolas Rognin nel 2010[18]. Questo metodo è pensato per essere uno strumento di aiuto nella diagnostica dei tessuti tumorali, facilitando la caratterizzazione del tipo di tessuto (benigno o maligno). Esso è un metodo computazionale[19][20] per analizzare una sequenza temporale di immagini ecografiche con mezzo di contrasto (sotto forma di videoclip digitale) acquisita durante l'esame ecografico del paziente. Una volta circoscritta la zona tumorale, vengono applicati due stadi di analisi del segnale ai pixel nella zona tumorale:



Immagine parametrica dei tratti distintivi della vascolarizzazione a seguito di esame ecografico con mezzo di contrasto (diagramma)

1. Calcolo del tratto distintivo della vascolarizzazione (differenza nell'assorbimento del contrasto rispetto al tessuto sano circostante);
2. Classificazione automatica del tratto distintivo della vascolarizzazione tramite un singolo parametro, codificato con uno dei seguenti colori:
   - verde, per un segnale continuo più elevato (assorbimento di contrasto maggiore rispetto al tessuto sano circostante)
   - blu, per un segnale continuo meno elevato (assorbimento di contrasto minore rispetto al tessuto sano circostante)
   - rosso, per un veloce incremento del segnale (assorbimento di contrasto che avviene prima rispetto al tessuto sano circostante), oppure
   - giallo, per un veloce decremento del segnale (assorbimento di contrasto che avviene più tardi rispetto al tessuto sano circostante).

Una volta che l'analisi del segnale per ogni pixel è completata, una mappa cromatica del parametro viene mostrata sullo schermo, in modo da riassumere le informazioni vascolari del tumore in una singola immagine, chiamata immagine parametrica (cfr. ultima figura dell'articolo[21] per esempi clinici). Questa immagine parametrica viene interpretata dallo specialista in base al colore predominante nel tumore: rosso indica un sospetto di malignità, verde o giallo un'alta probabilità di benignità. Nel primo caso, lo specialista può prescrivere una biopsia per confermare la diagnosi, o una tomografia assiale computerizzata (TAC) come seconda opzione. Nel secondo caso, è necessario solo un riesame ecografico con mezzo di contrasto dopo qualche mese. Il beneficio di questo metodo è quello di evitare una biopsia sistematica dei tumori benigni, o l'esposizione del paziente ad una TAC. Questo metodo è stato dimostrato efficace per la caratterizzazione di tumori epatici[22]. In un contesto di screening dei tumori, questo metodo può essere potenzialmente applicabile ad altri tipi di tumori, come quelli della mammella[23] o tumori prostatici.

Utilizzi

Quest'analisi strumentale serve per analizzare e verificare la presenza di alcune patologie a seconda degli strumenti utilizzati.

- Sonda tradizionale:
  - Screening per il tumore della mammella
  - Patologie tiroidee
  - Patologie addominali (v. appendicite, colica biliare) - Fegato organo modello standard della isoecogenicità.
  - Colica renale
- Eco doppler per i vasi epiaortici:
  - Stenosi
  - Placche
  - Ulcerazioni
  - Dissecazioni
- Doppler transcranico:
  - Vasospasmo (aneurisma)
  - Occlusione vasale (aterosclerosi)

Note

1. ^ È per tale motivo che la persona sottoposta ad ecografia di organi che possono contenere quantità d'aria o di gas, come stomaco, intestino e vescica, devono seguire una preparazione alimentare atta a diminuirne la quantità: dieta specifica e integratori per l'intestino, assunzione di acqua non gassata per riempire la vescica; talvolta, durante l'esame, può venire richiesto di riempire lo stomaco di acqua non gassata.
2. ^ *Automated Breast Ultrasound System for Breast Cancer Evaluation: Diagnostic Performance of the Two-View Scan Technique in Women with Small Breasts*, su *ncbi.nlm.nih.gov*.
3. ^ *Quali sono i limiti della mammografia?*, su *associazionesirp.it*. URL consultato il 15 ottobre 2020 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2020).
4. ^ (**EN**) Michel Schneider, *Characteristics of SonoVue*, in *Echocardiography*, vol. 16, n. 7, 1999, pp. 743–746;.
5. ^ (**EN**) Raymond Gramiak *et al.*, *Echocardiogrpahy of the aortic root*, in *Investigative Radiology*, vol. 16, n. 7, 1968, pp. 743–746;.

6. **^** (**EN**) *Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) Around the World - The International Contrast Ultrasound Society (ICUS)* (**PDF**), su *icus-society.org*. URL consultato il 4 novembre 2013 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2013).
7. **^** (**EN**) Jonathan Lindner *et al.*, *Molecular imaging with contrast ultrasound and targeted microbubbles*, in *Journal of nuclear cardiology : official publication of the American Society of Nuclear Cardiology*, vol. 11, n. 2, 2004, pp. 215–221;.
8. **^** (**EN**) Sybille Pochon *et al.*, *BR55: A lipopeptide-based VEGFR2-targeted ultrasound contrast agent for molecular imaging of angiogenesis*, in *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 45, n. 2, 2010, pp. 89–95;.
9. **^** (**EN**) Joergen Willmann *et al.*, *Targeted Contrast-Enhanced Ultrasound Imaging of Tumor Angiogenesis with Contrast Microbubbles Conjugated to Integrin-Binding Knottin Peptides*, in *Journal of Nuclear Medicine*, vol. 51, n. 3, 2010, pp. 433–440;.
10. **^** (**EN**) Alexanber Klibanov *et al.*, *Targeting of ultrasound contrast material. An in vitro feasibility study*, in *Acta Radiologica Supplementum*, vol. 412, 1997, pp. 113-120;.
11. **^** (**EN**) Alexanber Klibanov, *Targeted delivery of gas-filled microspheres, contrast agents for ultrasound imaging*, in *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 37, n. 1-3, 1999, pp. 139–157;, DOI:10.1016/S0169-409X(98)00104-5.
12. **^** (**EN**) Michel Claudon *et al.*, *Guidelines and good clinical practice recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the liver - update 2012: A WFUMB-EFSUMB initiative in cooperation with representatives of AFSUMB, AIUM, ASUM, FLAUS and ICUS*, in *Ultrasound in Medicine and Biology*, vol. 39, n. 2, 2013, pp. 187–210;.
13. **^** (**EN**) Fabio Piscaglia *et al.*, *The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): Update 2011 on non-hepatic applications* , in *Ultraschall in der Medizin*, vol. 33, n. 1, 2012, pp. 33–59;.
14. **^** (**EN**) Meng-Xing Tang *et al.*, *Quantitative contrast-enhanced ultrasound imaging: a review of sources of variability*, in *Interface Focus*, vol. 1, n. 4, 2012, pp. 520–539;.
15. **^** (**EN**) Nathalie Lassau *et al.*, *Advanced hepatocellular carcinoma: early evaluation of response to bevacizumab therapy at dynamic contrast-enhanced US with quantification--preliminary results*, in *Radiology*, vol. 258, n. 1, 2011, pp. 291–300;.
16. **^** (**EN**) Katsutoshi Sugimoto *et al.*, *Hepatocellular carcinoma treated with sorafenib: early detection of treatment response and major adverse events by contrast-enhanced US*, in *Liver International*, vol. 33, n. 4, 2013, pp. 605–615;.
17. **^** (**EN**) Nicolas Rognin *et al.*, *Parametric imaging for characterizing focal liver lesions in contrast-enhanced ultrasound*, in *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control*, vol. 57, n. 11, 2010, pp. 2503–2511;.
18. **^** (**EN**) Nicolas Rognin *et al.*, *Parametric images based on dynamic behavior over time*, in *Brevetto internazionale. Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)*, 2010, pp. 1-44;.
19. **^** (**EN**) François Tranquart *et al.*, *Perfusion Quantification in Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) - Ready for Research Projects and Routine Clinical Use*, in *Ultraschall in der Medizin*, vol. 3, S01, 2012, pp. 31-38;. URL consultato il 21 agosto 2021 (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2013).
20. **^** (**EN**) Paolo Angelelli *et al.*, *Interactive visual analysis of contrast-enhanced ultrasound data based on small neighborhood statistics*, in *Computers & Graphics*, vol. 35, n. 2, 2011, pp. 218–226;.
21. **^** (**EN**) Eric Barnes, *Contrast US processing tool shows malignant liver lesions*, in *AuntMinnie.com, San-Francisco, Stati Uniti*, 2010, pp. ;.
22. **^** (**EN**) Anass Annaye *et al.*, *Differentiation of Focal Liver Lesions: Usefulness of Parametric Imaging with Contrast-enhanced US*, in *Radiology*, vol. 261, n. 1, 2011, pp. 300-310;.
23. **^** (**EN**) Zhang Yuan *et al.*, *Diagnostic Value of Contrast-Enhanced Ultrasound Parametric Imaging in Breast Tumors*, in *Journal of Breast Cancer*, vol. 16, n. 2, 2013, pp. 208-213;.

Voci correlate

- Radiologia
- Radiografia computerizzata
- Radiografia digitale
- Tomografia assiale computerizzata
- Medicina nucleare
- Angiografia
- CMUT
- Ecografia ostetrica
- Ecografia mammaria
- Ecografia della tiroide
- Ecografia toracica
- Ecografia Doppler
- Mezzo di contrasto

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**ecografia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **ecografia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Medical_ultrasound?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Ecografia*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 11469 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=11469) · LCCN (EN) sh85139483 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139483) · GND (DE) 4248514-9 (https://d-nb.info/gnd/4248514-9) · BNF (FR) cb11931925j (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931925j) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931925j) · J9U (EN, HE) 987007560829105171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007560829105171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007560829105171) · NDL (EN, JA) 01003919 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/01003919)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecografia&oldid=124204393"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 nov 2021 alle 11:24.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Tomografia computerizzata

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **tomografia computerizzata**, in radiologia, indicata con l'acronimo **TC** o **CT** (dall'inglese *computed tomography*), è una tecnica di indagine radiodiagnostica (diagnostica per immagini), con la quale è possibile riprodurre immagini in sezione (tomografia) e tridimensionali dell'anatomia, create da un'analisi generata al computer, dell'attenuazione di un fascio di raggi X mentre passa attraverso una sezione corporea.[1][2]

È nota anche come **tomografia assiale computerizzata** o **TAC** (in inglese CAT da *computed axial tomography*). Il principio è che da proiezioni di un oggetto in molte direzioni (la perfezione si avrebbe solo con infinite proiezioni) si può ricostruire l'immagine dell'oggetto. Inizialmente il software di elaborazione permetteva solo il piano assiale o trasversale, perpendicolare cioè all'asse lungo del corpo. Il vero valore aggiunto delle macchine attuali però è che le proiezioni non sono più su piani distinti ma a spirale facendo scorrere il lettino su cui si trova il paziente. Ciò permette successivamente di ottenere ricostruzioni tridimensionali del segmento corporeo esaminato.

Anche se il suo utilizzo peculiare è nel campo della medicina, la TC è utilizzata anche in altri campi, come ad esempio test non distruttivi dei materiali; in questo ambito viene definita tomografia industriale computerizzata. Un altro esempio è il suo utilizzo in archeologia per ottenere le immagini dei contenuti di sarcofagi o delle mummie.

L'utilizzo della TC in ambito medico è notevolmente aumentato nei due decenni a cavallo tra il XX e il XXI secolo.[3] Si stima che più di settanta milioni di scansioni vengano eseguite ogni anno negli Stati Uniti,[4] ma che solo lo 0,4% dei casi di cancro nel Paese sia dovuto all'esposizione alle radiazioni dei raggi X utilizzati nelle scansioni TC.[5]

Tomografia computerizzata

Procedura diagnostica

Apparecchiatura per tomografia computerizzata

Tipo	Radiologia
ICD-9-CM	88.38 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=88.38&Submit=Search&action=search)
MeSH	D014057 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D014057)
MedlinePlus	003330 (https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003330.htm)

Indice

Storia

Metodica

Il tomografo computerizzato

Le "generazioni" dei tomografi computerizzati

- Tomografi computerizzati a fascio di elettroni
- Tecnologia multistrato
- Tomografi computerizzati a spirale
- TC-PET

Impiego clinico
- Studio del cranio e dell'encefalo
- Studio delle arcate dentarie
- Studio del collo
- Studio del torace
- Studio del cuore
- Studio dell'addome
- Studio delle ossa e delle articolazioni

Altri utilizzi
- Ambito industriale
- Impiego in geologia
- Conservazione dei beni culturali

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Storia

Schema del funzionamento dello stratigrafo assiale di Vallebona

Nel 1930 il radiologo italiano Alessandro Vallebona propose una tecnica per rappresentare un solo strato del corpo sulla pellicola radiografica, la stratigrafia. Sfruttando principi di geometria proiettiva, con la rotazione o pendolazione del tubo radiogeno tutti i piani al di sopra e al di sotto dello strato di interesse vengono eliminati. La stratigrafia ha rappresentato fino alla metà degli anni ottanta uno dei pilastri della diagnostica radiologica. Con l'avvento del computer è stata progressivamente soppiantata.

La metodica circolare alla base della tomografia assiale computerizzata fu inizialmente concepita, nel 1967, dall'ingegnere inglese Sir Godfrey Hounsfield che realizzò la prima apparecchiatura TAC insieme al fisico sudafricano Allan Cormack presso il *Central Research Laboratories* della EMI a Hayes nel Regno Unito.[6][7] Tali ricerche valsero ai due scienziati il premio Nobel per la medicina nel 1979 con la motivazione "*the development of computer assisted tomography*", premio che condivisero con Allan McLeod Cormack della Tufts University del Massachusetts, il quale propose indipendentemente dai due una tecnica simile.[8] Il primo tomografo computerizzato commerciale consentiva esclusivamente lo studio delle strutture del cranio e fu installato all'Atkinson Morley Hospital di Londra nel 1971.[6][9]

Il prototipo originale del 1971 era caratterizzato da un'unità di scansione che ruotava di 180°, un grado alla volta, intorno alla testa del paziente, immagazzinando 160 immagini da ogni posizione, per un totale di 28 800 immagini; tale procedimento richiedeva da 5 a oltre 10 minuti. Le immagini ottenute, quindi,

venivano elaborate con algoritmi di ricostruzione algebrici grazie all'utilizzo di un grande calcolatore che impiegava 2 ore e mezzo per eseguire tali calcoli.[9] Le immagini dell'encefalo così ottenute rendevano possibile apprezzare i diversi tessuti di cui esso è composto; i medici riconobbero subito il valore e l'utilità di tale tecnologia e, nonostante il prezzo fosse molto elevato, circa 300 000 $[10], cifra considerevole per quel periodo, la EMI Corporation non ebbe difficoltà a vendere il prodotto. Negli Stati Uniti la prima installazione di un tomografo computerizzato avvenne presso la *Mayo Clinic*.[8][11] In Italia la prima TAC EMI viene installato a Bologna nel 1974 presso l'Ospedale Bellaria a cura del prof. Giovanni Ruggiero che l'anno seguente sarà eletto presidente della ESNR – European Society of Neuroradiology.



Prototipo del primo dispositivo che usava la tecnologia della tomografia computerizzata (1967)

Inizialmente, fu opinione comune e fortemente radicata che l'innovativa tecnica non potesse in alcun modo travalicare l'ambito dello studio del cervello. Fu un radiologo americano di origine italiana, il professor Ralph Alfidi, ad avere l'intuizione che tale metodica poteva essere estesa all'intero corpo. Alfidi, allora direttore dell'Istituto di Radiologia dell'Università di Cleveland, già noto per i suoi studi sull'angiografia, era convinto che il principio della tomografia computerizzata fosse destinato ad avere una ben più ampia utilizzazione. Circondato da un'atmosfera di scetticismo, Alfidi, con l'appoggio di un Hounsfield inizialmente titubante, ma via via sempre più convinto della validità di questa idea, iniziò un lungo periodo di ricerche. Gli esperimenti vennero attuati utilizzando macchinari realizzati nel 1972 dalla Technicare e culminarono nel 1975 con l'effettuazione del primo impiego della TAC per lo studio dell'addome.

Il primo sistema TC in grado di realizzare immagini di qualsiasi parte del corpo fu l'ACTA (*Automatic Computerized Transverse Axial*) progettato da Robert Ledley, presso la Georgetown University. Questa macchina possedeva, come rilevatori, 30 tubi fotomoltiplicatori ed era in grado di completare una scansione in soli nove cicli di traslazione/rotazione, una velocità molto superiore a quella dell'apparecchiatura della EMI. Utilizzava 34 calcolatori PDP-11 sia per comandare i servo-meccanismi, sia per acquisire ed elaborare le immagini[12]. La casa farmaceutica Pfizer acquista il prototipo dall'università, insieme con i diritti per la fabbricazione di esso. Pfizer ha iniziato quindi a commercializzare il modello, chiamandolo "200FS" (*FS* significa “scansione veloce”), ottenendo un grande successo nelle vendite. Questa apparecchiatura produceva immagini in una matrice di 256×256, consentendo una molto migliore risoluzione spaziale rispetto a quella della EMI che era di 80×80.[13][14]

Da questo momento in poi la tecnologia della TAC migliorò costantemente, anche grazie alla sempre maggiore capacità di calcolo dei computer. I grandi miglioramenti nella velocità di scansione, nel numero di proiezioni acquisibili e nella qualità delle immagini, sono stati fondamentali perché tale tecnologia venisse presa in considerazione anche per l'imaging cardiaco. Nel 2008 Siemens ha introdotto una nuova generazione di scanner in grado di acquisire un volume di una certa dimensione in meno di 1 secondo, una velocità sufficiente per produrre immagini nitide di cuori che battono e delle arterie coronarie.

Metodica

La legge dell'assorbimento dei raggi X spiega come, dato un fascio di raggi X di una certa intensità iniziale I_0, esso venga attenuato in intensità $I(t)$ in misura esponenzialmente decrescente al coefficiente di attenuazione di massa μ e al cammino percorso nel mezzo t. Il coefficiente di attenuazione di massa dipende dalla densità ρ del materiale attraversato e dall'energia E del fascio di raggi X.

$$I(t) = I_0 e^{-\mu t}$$

Quindi il fascio di raggi X attraversando un oggetto verrà attenuato tanto più quanto attraverserà materiali ad alto numero atomico, tanto più sarà bassa l'energia e maggiore sarà lo spessore attraversato; viceversa, se attraversa un materiale a bassa densità, percorre uno spessore piccolo e l'energia è più alta, allora l'attenuazione sarà minore. Questo è il motivo per cui nelle radiografie analogiche gli oggetti a densità maggiore appaiono chiari (massima attenuazione) e gli oggetti a densità minore appaiono più scuri (minima attenuazione).

Il principio iniziale su cui si basa la ricostruzione tomografica è che acquisendo tante proiezioni radiografiche dello stesso oggetto ad angolazioni diverse è possibile ricostruire l'oggetto nelle due dimensioni. Per ottenere la terza dimensione si utilizzano complessi algoritmi matematici che elaborano i pixel delle successive scansioni tra i quali i metodi di retroproiezione filtrata (algoritmo Filtered Back Projection, FBP) se il fascio di raggi X è parallelo o a ventaglio, il metodo di Feldkamp se il fascio è conico oppure metodi iterativi[15]. Ovviamente per poter applicare questi algoritmi è necessario riprendere le proiezioni radiografiche in immagini digitali cioè una matrice di numeri organizzata il cui più piccolo elemento è chiamato pixel e il valore al suo interno è un numero in scala di grigi a cui corrisponde una misura dell'attenuazione del fascio in quel punto. Dopo aver applicato gli algoritmi di ricostruzione si ottiene un'immagine digitale che rappresenta la distribuzione della densità dell'oggetto in una sua sezione interna (slice) e il cui più piccolo elemento viene chiamato voxel in quanto si tratta di un elemento di volume. Quanto più piccolo è il volume rappresentato da un voxel, tanto maggiore è la risoluzione spaziale. Per velocizzare le acquisizioni ora sono concatenate in acquisizioni di dati con movimento a spirale ottenuto muovendo non il gantry ovviamente ma il lettino col paziente durante l'acquisizione della riga di dati iniziali (dati h).

Al fine di confrontare i risultati della tomografia ottenuti da diversi strumenti tomografici si definisce e si prende a riferimento la Scala di Hounsfield[16]. L'unità di misura dei valori numerici ricostruiti è HU (unità di Hounsfield). Il numero all'interno del voxel è detto $numero\ CT$, rappresenta la densità dell'oggetto in quel punto e si misura in HU se opportunamente calibrato secondo la seguente relazione:

$$numero\ CT = 1000\frac{\mu - \mu_{H_2O}}{\mu_{H_2O}}$$

La formula per il calcolo delle HU evidenzia come l'acqua venga presa a riferimento. Infatti il numero CT dell'acqua è ovviamente 0 HU; la densità dell'aria è considerata nulla $\mu = 0$ e quindi il numero CT dell'aria assume un valore di -1000 HU; per l'osso, che ha una densità all'incirca doppia di quella dell'acqua, il numero CT è +1000 HU.

Le dimensioni di un'immagine tomografica in uno scanner medicale standard sono normalmente di 512×512 voxel e profondità di 16 bit/pixel, anche se la tecnologia attuale permette di ottenere risultati anche migliori sia in termini di numero di voxel sia di risoluzione spaziale. La metodica TC consente risultati migliori della radiologia tradizionale per quanto riguarda la differenziazione dei tessuti molli. Infatti la TC produce un volume di dati che possono essere manipolati, attraverso un sistema noto come "*windowing*", per visualizzare le varie strutture anatomiche interne di un corpo in base alla loro capacità di attenuare il fascio di raggi X. Lo studio TC, a seconda dei distretti corporei e degli organi da valutare, può essere implementato con l'infusione di mezzo di contrasto endovenoso organo-iodato, che consente una migliore differenziazione di strutture con densità simile, o la valutazione della stessa struttura in tempi diversi, con acquisizioni multiple delle immagini e attraverso l'uso di un iniettore a flusso variabile.

Questo strumento diagnostico permette di settare lo spessore delle scansioni, che a seconda della tecnologia della macchia può influire in modo differente sulla regolazione, lo spessore minimo impostabile è generalmente 0,5 mm, questo parametro oltre a influire sul numero delle scansioni, delle radiazioni e in alcuni casi anche sulla velocità d'esecuzione, ha effetti anche sulla precisione e dettaglio dell'immagine.[17]

Il tomografo computerizzato

L'emettitore del fascio di raggi X ruota attorno al paziente e il rivelatore, al lato opposto, raccoglie l'immagine di una sezione del paziente; il lettino del paziente scorre in modo molto preciso e determinabile all'interno di un tunnel di scansione, presentando a ogni giro una sezione diversa del corpo. Le sequenze di immagini, assieme alle informazioni dell'angolo di ripresa, sono elaborate da un computer, che presenta il risultato sul monitor.



Esempi di immagini solitamente fornite da una TAC: in alto a sinistra la ricostruzione volumetrica, a destra il piano assiale, in basso i piani sagittale e frontale

Tale risultato è costituito da una serie di sezioni non necessariamente contigue di spessore preimpostato: l'insieme delle sezioni ricostruite costituiscono i dati inerenti al volume di scansione che possono essere ricostruiti da un software di rendering tridimensionale per produrre immagini tomografiche di qualsiasi piano spaziale (frontale, sagittale, assiale) o, in alternativa, per ottenere immagini tridimensionali o endoscopiche. Per ottenere le immagini tomografiche del paziente a partire dai dati "grezzi" della scansione (RAW Data) il computer dedicato alla ricostruzione impiega complessi algoritmi matematici di ricostruzione dell'immagine. I processi più importanti per ottenere le immagini dai dati grezzi sono la convoluzione e la retroproiezione o backprojection (trasformata di Radon). Le immagini di partenza di tutte le sezioni vengono normalmente registrate su un sistema di archiviazione (PACS) e le sezioni più importanti vengono talvolta stampate su pellicola. Il rivelatore ad alta efficienza è normalmente costituito da cesio ioduro, calcio fluoruro, cadmio tungstato.

Le "generazioni" dei tomografi computerizzati



Schema di un tomografo di prima generazione

I primi modelli di tomografi computerizzati, chiamati in seguito di "**prima generazione**", erano costituito da un tubo radiogeno che emetteva un fascio lineare di raggi X. Per eseguire una scansione il tubo radiogeno compiva prima una traslazione e poi una rotazione di un grado; questi due movimenti venivano ripetuti per 180 volte al fine di ottenere una rotazione complessiva intorno al paziente di 180° per un totale di 28 800 acquisizioni (180 proiezioni angolari X 160 raggi di proiezione). Solidale al tubo radiogeno e posto in posizione diametralmente opposta, vi era un unico detettore, in grado di rilevare l'attenuazione del fascio di raggi X. Il valore dell'attenuazione veniva poi trasformato in un segnale elettrico che, rielaborato, permetteva di calcolare la densità del volume di corpo che era stato attraversato e da qui ricostruire le immagini assiali. Generalmente, queste apparecchiature erano molto lente (per via della lunga sequenza di traslazioni e rotazioni) e in grado di produrre immagini solamente di bassa risoluzione spaziale.[12]

La "**seconda generazione**" di tomografi, introdotta dal 1974 presso la *Cleveland Clinic*, presentò notevoli progressi. Per prima cosa la geometria del fascio radiante da lineare è diventata “a ventaglio”, con un'ampiezza di 20-30 gradi, e conseguentemente è aumentato il numero dei detettori che è passato da 1 a un gruppo di 20-30 (sempre solidali e contrapposti al tubo radiogeno). Ciò ha permesso di evitare al tubo radiogeno il movimento di traslazione, lasciando solo quello di rotazione intorno al paziente, con un conseguente notevole risparmio di tempo (una singola scansione con questa generazione di tomografi comportava solo alcune decine di secondi) e di complessità meccanica.[18]



Schema di un tomografo di seconda generazione

Grazie a un miglioramento della tecnologia, piuttosto che l'applicazione di principi di funzionamento innovativi, i tomografi di "**terza generazione**" (introdotti nel 1975) soppiantarono quelli delle generazioni precedenti ed ebbero un tale successo che sono a oggi la tipologia più diffusa. Essi si differenziano da quelli della seconda generazione per via del fascio a raggi X ancora più ampio (dai 30 ai 50 gradi) tanto da riuscire a comprendere l'intera porzione anatomica da studiare. Anche il numero dei detettori risulta ampiamente aumentato, raggiungendo le diverse centinaia di elementi. I detettori, inoltre, spesso vengono disposti su più di una fila, in modo da poter acquisire più sezioni in un'unica rotazione del tubo, rendendo l'acquisizione estremamente veloce tanto da poter essere utilizzata per lo studio del cuore in movimento.



Schema di un tomografo di terza generazione



Schema di un tomografo di quarta generazione

Nei primi modelli, a una rotazione ne seguiva un'altra nel senso inverso, in modo che i cavi di alimentazione ritornassero nella posizione di partenza, senza attorcigliarsi. Tale metodica obbligava all'acquisizione di un solo strato per volta. A partire dal 1989, venne introdotta un'ulteriore caratteristica fondamentale per velocizzare l'esecuzione dell'intero esame: l'eliminazione dei cavi di alimentazione del tubo radiogeno che impedivano la rotazione continua dello stesso, in vantaggio dell'adozione di contatti striscianti che forniscono l'energia elettrica al tubo. Identica tecnica è utilizzata per le linee di dati dei detettori che rimangono solidali al tubo. Grazie a tutto ciò, i tomografi di terza generazione sono in grado di eseguire acquisizioni con voxel isotropico (delle stesse dimensioni sui tre lati) e a spirale, con la conseguente possibilità di ricostruire le immagini su più piani e tridimensionalmente.[19]

I tomografi di "**quarta generazione**" presentavano sensori fissi disposti circolarmente su tutto l'anello del gantry e sono stati abbandonati.

I tomografi moderni derivano da quelli di terza generazione ma hanno una caratteristica fondamentale, quella di acquisire a spirale: nei tomografi a rotazione continua unidirezionale infatti il tubo radiogeno e i rilevatori sono montati su un anello rotante che si alimenta a "contatti striscianti" (slip ring), senza più il problema dei cavi che si attorcigliano. Questa metodica consente l'acquisizione delle immagini in modo continuo: mentre il tavolo che porta il paziente si muove su un piano di scorrimento, i piani di scansione descrivono un'elica attorno al paziente, ottenendo una scansione "a spirale".[20] Ultimamente la tecnica di scansione adottata è la volumetrica. L'evoluzione tecnologica ha infatti permesso di ottenere detettori molto larghi; ad esempio l'ultima generazione di TAC Toshiba/Canon permette un'acquisizione istantanea di 320 canali dalla larghezza di 0,5 millimetri ciascuno, ottenendo così un'acquisizione volumetrica di 160 millimetri di profonditá in meno di mezzo secondo.

Tomografi computerizzati a fascio di elettroni

Tecnologia multistrato

I tomografi computerizzati a multi-strato sono una nuova famiglia di tomografi ad alto livello di dettaglio anatomico (fino a 0,5 mm) e di recente introduzione della quale i primi esempi risalgono al 1998. Una corona di sensori (detti detettori) registra l'attenuazione di un fascio radiogeno (raggi X) rotante intorno a un soggetto e trasformano attraverso elaborazioni matematiche questi dati in immagini leggibili da radiologi esperti. Le prime TC multistrato (o *multislice*) avevano due corone di detettori.

A oggi le migliori hanno 640 file di detettori. Sono possibili indagini accurate di endoscopia virtuale del colon in alternativa al clisma opaco (ma la colonscopia a fibre ottiche conserva il vantaggio dell'analisi bioptica della eventuale lesione o addirittura della sua estemporanea asportazione - ad esempio, un piccolo polipo). Un'altra importante applicazione è l'analisi vascolare di piccole arterie come le coronarie che si possono studiare, in soggetti non affetti da patologia acuta, in alternativa alla più invasiva coronarografia, e gli esami cardiologici dove la TAC multi-strato consente lo studio del cuore in un solo battito cardiaco, riducendo al minimo possibile le dosi di radiazione previste per il paziente. In generale, le immagini prodotte consentono un dettaglio anatomico eccezionale a fronte però di un consistente aumento della dose efficace di radiazioni al paziente, ragione per cui è molto importante la giustificazione razionale all'esame diagnostico.

Altrettanto importante è che la dose somministrata sia la minima indispensabile per ottenere il risultato diagnostico voluto (in inglese ALARA = *as low as reasonably achievable*, tanto bassa quanto ragionevolmente ottenibile).[21]

Attualmente esistono metodiche di TC dette "*Dual Energy*", che consentono di ridurre ulteriormente la dose alla popolazione, utilizzando due tubi di tensione diversa, risparmiando il passaggio della scansione senza mezzo di contrasto (l'immagine si può ottenere confrontando le due immagini ottenute e sottraendo le U.H. del contrasto).[22]

Tomografi computerizzati a spirale

I tomografi spiroidei più comuni compiono una rotazione in più o meno un secondo e consentono un'acquisizione completa di un volume corporeo in 40 secondi - un minuto: questa avviene in un'unica apnea, riducendo gli artefatti di movimento del paziente. I moderni tomografi multistrato possono impiegare anche solo pochi secondi, ottenendo decine di scansioni per ogni singola rotazione. Tomografi superveloci possono consentire lo studio del cuore. Recentemente è stata ideata anche una tecnica che consente l'esecuzione di una vera e propria colonscopia virtuale.

Sempre recentemente si assiste alla comparsa di TC con doppio tubo radiogeno, dette "dual source". Queste TC dispongono per l'appunto di due tubi radiogeni che funzionano a differenti energie; in questo modo, a causa della differente attenuazione dei tessuti sulle radiazioni a energia differente, si riesce ad avere una risoluzione di contrasto migliore.

TC-PET

Impiego clinico

Studio del cranio e dell'encefalo

Uno degli utilizzi più frequenti, tanto da diventare il *gold standard* per la diagnosi di molte patologie, della tomografia computerizzata è lo studio del cranio e dell'encefalo. La complessità di questa regione anatomica e la presenza di numerose strutture sovrapposte, nonché la necessità di visualizzare dettagli spesso



Immagine di una scansione TC del cervello

propedeutici a un intervento neurochirurgico, rende indispensabile la possibilità di ottenere immagini multi-planari ad alta risoluzione. Nonostante la risonanza magnetica stia acquisendo sempre maggiore importanza per quanto riguarda lo studio dell'encefalo, la TC garantisce tempi di esecuzione nettamente inferiori, non presenta problematiche relative alla presenza di forti campi magnetici e di claustrofobia, rendendo tale metodica la prima scelta, nonché la più adatta in situazioni di emergenza come traumi cranici e sospetti ictus cerebrali (emorragici o ischemici).[23]

Per quanto riguarda lo studio dell'encefalo, l'esame consiste in una scansione (con o senza mezzo di contrasto) che comprenda la regione che va dal foro occipitale fino al vertice del cranio, seguendo un orientamento che può basarsi su diversi piani anatomici (generalmente orbito-meatale o neuro-oculare).[24] Lo studio può essere completato da una ricostruzione multi-planare delle immagini ottenute tramite i tre piani spaziali.[25] Solitamente la TC encefalo viene utilizzata per la diagnosi di lesioni cerebrali e cerebellari di varia eziologia, neoplasie, ictus, forme di demenza senile, idrocefali, ecc.[23]

Anche per lo studio delle strutture ossee del cranio la tomografia computerizzata può trovare un largo impiego. Tramite questa metodica sono infatti spesso studiate le orbite, le rocche petrose nonché la sella turcica; lo studio delle ultime due trae particolare beneficio dalla possibilità di una ricostruzione MPR sul piano coronale. La TC rappresenta l'esame di elezione per lo studio dell'intero massiccio facciale per la ricerca di neoplasie, polipi dei seni paranasali, sinusite, processi infiammatori o per la valutazione di traumi.[26]



Ricostruzione coronale di una scansione TC all'encefalo, sede di un glioblastoma

Tomografi computerizzati con acquisizione volumetrica possono essere utilizzati, grazie all'impiego del mezzo di contrasto iodato, per approfonditi studi angiografici dei vasi che perfondono l'encefalo (arterie carotidi e poligono di Willis), di cui spesso è richiesta una ricostruzione tridimensionale al fine di visualizzare al meglio la morfologia e l'eventuale presenza di aneurismi o stenosi.[27]

Studio delle arcate dentarie

Le limitazioni dell'ortopantomografo rendono in alcuni casi la tomografia computerizzata quasi indispensabile per lo studio delle arcate dentarie. In particolare, l'implantologia computer assistita necessita di immagini tridimensionali affinché possa essere effettuata la pianificazione dell'intervento. In particolare la tomografia computerizzata, in ambito di implantologia è utile per la stima della qualità e quantità dell'osso dove verrà posizionato l'impianto, nonché la valutazione degli spazi necessari affinché non si corra il rischio di lesionare il nervo alveolare o perforare il seno mascellare. Dalla fine degli anni 1990, alla tradizionale metodica, si è affiancata la tomografia computerizzata cone beam, che utilizza un fascio a raggi X conico invece che “a spazzola”, la quale si sta sempre più affermando in ambito odontoiatrico-maxillo facciale.[28]

Studio del collo

La complessità delle strutture anatomiche presenti nel collo e la rapidità di esecuzione dell'esame rendono la tomografia computerizzata, insieme alla risonanza magnetica e all'ecografia, una delle metodiche di elezione per lo studio di questa regione. Se la valutazione di eventuali fratture trova nella TC il suo migliore strumento, essa può essere efficacemente utilizzata, spesso ricorrendo anche alla somministrazione di mezzo di contrasto, per la ricerca di neoplasie benigne o maligne della rinofaringe, della laringe e della ipofaringe, nonché di linfomi.[29] Lo studio della tiroide viene spesso eseguito tramite altre metodiche (come l'ecografia o la scintigrafia tiroidea) tuttavia anche la TC può essere impiegata per la valutazione del gozzo tiroideo e dei tumori tiroidei, anche se spesso nei pazienti con ipertiroidismo è necessario rinunciare all'utilizzo del mezzo di contrasto per evitare crisi tireotossiche.[30][31][32]

Studio del torace


Tomografia computerizzata in piano sagittale

Storicamente, dopo lo studio dell'encefalo, il torace è il secondo distretto corporeo a essere stato studiato tramite tomografia computerizzata ricavando ottimi risultati, tanto da diventare la metodica diagnostica standard per molte patologie. Infatti, la radiografia del torace, nonostante sia di larghissimo impiego, risulta limitata a causa della sovrapposizione delle strutture anatomiche (problematica solo in parte superabile dall'esecuzione di due proiezioni perpendicolari) che dalla imprecisione su alcune patologie che non permette sempre di ottenere una diagnosi precisa. Inoltre, la risonanza magnetica, per via dei principi fisici alla base del suo funzionamento, poco si presta allo studio dei polmoni caratterizzati dalla presenza di ampi volumi di aria nonché da un continuo movimento (così come per il cuore) per il quale è necessaria una metodica come la TC in grado di scansionare l'intero torace in pochi secondi.[33][34]

L'ampio uso della tomografia computerizzata per lo studio del torace ha portato allo sviluppo di particolari algoritmi di ricostruzione delle immagini, di filtri e di tecniche che permettono di ottimizzare l'esame a seconda dell'organo toracico esaminato e della patologia sospettata. Inoltre, questa metodica risulta fondamentale e praticamente esclusiva per guidare il radiologo interventista nella biopsia di tessuti presenti all'interno della cavità toracica.[35]

Ricostruzione tridimensionale di una TC toracica con un filtro che visualizza l'osso

Per quanto riguarda i vasi sanguigni, la TC del torace trova larghissimo impegno nello studio dell'arco aortico, in particolare alla ricerca di aneurismi o dissecazioni nonché per la valutazione post-operatoria e nel *follow up*.[36] Grazie alla TC è inoltre possibile diagnosticare la presenza di una tromboembolia polmonare.[37] Tutti gli esami vascolari richiedono, solitamente, la somministrazione di mezzo di contrasto e spesso sono eseguiti in situazioni di emergenza dove la velocità della metodica risulta essere di fondamentale importanza.[36]

Lo studio del polmone può essere effettuato con grande precisione grazie alla TC per una moltitudine di patologie, al fine sia di giungere a una diagnosi definitiva sia per inquadrare meglio il paziente per successivi indagini. Le ricostruzioni multi-planari possono risultare molto utili nel caso della valutazione di un tumore polmonare o broncopolmonare al fine di conoscere al meglio la sua sede e i rapporti anatomici oltre alla identificazione della dimensione dei linfonodi.[38] Un'acquisizione ad alta risoluzione può essere

fondamentale per una corretta valutazione di alcune patologie dell'apparato respiratorio inferiore come, ad esempio, fibrosi polmonare, bronchiettasie, stenosi delle vie respiratore, BPCO, asbestosi, polmoniti, tubercolosi polmonare, ecc.[39]

Studio del cuore



Immagine di una tomografia computerizzata delle coronarie con mezzo di contrasto

Grazie alla disponibilità sul mercato di tomografi computerizzati multi-strato sempre più veloci in grado di acquisire notevoli volumi corporei in pochissimo tempo, è stato possibile estendere l'utilizzo di tale metodica anche allo studio del muscolo cardiaco che nel soggetto vivo si presenta in continuo movimento. Numerosi studi sono stati effettuati per comparare la capacità prognostica dell'esame delle calcificazioni delle arterie coronarie tramite le tecniche non invasive come la TC multistrato, la *electron beam tomography* e la risonanza magnetica rispetto alla angiografia coronarica realizzata per via percutanea; al 2016 quest'ultima vanta ancora risultati iconografici migliori in particolare per quanto riguarda la risoluzione spaziale e il miglior rapporto segnale/rumore, tuttavia queste differenze si stanno attenuando grazie ai progressi tecnologici dei tomografi.[40][41][42][43] Inoltre, l'acquisizione di immagini cardiache può essere utile anche per la pianificazione di interventi cardiochirurgici, come quelli relativi alla valvola mitralica.[43][44]

Gli scopi diagnostici per cui si può ricorrere alla tomografia computerizzata in abito cardiologico sono la valutazione della calcificazione delle coronarie, lo studio morfologico del cuore, delle arterie coronariche e delle vene cardiache. L'esame si realizza con la somministrazione di mezzo di contrasto per via venosa e ci si avvale di un sistema (ve ne sono di vario tipo a seconda della casa costruttrice dell'apparecchiatura) per la sincronizzazione delle acquisizioni con la frequenza cardiaca, in modo da minimizzare gli artefatti da movimento ed escludere le fasi del ciclo cardiaco meno utili (tipicamente la diastole e la protodiastole).[45][46] Questa tecnica risulta, tuttavia, poco efficace nei pazienti che presentano aritmia e dunque una maggiore variabilità nel ritmo cardiaco.[47] Le immagini ottenute possono essere poi ricostruite con vari algoritmi, alcuni creati *ad hoc* per le indagini cardiache, a seconda della patologia da studiare e dalle necessità diagnostiche.[48]

Se l'utilizzo della TC è certamente meno invasivo di una coronarografia realizzata per via percutanea, uno degli svantaggi è l'alta dose (circa 8–10 mS) di radiazioni ionizzanti a cui deve essere sottoposto il paziente al fine di ottenere immagini a qualità sufficiente. Sono allo studio protocolli di acquisizione sempre più efficaci in modo da poter ridurre sensibilmente tale dose.[45]

Studio dell'addome

Vi sono molte situazioni cliniche che interessano la regione e gli organi addominali che possono essere studiate tramite tomografia computerizzata. Spesso, tali studi richiedono più di una scansione in quanto è necessario valutare le immagini sia senza mezzo di contrasto sia dopo la sua somministrazione, in modo da poter valutare al meglio la vascolarizzazione, caratterizzare alcune masse sospette, evidenziare i parenchimi e studiare il funzionamento dell'apparato urinario. Ciò può comportare l'esposizione a notevoli dosi di radiazioni ionizzanti.[49]

Il fegato e le vie biliari possono essere studiate tramite TC alla ricerca e per la caratterizzazione di lesioni focali benigne (come cisti ed emangiomi) o maligne (epatocarcinoma e colangiocarcinoma) e metastasi. La particolare vascolarizzazione del fegato (sistema portale) richiede spesso l'effettuazione di due o tre



Tomografia computerizzata dell'addome ricostruita nei vari piani dello spazio

scansioni a distanza di alcuni minuti per valutare la diffusione del mezzo di contrasto nel tempo.[50]

Il pancreas viene studiato perlopiù per la diagnosi di pancreatite acuta e cronica, nonché per i vari tumori che lo possono colpire.[51]

L'apparato urinario ben si presta a essere studiato con la TC. Acquisizioni effettuate pochi istanti dopo la somministrazione di mezzo di contrasto permettono di visualizzare ottimamente le arterie renali e la porzione corticale del rene. Dopo circa 80 secondi dalla somministrazione è possibile visualizzare al meglio la regione midollare renale e osservare quindi le parti più interne dell'organo. Dopo alcuni minuti, il mezzo di contrasto dovrebbe aver percorso gli ureteri e raggiunto la vescica, quindi immagini ottenute in questo momento possono dimostrare o meno la funzionalità renale e la pervietà delle vie escretrici.[52][53]

Altri organi e strutture pelviche possono essere studiate tramite TC, alla ricerca di cisti, neoplasie, malformazioni, ecc. Tuttavia, vista la non indifferente dose di radiazioni, spesso si preferiscono (almeno in prima istanza) altre metodiche di imaging come l'ecografia e la risonanza magnetica. Discorso a parte può essere fatto per il colon il quale, grazie ai progressi negli algoritmi di ricostruzione delle immagini, può essere studiato tramite colonscopia virtuale che permette, senza il fastidio e i rischi della colonscopia tradizionale, di ricercare malformazioni, ostruzioni, diverticoli, patologie infiammatorie (diverticolite, malattia di Crohn, colite ulcerosa, ecc.), polipi e neoplasie.[54] In certi contesti, la colonscopia virtuale è stata proposta anche come indagine di *screening* per il carcinoma del colon-retto.[55][56]

Riproduci file multimediale

Video che mostra una colonscopia virtuale del retto e del sigma

Infine, tutti gli organi addominali possono essere valutati tramite TC in caso di un forte trauma che possa far sospettare delle lesioni a essi.

Studio delle ossa e delle articolazioni

Nonostante l'affermazione della risonanza magnetica nucleare per lo studio delle articolazioni abbia ridotto il campo di applicazione della tomografia computerizzata, la velocità di quest'ultima associata alla possibilità di ricostruzioni tridimensionali, hanno permesso alla TC di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella diagnosi di fratture complesse e nelle situazioni di urgenza.[57] Tra i distretti ossei più studiati in TC sempre più spesso vi è il bacino.[58] Nonostante tutto ciò, soprattutto per motivi radioprotezionistici e di costi, le fratture di più semplice diagnosi vengono valutate tramite radiografia tradizionale, relegando la tomografia per le situazioni dubbie e nei casi in cui non si abbia un paziente collaborante.[59][60]

Sicuramente l'elemento scheletrico (l'osso) è la porzione anatomica studiabile in TC con i migliori risultati, tuttavia, in particolari casi selezionati, l'utilizzo di mezzo di contrasto, sia per via endovenosa sia per iniezione intrarticolare, permette la visualizzazione degli elementi cartilaginei, muscolari e legamentosi.

Ricostruzione tridimensionale ottenuta tramite tomografia computerizzata che mostra la frattura del piatto tibiale

Talvolta la TC può essere utilizzata come supporto per procedure come la biopsia ossea e il trattamento degli osteomi.[61] La metodica può essere, inoltre, utilizzata anche per la diagnosi e la valutazione in corso di trattamento dell'osteoporosi.[62]

Inoltre anche la colonna vertebrale, nonostante la risonanza magnetica sia considerata il *gold standard* per molte sue patologie, può essere studiata in TC, in particolare alla ricerca di ernia del disco, protrusioni, fratture o crolli vertebrali nonché patologie neoplastiche.[63] Le ricostruzioni sui vari piani dello spazio sono spesso indispensabili per una corretta diagnosi.[64][65]

Altri utilizzi

Ambito industriale

In ambito industriale, la tomografia computerizzata a raggi X viene utilizzata principalmente per produrre rappresentazioni, sia interne che esterne, tridimensionali di componenti. Gli scopi principali di queste applicazioni sono la ricerca di eventuali difetti, l'analisi dei guasti, la metrologia, l'analisi degli assiemi, il metodo degli elementi finiti basato su immagini[66] e le applicazioni di ingegneria inversa. Le scansioni TC sono impiegate anche nell'imaging e nella conservazione degli oggetti museali.[67]

La tomografia computerizzata ha trovato anche applicazione nella sicurezza dei trasporti (prevalentemente nella sicurezza aeroportuale) dove è attualmente utilizzata in un contesto di analisi dei materiali per il rilevamento di esplosivi.[68][69][70][71] Talvolta si ricorre a particolari algoritmi basati sulla visione artificiale in grado di analizzare le immagini prodotte dai tomografi per rilevare automaticamente oggetti potenzialmente pericolosi come, ad esempio, armi da fuoco, coltelli, contenitori di liquidi.[72][73][74]

Impiego in geologia

La tomografia computerizzata viene abitualmente utilizzata negli studi geologici per rivelare rapidamente il contenuto di un campione ottenuto tramite carotaggio.[75] I minerali densi come la pirite e la barite appaiono più luminosi mentre quelli meno densi, come l'argilla, appaiono opachi nelle immagini TC.[76]

Conservazione dei beni culturali

Note

1. ^ Herman, G. T., *Fundamentals of computerized tomography: Image reconstruction from projection*, 2nd edition, Springer, 2009
2. ^ *Computed tomography — Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary*, su *merriam-webster.com*. URL consultato il 18 agosto 2009.

3. ^ Smith-Bindman R, Lipson J, Marcus R, *et al.*, *Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer*, in *Arch. Intern. Med.*, vol. 169, n. 22, dicembre 2009, pp. 2078-86, DOI:10.1001/archinternmed.2009.427, PMID 20008690.
4. ^ Magda Bosch de Basea, Jane A. Salotti e Mark S. Pearce, *Trends and patterns in the use of computed tomography in children and young adults in Catalonia — results from the EPI-CT study*, in *Pediatric Radiology*, vol. 46, 2016, pp. 119–129, DOI:10.1007/s00247-015-3434-5. URL consultato il 16 settembre 2021.
5. ^ Brenner DJ, Hall EJ, *Computed tomography--an increasing source of radiation exposure*, in *N. Engl. J. Med.*, vol. 357, n. 22, novembre 2007, pp. 2277-84, DOI:10.1056/NEJMra072149, PMID 18046031.
6. Mazzucato, p. 1479.
7. ^ Caroline Richmond, *Obituary – Sir Godfrey Hounsfield*, in *BMJ*, vol. 329, n. 7467, 2004, p. 687, DOI:10.1136/bmj.329.7467.687.
8. *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 Allan M. Cormack, Godfrey N. Hounsfield*, su *nobelprize.org*. URL consultato il 19 luglio 2013.
9. Beckmann EC, *CT scanning the early days* (**PDF**), in *TheBritish Journal of Radiology*, vol. 79, n. 937, gennaio 2006, pp. 5-8, DOI:10.1259/bjr/29444122, PMID 16421398 (archiviato dall'url originale il 19 settembre 2011).
10. ^ Ibid. Pag. 34
11. ^ Filler, Aaron G., *The History, Development and Impact of Computed Imaging in Neurological Diagnosis and Neurosurgery: CT, MRI, and DTI*, in *The Internet Journal of Neurosurgery*, vol. 7, n. 1, 2010, DOI:10.5580/23c6.
12. Mazzucato, p. 1480.
13. ^ Hounsfield GN, *Computerized transverse axial scanning (tomography). 1. Description of system*, in *Br J Radiol*, vol. 46, n. 552, 1973, pp. 1016-22, DOI:10.1259/0007-1285-46-552-1016, PMID 4757352.
14. ^ (**JA**) Luessenhop AJ, Axelbaum SP, Schellinger D, Ledley RS, *[Design and clinical experience with ACTA scanner (whole body automatic computerized transeverse axial tomographic scanner)]*, in *Rinsho Hoshasen*, vol. 21, n. 2, 1976, pp. 163-8, PMID 944324.
15. ^ A. C. Kak and Malcolm Slaney, Principles of Computerized Tomographic Imaging, IEEE Press, 1988.[1] (http://www.slaney.org/pct/)
16. ^ Spiral CT of the Abdomen, François Terrier, Marianne Grossholz, Christoph D. Becker, Springer, 2000 [2] (http://books.google.it/books?id=6GsGWlHs1_sC&pg=PA14&dq=hounsfield&hl=it&sa=X&ei=k_UdUbaIOaaF4gSByoGgCw&redir_esc=y#v=onepage&q=hounsfield&f=false)
17. ^ *TC* (**PDF**), su *tesionline.it*.
18. ^ Mazzucato, pp. 1480-1482.
19. ^ Mazzucato, p. 1482.
20. ^ Mazzucato, pp. 1482-1483.
21. ^ (**EN**) Shannoun F, Blettner M, Schmidberger H, Zeeb H, *Radiation Protection in Diagnostic Radiology*, in *Dtsch Arztebl Int.*, vol. 105, n. 3, gennaio 2008, pp. 41-46, DOI:10.3238/arztebl.2008.0041, PMC2696677.
22. ^ *La tecnologia dual-source si fa largo nella tomografia - Siemens Italia*, su *stampa.siemens.biz*. URL consultato il 16 aprile 2016.
23. Cei, p. 113.
24. ^ Cei, pp. 114-115.
25. ^ Cei, p. 115.
26. ^ Cei, pp. 116-118, 155-156.
27. ^ Cei, pp. 120-121.

28. ^ Cei, pp. 124-125.
29. ^ Cei, pp. 159-160.
30. ^ Cei, p. 162.
31. ^ Lee SY, Rhee CM, Leung AM, Braverman LE, Brent GA, Pearce EN, *A review: Radiographic iodinated contrast media-induced thyroid dysfunction*, in *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, vol. 100, n. 2, 2015, pp. 376-83, DOI:10.1210/jc.2014-3292, PMC 4318903, PMID 25375985.
32. ^ Mazzucato, p. 1586.
33. ^ Cei, p. 169.
34. ^ Mazzucato, pp. 1669-1670.
35. ^ Cei, p. 189.
36. Cei, p. 183.
37. ^ Cei, p. 180.
38. ^ Cei, pp. 177-178.
39. ^ Cei, pp. 183,187-188.
40. ^ Cei, p. 193.
41. ^ Kinno M, Nagpal P, Horgan S, Waller AH, *Comparison of Echocardiography, Cardiac Magnetic Resonance, and Computed Tomographic Imaging for the Evaluation of Left Ventricular Myocardial Function: Part 2 (Diastolic and Regional Assessment)*, in *Curr Cardiol Rep*, vol. 19, n. 1, 2017, p. 6, DOI:10.1007/s11886-017-0816-3, PMID 28116679.
42. ^ Dweck MR, Williams MC, Moss AJ, Newby DE, Fayad ZA, *Computed Tomography and Cardiac Magnetic Resonance in Ischemic Heart Disease*, in *J. Am. Coll. Cardiol.*, vol. 68, n. 20, 2016, pp. 2201-2216, DOI:10.1016/j.jacc.2016.08.047, PMID 27855810.
43. Jelnin V, Kliger C, Zucchetta F, Ruiz CE, *Use of Computed Tomography to Guide Mitral Interventions*, in *Interv Cardiol Clin*, vol. 5, n. 1, 2016, pp. 33-43, DOI:10.1016/j.iccl.2015.08.003, PMID 27852480.
44. ^ Mazzucato, pp. 1743-1749.
45. Cei, p. 202.
46. ^ Mazzucato, pp. 1761-1764.
47. ^ Cei, p. 196.
48. ^ Cei, pp. 205-205.
49. ^ Cei, p. 213.
50. ^ Cei, pp. 215-217.
51. ^ Cei, pp. 210, 220.
52. ^ Cei, pp. 244-245.
53. ^ Mazzucato, pp. 1853-1855.
54. ^ Cei, pp. 264-265, 270-271.
55. ^ Heiken JP, Peterson CM, Menias CO, *Virtual colonoscopy for colorectal cancer screening: current status*, in *Cancer Imaging*, 5 Spec No A, 2005, pp. S133–9, DOI:10.1102/1470-7330.2005.0108, PMC 1665314, PMID 16361129.
56. ^ (**EN**) Johns Hopkins, *Virtual Colonoscopy for Cancer Screening*, su *hopkinsmedicine.org*. URL consultato il 17 febbraio 2017.
57. ^ Cei, p. 275.
58. ^ Cei, p. 285.
59. ^ Trainham L, Rizzolo D, Diwan A, Lucas T, *Emergency management of high-energy pelvic trauma* , in *JAAPA*, vol. 28, n. 12, 2015, pp. 28-33, DOI:10.1097/01.JAA.0000473359.00222.a0, PMID 26561350.
60. ^ Cei, p. 289.

61. ^ Cei, p. 278.
62. ^ Oei L, Koromani F, Rivadeneira F, Zillikens MC, Oei EH, *Quantitative imaging methods in osteoporosis*, in *Quant Imaging Med Surg*, vol. 6, n. 6, 2016, pp. 680-698, DOI:10.21037/qims.2016.12.13, PMC 5219969, PMID 28090446.
63. ^ Cei, p. 298.
64. ^ Zheng G, Li S, *Medical image computing in diagnosis and intervention of spinal diseases*, in *Comput Med Imaging Graph*, vol. 45, 2015, pp. 99-101, DOI:10.1016/j.compmedimag.2015.08.006, PMID 26364266.
65. ^ Cei, pp. 298-299.
66. ^ Ll. M. Evans, L. Margetts, V. Casalegno, L. M. Lever, J. Bushell, T. Lowe, A. Wallwork, P. Young e A. Lindemann, *Transient thermal finite element analysis of CFC–Cu ITER monoblock using X-ray tomography data*, in *Fusion Engineering and Design*, vol. 100, 28 maggio 2015, pp. 100-111, DOI:10.1016/j.fusengdes.2015.04.048 (archiviato il 16 ottobre 2015).
67. ^ Payne, Emma Marie, *Imaging Techniques in Conservation* (**PDF**), in *Journal of Conservation and Museum Studies*, vol. 10, n. 2, 2012, pp. 17-29, DOI:10.5334/jcms.1021201.
68. ^ P. Babaheidarian e D. Castanon, *Joint reconstruction and material classification in spectral CT*, in *Anomaly Detection and Imaging with X-Rays (ADIX) III*, 2018, p. 12, DOI:10.1117/12.2309663, ISBN 978-1-5106-1775-9.
69. ^ P. Jin, E. Haneda, K. D. Sauer e C. A. Bouman, *A model-based 3D multi-slice helical CT reconstruction algorithm for transportation security application* (**PDF**), in *Second International Conference on Image Formation in X-Ray Computed Tomography*, giugno 2012. URL consultato il 5 aprile 2015 (archiviato dall'url originale l'11 aprile 2015).
70. ^ P. Jin, E. Haneda e C. A. Bouman, *Implicit Gibbs prior models for tomographic reconstruction* (**PDF**), in *Signals, Systems and Computers (ASILOMAR), 2012 Conference Record of the Forty Sixth Asilomar Conference on*, IEEE, novembre 2012, pp. 613-636. URL consultato il 5 aprile 2015 (archiviato dall'url originale l'11 aprile 2015).
71. ^ S. J. Kisner, P. Jin, C. A. Bouman, K. D. Sauer, W. Garms, T. Gable, S. Oh, M. Merzbacher e S. Skatter, *Innovative data weighting for iterative reconstruction in a helical CT security baggage scanner* (**PDF**), in *Security Technology (ICCST), 2013 47th International Carnahan Conference on*, IEEE, ottobre 2013. URL consultato il 5 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 10 aprile 2015).
72. ^ Megherbi, N., Flitton, G.T. e Breckon, T.P., *A Classifier based Approach for the Detection of Potential Threats in CT based Baggage Screening* (**PDF**), in *Proc. International Conference on Image Processing*, IEEE, settembre 2010, pp. 1833-1836, DOI:10.1109/ICIP.2010.5653676, ISBN 978-1-4244-7992-4. URL consultato il 5 novembre 2013.
73. ^ Megherbi, N., Han, J., Flitton, G.T. e Breckon, T.P., *A Comparison of Classification Approaches for Threat Detection in CT based Baggage Screening* (**PDF**), in *Proc. International Conference on Image Processing*, IEEE, settembre 2012, pp. 3109-3112, DOI:10.1109/ICIP.2012.6467558, ISBN 978-1-4673-2533-2. URL consultato il 5 novembre 2013.
74. ^ Flitton, G.T., Breckon, T.P. e Megherbi, N., *A Comparison of 3D Interest Point Descriptors with Application to Airport Baggage Object Detection in Complex CT Imagery* (**PDF**), in *Pattern Recognition*, vol. 46, n. 9, settembre 2013, pp. 2420-2436, DOI:10.1016/j.patcog.2013.02.008. URL consultato il 5 novembre 2013.
75. ^ *Laboratory | About Chikyu | The Deep-sea Scientific Drilling Vessel CHIKYU*, su *jamstec.go.jp*. URL consultato il 24 ottobre 2019.
76. ^ (**EN**) Satoshi Tonai, Yusuke Kubo, Man-Yin Tsang, Stephen Bowden, Kotaro Ide, Takehiro Hirose, Nana Kamiya, Yuzuru Yamamoto, Kiho Yang, Yasuhiro Yamada e Yuki Morono, *A New Method for Quality Control of Geological Cores by X-Ray Computed Tomography: Application in IODP Expedition 370*, in *Frontiers in Earth Science*, vol. 7, 2019, DOI:10.3389/feart.2019.00117, ISSN 2296-6463.

Bibliografia

- G. Cittadini, *Diagnostica per immagini e radioterapia*, IV edizione, Genova, Edizioni culturali internazionali, 2002, ISBN 978-88-7544-138-8.
- R. Pozzi Mucelli, *TC e TC spirale nella pratica clinica*, Napoli, Idelson Gnocchi editori, 2000, ISBN 978-88-7947-284-5.
- (EN) Alfidi R.J., *Computed Tomography of the human body*, 1977.
- (EN) Alfidi R.J., *Symposium on Wole Body Tomography*, 1977.
- (EN) Alfidi R.J., *Medical Imaging Tecniques: A Comparison*, 1997.
- Fernando Mazzucato, *Anatomia radiologica*, vol. 3, Piccin, 2009, ISBN 978-88-299-1980-2.
- Luigi Cei, *Tecniche di Tomografia Computerizzata e di Risonanza Magnetica*, II edizione, SEU, 2011, ISBN 978-88-6515-016-0.

Voci correlate

- Ecotomografia
- Fusion imaging
- Imaging a risonanza magnetica
- Mezzo di contrasto
- Stratigrafia (radiologia)
- Radiografia tradizionale
- Radiografia computerizzata
- Ring artifact
- Risonanza magnetica nucleare
- Tac delle coronarie
- Tomografia ottica a coerenza di fase
- Tomografia computerizzata cone beam

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**TAC**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **TAC (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Computed_tomography?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Tomografia computerizzata*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Godfrey Hounsfield (https://www.nobelprize.org/medicine/laureates/1979/hounsfield-autobio.html), premio Nobel.
- Allan M. Cormack (https://www.nobelprize.org/medicine/laureates/1979/cormack-autobio.html), premio Nobel.
- *Informazioni cliniche e immagini di Tomografia Computerizzata*, su *neurorad.unipa.it*. URL consultato il 27 agosto 2005 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2007).

- Variazioni anatomiche e casi clinici con immagini di Tomografia Computerizzata (http://www.ctcases.net) - CT Cases.net
- Il ricordo della prima T.A.C. a cui ha assistito la neurologa Rosa Urcioli (http://www.memoro.org/it/video.php?ID=49), da *Memoro - la Banca della Memoria* (http://www.memoro.org)
- *Associazione Italiana di Bioingegneria*, su *aibio.it*.
- *Uso appropriato della TC nei bambini (articolo in Inglese)*, su *acr.org*. URL consultato l'8 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2012).
- *Principi alla base della formazione dell'immagine diagnostica in medicina* (**PDF**), su *fisica.unisa.it*.

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 25037 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=25037) · GND (**DE**) 4113240-3 (https://d-nb.info/gnd/4113240-3) · NDL (**EN**, **JA**) 00976418 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00976418)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomografia_computerizzata&oldid=125963612"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 27 feb 2022 alle 23:56.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Angiografia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**angiografia** (da greco *angeion* per *vaso* e *graphein* per *scrivere, rappresentare*) è la rappresentazione a scopo diagnostico dei vasi sanguigni o linfatici del corpo umano tramite una tecnica che prevede l'infusione di un mezzo di contrasto idrosolubile all'interno dei vasi e la generazione di immagini mediche tramite varie tecniche di imaging biomedico.

Angiografia

Procedura diagnostica

Angiogramma tramite radiografia con mezzo di contrasto radio-opaco iodato delle arterie coronarie del lato sinistro del cuore.

Tipo	Esame radiologico
Anestesia	No
ICD-9-CM	88.68 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=88.68&Submit=Search&action=search) e 88.40 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=88.40&Submit=Search&action=search)
MeSH	D000792 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D000792)

Indice

Introduzione

Storia

Tecniche di angiografia classica

Angiografo biplano

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Introduzione

Le tecniche angiografiche comprendono la radiografia (specificamente nella tecnica dell'angiografia sottrattiva, o DSA da *Digital Subtraction Angiography*), la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, l'ecografia.

L'angiografia può essere una tecnica più o meno invasiva a seconda del vaso che si intende visualizzare. Normalmente, l'arteriografia e la coronarografia vengono eseguite tramite l'introduzione di un catetere a partire da un vaso principale (ad esempio una arteria femorale o una carotide) fino a raggiungere il distretto desiderato, e l'introduzione del mezzo di contrasto direttamente in loco. Tale tecnica è alla base anche di procedure terapeutiche che fanno parte della radiologia interventistica.

Invece, le angiografie eseguite tramite risonanza magnetica (MRA, *Magnetic Resonance Angiography*) vengono normalmente eseguite tramite infusione di un mezzo di contrasto intravenoso, oppure, in alcuni casi, senza alcun mezzo di contrasto (come nelle tecniche di risonanza magnetica dell'angiografia a tempo

di volo e dell'angiografia a contrasto di fase).

Storia

Il neurologo portoghese Egas Moniz, vincitore del premio Nobel nel 1949, ideò nel 1927 la tecnica dell'angiografia cerebrale a raggi X con mezzo di contrasto per diagnosticare diversi tipi di disturbi nervosi, come tumori e malformazioni arterovenose. È generalmente riconosciuto come uno dei pionieri in questo campo.

Con l'introduzione della tecnica Seldinger nel 1953, la procedura divenne decisamente più sicura, in quanto non ci fu più bisogno di lasciare all'interno del lume dei vasi strumenti appuntiti.

Tecniche di angiografia classica

Gli esami angiografici più comuni vengono tuttora ottenuti tramite raggi X e mezzi di contrasto radio-opachi. Questi ultimi si rendono necessari in quanto il sangue ha normalmente lo stesso coefficiente di attenuazione per le radiazioni X dei tessuti circostanti.

Le immagini radiografiche ottenute possono essere statiche – fissate su fluoroscopio o su pellicola, utili a ottenere informazioni morfologiche su una zona – oppure dinamiche, normalmente con una risoluzione di 30 immagini al secondo, che consentono di visualizzare anche la velocità con cui il bolo di mezzo di contrasto si muove all'interno del vaso e quindi di valutare la funzionalità del vaso stesso.

Normalmente, alle immagini evidenziate dal mezzo di contrasto viene sottratta un'immagine ottenuta prima dell'introduzione dell'agente di contrasto stesso, per rimuovere la contaminazione di strutture statiche dall'immagine che appariranno con la stessa intensità prima e dopo l'introduzione del mezzo di contrasto. Questa tecnica viene denominata angiografia sottrattiva o DSA (*Digital Subtraction Angiography*).

Angiografo biplano

Quale alternativa al tradizionale angiografo monoplano, è in uso a diversi ospedali l'angiografo biplano. Questa apparecchiatura radiologica permette, per mezzo di specifici software, di ricostruire immagini tridimensionali dei vasi, di mostrare più precisamente la sede e la tipologia dell'occlusione, evidenziare quali sono le aree non irrorate correttamente. Queste funzionalità consentono procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate in un campo come quello della cura dell'ictus e degli aneurismi. L'angiografo consente anche l'esecuzione di esami simil TC direttamente in sala angiografica permettendo, per esempio, una diagnosi tempestiva di eventuali complicanze emorragiche. Questa tecnologia ha permesso di potenziare tutta l'attività diagnostica ed interventistica con particolare riferimento al trattamento della patologia cerebrovascolare, nonché delle patologie del distretto body e vascolare periferico.

Bibliografia

- Valli Guido; Coppini Giuseppe. *Bioimmagini* 2ª ed. Bologna, Pàtron, 2005. ISBN 978-88-555-2838-2

Voci correlate

- Angioma

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**angiografia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file sull'**angiografia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Angiography?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Angiografia*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 28470 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=28470) · LCCN (EN) sh85005025 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85005025) · GND (DE) 4002030-7 (https://d-nb.info/gnd/4002030-7) · BNF (FR) cb11930896j (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930896j) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11930896j) · J9U (EN, HE) 987007294854005171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007294854005171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007294854005171)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Angiografia&oldid=124204436"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 nov 2021 alle 11:26.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Imaging a risonanza magnetica

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'***imaging* a risonanza magnetica** (*Magnetic Resonance Imaging*, **MRI**), detto anche **tomografia a risonanza magnetica** (*Magnetic Resonance Tomography*, **MRT**) o **risonanza magnetica tomografica** (**RMT**), oppure semplicemente **RM**, è una tecnica di generazione di immagini usata prevalentemente a scopi diagnostici in campo medico, basata sul principio fisico della risonanza magnetica nucleare.

L'aggettivo "nucleare" si riferisce al fatto che il segnale di densità in RM è dato dal nucleo atomico dell'elemento esaminato, mentre, nelle più diffuse tecniche di imaging radiologico, la densità radiografica è determinata dalle caratteristiche degli orbitali elettronici degli atomi colpiti dai raggi X. Questa ulteriore specificazione non introduce ambiguità ed evita inoltre equivoci con il decadimento nucleare, fenomeno col quale la RM non ha alcunché in comune.

L'RM non è dannosa nei confronti del paziente, e quest'ultimo non è sottoposto a radiazioni ionizzanti come nel caso delle tecniche facenti uso di raggi X o di isotopi radioattivi. Le informazioni date dalle immagini di risonanza magnetica sono essenzialmente di natura diversa rispetto a quelle degli altri metodi di *imaging*, infatti è possibile la discriminazione tra tessuti sulla base della loro composizione biochimica, inoltre si hanno immagini delle sezioni corporee su tre piani diversi (assiale, coronale, sagittale), il che però non le conferisce la tridimensionalità.

Vi sono diverse applicazioni dell'imaging a risonanza magnetica, ad esempio l'imaging a risonanza magnetica in diffusione e la risonanza magnetica funzionale. Gli svantaggi dell'utilizzo di questa tecnica sono principalmente i costi e i tempi necessari all'acquisizione delle immagini.

Imaging a risonanza magnetica

Procedura medica



Immagine sagittale di un ginocchio ottenuta mediante risonanza magnetica

Classificazione e risorse esterne	
ICD-9	88.91 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=88.91&Submit=Search&action=search)
MeSH	D008279 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D008279)

Sinonimi

Risonanza magnetica nucleare, MRI, RMI, MRT, RM

Indice

Storia

Principi fisici

MRI dal punto di vista medico

- Rischi per la salute

Tecnologia

- Magnete principale
- Bobine di gradiente

Geometria delle bobine di gradiente
Rumore acustico
Bobine ausiliarie
Bobine di *shimming*
Bobine di schermatura (*shielding*)
Procedura di imaging
Imaging
Selezione della "fetta" (slice)
Codifica in frequenza
Codifica di fase
Sequenze di base
Saturation Recovery
Inversion Recovery
Spin-Echo
Modalità di *imaging* (contrasti)
Diffusione
Riassunto sequenze principali
Impiego clinico
Encefalo
Rachide lombosacrale
Fegato, pancreas e vie biliari
Rene, vie urinarie, vasi renali, surrene
Milza
Intestino tenue e crasso
Mammella
Risonanza magnetica cardiaca
Aorta toraco-addominale
Apparato locomotore
Artefatti tipici
Aliasing
Artefatti da movimento
Artefatti da radiofrequenze
Ringing (o artefatto di Gibbs)
Chemical shift
Dipendenti dal mezzo di contrasto
Disomogeneità del campo magnetico
Note
Bibliografia
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni

Uno scanner per l'MRI da 3 Tesla.

Storia

Scanner *Mark One*, la prima apparecchiatura per risonanza magnetica costruita e usata

Nel 1971 alla *Stony Brook University*, Paul Lauterbur provò ad applicare gradienti di campo magnetico in tutte e tre le dimensioni e una tecnica di retroproiezione per creare immagini. Le prime immagini di due tubi d'acqua ottenute con questa tecnica vennero pubblicate sulla rivista *Nature*, seguite dalla foto di un animale vivente, una vongola e, nel 1974, dall'immagine della cavità toracica di un topo. Lauterbur chiamò questo suo metodo "zeugmatografia", un termine che è stato successivamente sostituito da "imaging a risonanza magnetica".[1] Alla fine degli anni '70, i fisici Peter Mansfield e Paul Lauterbur svilupparono tecniche particolari, come la tecnica di imaging eco-planare (EPI).[2]

I progressi effettuati nella tecnologia dei semiconduttori si sono rivelati fondamentali per lo sviluppo della risonanza magnetica nella pratica che, infatti, richiede una grande quantità di potenza computazionale. Ciò è stato reso possibile dalla rapida crescita del numero di transistor su un singolo circuito integrato.[3] Mansfield e Lauterbur hanno ricevuto il premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2003 per le loro "scoperte sull'imaging a risonanza magnetica".[4]

Principi fisici

Il principio di funzionamento si basa sul sottoporre il paziente ad un forte campo magnetico statico. L'intensità del campo magnetico può variare dai decimi di tesla, per piccole macchine dedicate allo studio delle articolazioni, a 3 tesla per le macchine attualmente in commercio per scopi diagnostici. Alcune macchine per la risonanza magnetica funzionale attualmente in commercio raggiungono campi di 7 T, mentre nell'ambito sperimentale sono in sviluppo dispositivi da 8 e 9 T.

Nel campo magnetico statico, gli spin dei protoni all'interno dei tessuti tendono ad allinearsi alle linee di forza (in modo parallelo o antiparallelo); poiché gli spin allineati in senso parallelo sono in numero superiore, i tessuti acquisiscono una leggera magnetizzazione totale. Questo allineamento non è mai totale, ma piuttosto gli spin dei vari protoni incominciano a mostrare una precessione attorno alla direzione del campo magnetico.

Questa precessione mostra una frequenza tipica detta frequenza di Larmor che si trova nell'ordine dei MHz e quindi nel campo della radiofrequenza (per un campo di 1 T, la frequenza è di 42 MHz per l'atomo di idrogeno); se allora sul paziente viene applicato un campo magnetico rotante a questa esatta frequenza e di energia sufficiente, è possibile ruotare la magnetizzazione dei protoni di un angolo arbitrario (detto *flip angle*) che dipende dal tipo di immagini che si desidera ottenere.

Il fornire questa energia alla stessa frequenza di precessione è il fenomeno che dà il nome "risonanza" al metodo; si tratta dello stesso principio per cui fornendo la spinta al momento giusto, si può aumentare l'ampiezza delle oscillazioni di un'altalena, seppur nel nostro caso applicato a livello atomico.

Dopo l'impulso, gli spin dei protoni tenderanno a tornare al loro stato iniziale di allineamento lungo il campo (fenomeno di rilassamento); tramite una bobina ricevente viene misurato l'andamento della magnetizzazione nel piano perpendicolare al campo magnetico principale (*Free Induction Decay*, o *FID*). Tale rilassamento avviene con due costanti di tempo distinte: la prima, indicata con t_1, indica la rapidità con cui si ricostruisce la magnetizzazione diretta lungo la direzione del campo principale, e dipende dall'interazione tra protoni e le molecole circostanti (*rilassamento spin-reticolo*), la seconda, indicata con t_2, indica la rapidità con cui si distrugge la componente di magnetizzazione trasversale in condizioni ideali, e dipende dall'interazione mutua di protoni vicini (*rilassamento spin-spin*). In situazioni reali, la componente trasversa viene distrutta a causa della perdita di coerenza di fase tra i vari protoni del campione osservato, con un tempo chiamato $t_2^* < t_2$. Essendo espressione di proprietà fisiche diverse, queste costanti sono funzioni dell'intensità del campo magnetico e, in generale, indipendenti l'una dall'altra.

In teoria, sarebbe possibile effettuare misurazioni rilevando il segnale emesso da una grande varietà di nuclei atomici, come ad esempio il sodio, il fosforo, il carbonio e l'idrogeno, impostando la frequenza di risonanza delle bobine a radiofrequenza al valore appropriato. Tuttavia in campo diagnostico viene attualmente usato quasi esclusivamente l'idrogeno come fonte di segnale.

MRI dal punto di vista medico

A prima vista, un'immagine di risonanza è simile a un'immagine ottenuta tramite tomografia computerizzata (TC). Esternamente le attrezzature per una TC e per una risonanza spesso sono simili: la principale differenza è la lunghezza del tubo in cui viene inserito il paziente, più piccola nel caso della TC, generalmente maggiore nel caso della MRI. In entrambe il paziente, su un lettino motorizzato, viene inserito in un anello. Nonostante questa sia la forma più comune per una macchina di risonanza magnetica umana, altre geometrie sono possibili (a ferro di cavallo o quadrata, ad esempio).

Il paziente non deve assolutamente indossare oggetti di materiale metallico potenzialmente ferromagnetico, quali orologi, bracciali, catenine; particolare attenzione deve essere posta per accertarsi che il paziente non abbia subito in passato incidenti in seguito ai quali schegge metalliche possano essere rimaste alloggiate nei tessuti, od operazioni chirurgiche che abbiano previsto l'impianto di materiali simili. Oggetti di materiale ferromagnetico immersi in un campo magnetico intenso subiscono forze rilevanti che possono provocarne lo spostamento con conseguente danno ai tessuti, ad esempio nel caso delle schegge che si trovassero vicino a vasi sanguigni; anche in assenza di tale rischio la presenza di materiale ferromagnetico, alterando il campo elettromagnetico cui sono sottoposti i tessuti, può causare un anomalo riscaldamento dei tessuti circostanti, con conseguente possibile danno.

La presenza di protesi, clip vascolari, stent, stimolatori cardiaci o altri apparati medico-chirurgici può, in molti casi, impedire l'esecuzione o la corretta lettura dell'esame. Dagli anni 1990 vengono utilizzati sempre più spesso materiali RM-compatibili,[5] ma l'aumentare della potenza degli apparecchi rende tale problema ancora attuale: occorre per tal motivo conoscere, per ogni materiale utilizzato, fino a che intensità del campo magnetico è da considerarsi RM-free.

Le immagini di risonanza magnetica hanno normalmente dimensioni da 256×256 pixel (immagini cardiache) a 1024×1024 pixel (immagini cerebrali ad alta risoluzione) per una profondità di 16 bit/pixel. Questo comporta una risoluzione spaziale intrinseca piuttosto bassa (particolari di 1 mm sono praticamente al limite della visibilità), ma l'importanza di questo esame sta nel fatto di poter discriminare, per esempio, tra un tessuto del fegato ed uno della milza (che rispetto ai raggi X presentano la stessa trasparenza), oppure i tessuti sani dalle lesioni. I tempi di scansione sono molto più lunghi rispetto alle altre tecniche radiologiche (un esame completo di risonanza magnetica dura da 30 a 60 minuti), e la risoluzione temporale è generalmente piuttosto bassa (qualche immagine al secondo per le risoluzioni spaziali inferiori).

Animazione RMN dell'encefalo in un caso di un glioblastoma prima dell'intervento, un esempio di acquisizione su diversi piani anatomici



Trasversale

Sagittale



Coronale

Una caratteristica fondamentale della risonanza è la possibilità di variare il tipo di contrasto dell'immagine semplicemente modificando la sequenza di eccitazione che la macchina esegue. Ad esempio è possibile evidenziare oppure sopprimere il segnale dovuto al sangue, oppure ottenere informazioni di carattere funzionale invece che semplicemente morfologico.

La risonanza magnetica è una tecnica di imaging multiplanare, in quanto si possono acquisire immagini su piani assiali, coronali o sagittali e multiparametrica, in quanto i parametri di riferimento utilizzabili sono sia la densità protonica che i tempi di rilassamento t_1 e t_2.

Rischi per la salute

L'indagine di risonanza magnetica, in quanto non comporta l'assorbimento di radiazioni ionizzanti da parte del paziente, è indicata rispetto alla tomografia computerizzata quando non c'è necessità di avere un'altissima risoluzione spaziale. Inoltre risulta più utile in caso di lesioni localizzate in tessuti vicini a strutture ossee, che potrebbero non essere rilevabili attraverso i raggi X. Viene preferita alla tomografia computerizzata anche in particolari categorie di pazienti (donne in gravidanza, bambini) nei quali si preferisce evitare l'esposizione a raggi X per ragioni radioprotettive.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza per gli operatori, per i pazienti e per il personale di servizio sono fondamentali le procedure di controllo su tutti i materiali ferromagnetici.

Per gli operatori, non sono ancora stati dimostrati danni per la salute derivanti dalla permanenza in campi statici, sebbene tutte le normative attuali ne contemplino il rischio (vedasi il Decreto Europeo 35 - giugno 2013), indicando nel Datore di Lavoro il diretto responsabile.

Esistono strumenti portatili (chiamati impropriamente "dosimetri") per il campionamento a lungo termine del campo magnetico.

Tecnologia

Uno scanner commerciale è principalmente formato da elementi che creano campi magnetici statici oppure variabili nel tempo e nello spazio, coordinati da una complessa elettronica di controllo. Tali elementi sono:

1. il magnete principale, la cui funzione è creare un campo magnetico statico e omogeneo di elevata intensità per permettere la polarizzazione dei nuclei;
2. le bobine a radiofrequenza, che generano il campo magnetico rotante alla frequenza di Larmor;
3. le bobine di gradiente, che generano campi magnetici che variano linearmente nello spazio, indispensabili alla generazione di immagini;
4. varie bobine ausiliarie, che servono a compensare le eventuali disomogeneità o per modificare in altro modo le geometrie dei campi principali.

Magnete principale

Il magnete principale è il componente più grande e costoso dello scanner, e tutto il resto dello scanner può essere considerato ausiliario ad esso. La sua funzione è quella di creare un campo magnetico costante nello spazio e nel tempo. La specifica più importante di un magnete per l'imaging a risonanza magnetica è l'intensità del campo prodotto. Campi magnetici di maggiore intensità aumentano il rapporto segnale/rumore (SNR) dell'immagine, permettendo risoluzioni più alte o scansioni più rapide. Tuttavia, intensità più alte richiedono magneti più costosi e con costi di manutenzione più elevati, oltre ad avere bisogno di misure di sicurezza più accurate. Al momento (2007), campi magnetici a 1,5 T sono considerati un buon compromesso tra costo e prestazioni per l'uso clinico generale. Sta comunque iniziando l'introduzione di campi magnetici a 3 T soprattutto per applicazioni di risonanza magnetica funzionale cerebrale o per l'imaging cardiaco. Alcuni studi

sono in corso per ciò che riguarda l'imaging sull'uomo con campi magnetici a 7 T ed è attualmente in costruzione uno scanner *whole-body* (cioè in grado di effettuare l'imaging di ogni distretto corporeo) a 11,7 T (progetto Neurospin francese[6]). Per esperimenti su cavie e piccoli animali, campi magnetici fino a 17 T sono attualmente usati.

Un'apparecchiatura per risonanza magnetica a elettromagnete a superconduttore

Un parametro altrettanto importante per valutare la qualità di un magnete è la sua omogeneità: le fluttuazioni nell'intensità del campo all'interno della regione osservata dovrebbero essere inferiori allo 0,001%.

Tre tipi di magnete sono usati:

Un magnete permanente per risonanza magnetica

- magnete permanente: magneti convenzionali fatti di materiali ferromagnetici (ad esempio acciaio) possono essere usati per ottenere il campo principale. Magneti di questo tipo sono estremamente ingombranti (con un peso che può superare le 100 tonnellate), ma una volta installati necessitano di pochi costi di manutenzione. I magneti permanenti possono raggiungere solo intensità di campo limitate (normalmente inferiori a 0,4 T) ed hanno stabilità nel tempo ed omogeneità non eccellenti. Pongono inoltre problemi di sicurezza, in quanto il campo magnetico non può essere mai disattivato.
- elettromagnete resistivo: si tratta di un solenoide di cavo di rame. I vantaggi di questo tipo di magnete sono il basso costo, ma l'intensità di campo è limitata e la stabilità scarsa. L'elettromagnete richiede una corrente elettrica notevole per mantenere attivo il campo, il che lo rende costoso da utilizzare. Questa soluzione è in generale obsoleta.
- elettromagnete a superconduttore: quando una lega di niobio-titanio è raffreddata da elio liquido a 4 K, essa diventa superconduttiva, cioè riduce la propria resistenza elettrica a zero. Costruendo un elettromagnete con cavo superconduttivo, è possibile ottenere intensità di campo molto alte con ottime caratteristiche di stabilità. La costruzione di un tale magnete è estremamente costosa, e l'elio per il raffreddamento è costoso e molto difficile da maneggiare. Tuttavia, nonostante il costo, magneti a superconduttore raffreddati ad elio sono i più comunemente usati negli scanner moderni. Nonostante l'isolamento termico, il calore presente nell'ambiente attorno allo scanner causa una lenta ebollizione ed evaporazione dell'elio liquido. Di conseguenza è necessario rabboccare regolarmente l'elio. Per questo motivo, un criostato può essere usato per ricondensare l'elio che evapora. Sono anche attualmente disponibili scanner privi di raffreddamento ad elio, in cui il cavo del magnete è direttamente raffreddato dal criostato.

Unità mobile presso il Glebefields Health Centre di Tipton, Inghilterra

I magneti principali sono disponibili in diverse forme. I magneti permanenti sono più frequentemente fatti a forma di ferro di cavallo, mentre quelli a superconduttore sono in genere toroidali. Tuttavia sono a volte usati anche magneti permanenti quadrati e magneti a superconduttore a ferro di cavallo.

Bobine di gradiente

Componente fondamentale di uno scanner per l'imaging sono le "bobine di gradiente", avvolgimenti in cui la corrente che vi scorre è modulata a seconda delle direttive della sequenza di eccitazione, e che hanno lo scopo di modificare l'intensità del campo magnetico lungo i tre assi spaziali. La loro caratteristica principale è la

generazione di campi magnetici che variano linearmente di intensità lungo una direzione, e sono uniformi rispetto alle altre due.

Ad esempio, attivando solo la bobina di gradiente lungo l'asse Z (convenzionalmente la direzione in cui è orientato il campo magnetico principale), si avrà all'interno del magnete un campo uniforme in ogni piano XY, mentre nella direzione Z varierà secondo la formula $B_0 + G_z z$, dove B_0 è l'intensità iniziale del campo magnetico, e G_z è l'intensità del gradiente, misurata in T/m. Valori tipici per i sistemi di gradienti degli scanner attualmente in commercio vanno da 20 mT/m fino a 100 mT/m. In pratica considerando uno scanner che abbia una zona utile per l'imaging (*field of view*) lunga 50 cm, e un'intensità di campo di 1,5 T, quando una bobina di gradiente da 20mT/m è attiva alla massima intensità, si avranno 1,495 T ad un'estremità e 1,505 T all'altra.

L'effetto delle bobine di gradiente è quello di modificare la frequenza di risonanza dei nuclei in maniera dipendente dalla posizione spaziale. Questo concetto è alla base della generazione di immagini.

Geometria delle bobine di gradiente

La maggior parte degli scanner attualmente in commercio hanno un magnete a superconduttore di forma toroidale. Per questo motivo le bobine di gradiente hanno geometrie diverse a seconda della direzione spaziale in cui sono attive (vedi figura), così da poter essere integrate nella struttura dello scanner. A causa della diversa forma geometrica, le prestazioni delle bobine non sono uguali. In generale la bobina diretta lungo l'asse Z produce un campo magnetico più omogeneo e lineare, in quanto è solenoidale e le equazioni che regolano il campo in queste condizioni sono di soluzione relativamente semplice.



Rappresentazione schematica della geometria delle bobine di gradiente in uno scanner toroidale. In viola, la bobina agente lungo l'asse Z, in verde e arancio le bobine agenti lungo gli assi X e Y

Tuttavia, a causa delle proprietà fisiche del campo magnetico, è impossibile ottenere un campo perfettamente lineare ed orientato in un'unica direzione. In particolare, la terza equazione di Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

nega la possibilità di creare un campo variabile linearmente nello spazio senza che si formino campi varianti in modo diverso orientati nelle altre direzioni spaziali (detti campi concomitanti o campi di Maxwell). Per questo motivo, le bobine di gradiente, per quanto ben progettate, non possono mantenere una qualità uniforme in tutto lo spazio disponibile per l'imaging, e nella pratica sono necessari alcuni interventi di correzione dell'immagine finale che tengano conto della non idealità del campo. In particolare, i campi concomitanti aumentano di intensità in maniera proporzionale al quadrato della distanza dal centro del magnete, e sono soprattutto visibili nelle immagini di fase.

Rumore acustico

L'accensione, lo spegnimento e la commutazione delle bobine di gradiente provoca un cambiamento nella forza di Lorentz sperimentata dalle bobine di gradiente, attraverso espansioni e contrazioni minute delle stesse. La commutazione è tipicamente nella gamma delle frequenze udibili, pertanto la vibrazione risultante produce una sensazione acustica costituita da un ticchettio o da una serie di *bip*. Questa è più marcata con macchinari ad alto campo e con le tecniche di imaging rapido in cui il livello di pressione sonora può raggiungere i 120 dB (equivalenti a un motore a reazione al decollo) per un magnete da 3 T, e quindi una protezione acustica (cuffia o tappi auricolari) adeguata è essenziale per il paziente durante l'esame MRI.[7][8][9][10]

Bobine ausiliarie

Attorno al magnete principale si trovano anche altre bobine oltre alle bobine di gradiente, che hanno la funzione di migliorare le caratteristiche del sistema stesso.

Bobine di *shimming*

Queste bobine hanno lo scopo di creare campi magnetici tali da annullare le imperfezioni e non linearità del campo magnetico principale, in modo da renderlo più omogeneo e quindi mantenere il più costante possibile la frequenza di Larmor nella zona di cui si vuole fare l'imaging.

Al posto di bobine controllate elettronicamente, o più spesso in aggiunta ad esse, si utilizza anche uno "shimming passivo", costituito da elementi in materiale ferromagnetico posti nei dintorni del campo magnetico principale, che ne distorcono le linee di flusso.

Bobine di schermatura (*shielding*)

Queste bobine possono essere comandate autonomamente (schermatura attiva) oppure essere semplici avvolgimenti accoppiati induttivamente con le bobine di gradiente.

Lo scopo di questi avvolgimenti consiste nel generare un campo magnetico che si annulli col campo primario o col campo prodotto dalle bobine di gradiente nei punti in cui non è desiderato un effetto magnetico, ad esempio all'esterno del magnete.

Nonostante non siano noti effetti nocivi di un campo magnetico statico sui tessuti organici, almeno alle intensità usate per l'imaging diagnostico, è buona norma cercare di ridurre i campi indesiderati, sia per motivi precauzionali che per la salvaguarda delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nei dintorni dello scanner ed all'interno dello scanner stesso. I campi magnetici variabili creano nei materiali conduttori delle correnti indotte (dette eddy currents, letteralmente "correnti a vortice" perché scorrono lungo linee circolari) che possono creare interferenza nelle apparecchiature ed effetti biologici negli esseri viventi, in quanto interferiscono con il debole campo elettrico dei neuroni, creando stimolazioni periferiche dei motoneuroni o, nei casi più gravi, disturbi temporanei alla vista fino alla stimolazione delle fibre cardiache, con rischio di fibrillazione ventricolare.

Procedura di imaging

Una successione di impulsi a radiofrequenza e di applicazione di gradienti costituisce le cosiddette "sequenze di impulsi" o "sequenze di eccitazione". Gli impulsi a radiofrequenza hanno la funzione di perturbare l'equilibrio degli spin e di generare il segnale, mentre gli impulsi di gradiente influenzano la frequenza e la fase del segnale ricevuto, e sono necessari all'ottenimento dell'immagine.

Imaging

La generazione di immagini avviene attraverso la ripetuta acquisizione di segnali provenienti dal corpo, e attraverso l'opportuna modulazione delle bobine di gradiente. Facendo in modo che ogni voxel dell'immagine abbia una frequenza e/o una fase diversa rispetto a tutti gli altri, si riescono a separare i segnali provenienti da una singola porzione.

L'imaging avviene attraverso tre processi separati:

1. la selezione di una "fetta" (slice);
2. la codifica in frequenza;
3. la codifica di fase.

Selezione della "fetta" (slice)

L'applicazione di un gradiente lungo una direzione, fa sì che la frequenza di Larmor degli atomi vari linearmente lungo quella direzione. Come conseguenza, il corpo all'interno del magnete viene suddiviso in piani isofrequenziali paralleli. Un impulso radio a una specifica frequenza (monocromatico) applicato mentre il gradiente è attivo, ecciterà un solo piano, lasciando in condizione di equilibrio tutti gli altri.



Rappresentazione del meccanismo di selezione della fetta. L'applicazione del gradiente fa variare linearmente la frequenza di Larmor all'interno del volume. Un impulso radio monocromatico eccita solamente un piano del volume.

Codifica in frequenza

Applicando un gradiente dopo l'impulso a radiofrequenza e durante l'acquisizione del segnale emesso, si varia linearmente lungo lo spazio la frequenza di emissione da parte dei protoni. Il segnale acquisito è la somma di segnali a frequenze diverse, le quali possono essere ottenute tramite la trasformata di Fourier. Facendo corrispondere ad ogni frequenza una posizione spaziale, si ottiene una localizzazione in una dimensione. Per localizzare gli spin anche nella seconda direzione spaziale, è necessario utilizzare la codifica di fase.



Rappresentazione schematica della codifica in frequenza.

Codifica di fase

Il gradiente nella seconda direzione spaziale viene applicato dopo l'impulso a radiofrequenza ma prima dell'acquisizione. Gli spin lungo quella direzione al momento dell'acquisizione avranno acquistato una fase pari a $f_L G_y y t$ dove f_L è la frequenza di Larmor, y è la coordinata lungo l'asse della codifica e t è il tempo di applicazione del gradiente. Una sola codifica di fase non è sufficiente per ottenere informazioni spaziali, per questo è necessario che la sequenza venga ripetuta un certo numero di volte per ottenere un campionamento significativo lungo la direzione della fase.

Sequenze di base

Diversi tipi di sequenze portano ad immagini che evidenziano caratteristiche diverse dei tessuti; in particolare due sequenze classiche servono ad individuare rispettivamente il t_1 ed il t_2. Entrambe si basano sull'applicazione di due impulsi a radiofrequenza in grado di far ruotare il vettore magnetizzazione nello spazio di 90° e 180°, ma i due impulsi vengono emessi in ordine inverso nelle due sequenze. Esse prendono il nome di *Inversion Recovery* e di *Spin-Echo*. L'applicazione di un solo impulso capace di ruotare la magnetizzazione di 90° produce una sequenza di nome *Saturation Recovery*.

Saturation Recovery

In questa sequenza viene applicato un solo impulso in grado di ruotare il vettore magnetizzazione di 90° (impulso a 90°), portando tutta la magnetizzazione presente sull'asse parallelo al campo principale, sul piano trasverso. La precessione di questo vettore produce un segnale oscillante monocromatico alla frequenza di Larmor, che si attenua secondo una legge esponenziale con costante di tempo t_{2*}, chiamato segnale di decadimento libero dell'induzione (*Free Induction Decay*, o semplicemente FID):

$$M(t) = M_0 \cos(2\pi\nu_L t) e^{-t/T_2^*}$$

dove M_0 è la magnetizzazione presente sull'asse longitudinale al momento dell'impulso a 90°, ν_L è la frequenza di Larmor e *t* il tempo trascorso. Se il sistema era in condizioni di equilibrio al momento dell'impulso, allora M_0 dipende solo dalla densità degli spin (densità protonica), se la sequenza viene ripetuta in maniera rapida (TR nell'ordine di t_1), il sistema non ha il tempo di tornare allo stato di equilibrio, e quindi la magnetizzazione iniziale sarà quella che si è riuscita a ripristinare nel tempo TR, e quindi dipendente da t_1. Per questo motivo, sequenze con TR molto piccoli sono in generale definite t_1-pesate.

Inversion Recovery

In questa sequenza vengono applicati due impulsi a radiofrequenza per ogni ripetizione (più gli impulsi di gradiente per ottenere l'immagine come visto poco sopra), il primo a 180°, ed il secondo, dopo un tempo t_I, a 90°.

Il primo impulso non produce nessun segnale, in quanto la magnetizzazione cambia di verso ma si mantiene parallela al campo magnetico principale; tuttavia, essa tenderà a riacquistare il verso originario secondo una legge esponenziale data dalla seguente formula:

$$M(t) = M_0(1 - 2e^{-t/t_1})$$

All'istante t_I, la magnetizzazione lungo la direzione parallela all'asse principale viene ruotata fino a portarsi nel piano trasverso, in cui inizierà il moto di precessione. Questo moto, genera un segnale di intensità proporzionale al modulo del vettore magnetizzazione, e quindi proporzionale a $|1 - 2e^{-t_I/t_1}|$. Come si osserva, dal momento che t_I è un parametro scelto dall'operatore, l'intensità del segnale dipende dal parametro fisico t_I e dal vettore magnetizzazione iniziale M_0, proporzionale alla densità protonica. Se si vuole ottenere una misura esatta di questi parametri, sono necessarie più scansioni con diversi T_I seguiti da un'operazione di regressione nonlineare.

Lo scopo principale delle sequenze Inversion Recovery è la soppressione del segnale del tessuto adiposo (*fat suppression*) oppure del sangue (*black blood*), in quanto scegliendo un t_I pari a $t_1 \ln(2)$, il segnale proveniente dal tessuto corrispondente al t_1 scelto viene annullato. Per ottenere una valida soppressione del grasso il valore tipico nelle apparecchiature da 1,5 T (attualmente le più diffuse) è di circa 150–170 ms.

Spin-Echo



schema dei segnali RF nella sequenza di spin echo

Anche in questo caso vengono usati due impulsi RF a 90° e 180°, ma stavolta vengono applicati in ordine inverso rispetto alla sequenza di *inversion recovery*. Il primo segnale a 90° ruota tutta la magnetizzazione nel piano trasverso rispetto al campo magnetico applicato, e produce un segnale FID che tende a zero con la costante di tempo t_{2*}. Applicando dopo un certo intervallo di tempo TE/2 un impulso a 180°, il verso in cui gli spin precedono cambia. Siccome ogni spin si trova immerso nello stesso campo magnetico precedente, esso "tornerà indietro" con la stessa velocità di prima, causando un "riavvolgimento" delle fasi e una riacquisizione della coerenza da parte del segnale. Al tempo TE gli spin saranno tutti di nuovo in fase, e si

produrrà un'eco, la cui ampiezza massima sarà inferiore all'ampiezza del FID registrato precedentemente, in quanto nel frattempo gli spin avranno ricevuto un certo decadimento t_2. In pratica, il modulo del vettore magnetizzazione trasversa al tempo TE sarà pari a:

$$M(T_E) = M_0 e^{-T_E/T_2}$$

producendo quindi un'eco di ampiezza proporzionale a tale valore. In maniera simile al caso precedente, i parametri fisici da cui dipende l'ampiezza di questo segnale sono il tempo di rilassamento t_2 e la densità protonica.

Modalità di *imaging* (contrasti)

A differenza di altre tecniche di imaging, che permettono la raccolta di informazioni su una sola grandezza fisica (attenuazione ai raggi X nelle tecniche radiografiche, concentrazione di tracciante nelle tecniche di medicina nucleare ecc.), l'*imaging* a risonanza magnetica produce immagini che rispecchiano differenti proprietà fisiche, a seconda del tipo di sequenza utilizzata. Immagini di differenti grandezze fisiche vengono dette avere differente *contrasto*.

Le modalità di imaging più comuni e storicamente precedenti rispetto alle altre sono quattro:

- densità protonica;
- pesata t_1;
- pesata t_2;
- pesata t_2*;

Per avere un'analisi morfologica completa della regione oggetto di indagine, almeno due di questi contrasti (ad esempio t_1 e t_2) vengono acquisiti. Agenti di contrasto paramagnetici come il gadolinio hanno la proprietà di ridurre notevolmente il t_1 dei tessuti con cui vengono a contatto, di conseguenza immagini con questo contrasto possono efficacemente mettere in risalto le zone raggiunte dall'agente. Questo è utile, ad esempio, per l'ottenimento di angiogrammi, e per la visualizzazione di emorragie.

Il contrasto t_2 identifica particolarmente bene siero, acqua e liquido cefalorachidiano, e viene utilizzato per valutare se ci sono edemi associati a particolari lesioni.

Di seguito sono riportati esempi di tempi di rilassamento longitudinale e trasversale per alcuni tessuti biologici (il tempo T_1 è riferito ad un campo magnetico statico di 1,5 tesla)[11]:

Tessuto biologico	T_2	T_1 (a 1,5 T)
Sostanza grigia	101	920
Sostanza bianca	76	780
Liquido cerebrospinale	1660	3270
Muscoli scheletrici	47	860
Cuore	57	860
Fegato	43	520
Reni	58	1220
Milza	62	1070
Grasso sottocutaneo	85	230

La visualizzazione standard delle immagini a risonanza magnetica in scala di grigi si presenta come segue:

Segnale	T1-pesato	T2-pesato
Alto	▪ Grasso[12][13] ▪ Emorragia subacuta[14] ▪ Melanina[14] ▪ Fluidi ricchi di proteine[14] ▪ Sangue a scorrimento lento[14] ▪ Sostanze paramagnetiche, come gadolinio, manganese, rame[14] ▪ Necrosi corticale pseudo-laminare[14]	▪ Tessuti contenenti molta acqua,[12] come nell'edema, nei tumori, nell'infarto, nell'infiammazione e nell'infezione[14] ▪ Metaemoglobina situata in zona extracellulare nelle emorragie subacute[14]
Intermedio	Materia grigia più scura rispetto alla materia bianca[15]	Materia bianca più scura rispetto alla materia grigia[15]
Basso	▪ Osso[16] ▪ Urina ▪ Liquido cerebrospinale ▪ Aria[12] ▪ Tessuti contenenti molta acqua,[12] come nell'edema, nei tumori, nell'infarto, nell'infiammazione, nell'infezione, nelle emorragie croniche o iperacute[14] ▪ Bassa densità protonica, come nelle calcificazioni[14]	▪ Osso[12] ▪ Aria[12] ▪ Grasso[12] ▪ Basa densità protonica come nelle calcificazioni e nella fibrosi[14] ▪ Materiali paramagnetici come deossiemoglobina, metaemoglobina intracellulare, ferro, ferritina, emosiderina, melanina[14] ▪ Fluidi ricchi di proteine[14]

Diffusione

Questo tipo di *imaging* misura la diffusione delle molecole d'acqua nel tessuti biologici.[17] In un mezzo isotropico (ad esempio in un bicchiere d'acqua), le molecole di liquido si muovono di moto browniano casuale. Invece nei tessuti biologici la diffusione può essere anisotropica. Ad esempio una molecola d'acqua all'interno di un assone di un neurone ha una probabilità molto bassa di attraversare la membrana mielinica. Di conseguenza la molecola si muoverà principalmente lungo l'asse della fibra neurale. Ribaltando il concetto, se misuriamo che le molecole d'acqua in una certa regione si stanno muovendo (*diffondendo*) lungo una particolare direzione, possiamo assumere che la maggior parte della fibre nella regione sono orientate parallelamente a questa direzione.



Ricostruzione Trattografica delle connessioni neurali via DTI

La tecnica di imaging del tensore di diffusione (*Diffusion tensor imaging*, o *DTI*), permette di misurare la diffusione nelle tre direzioni spaziali e l'anisotropia all'interno del singolo voxel. Questo permette il tracciamento di mappe delle direzioni delle fibre del cervello per esaminare le connessioni tra le varie aree (usando la trattografia), oppure esaminare aree di degenerazione neuronale e demielinizzazione in malattie come la sclerosi multipla.

Un'altra tecnica di misurazione della diffusione è l'imaging pesato in diffusione (*Diffusion-weighted imaging*, o *DWI*). Questa tecnica permette la misurazione della distanza di diffusione delle molecole d'acqua. Più breve è questa distanza, più chiara appare la regione considerata. In seguito a un'ischemia cerebrale, le immagini DWI sono molto sensibili ai cambiamenti patofisiologici che avvengono nella lesione[18] Si pensa che l'aumento delle barriere alla diffusione delle molecole d'acqua come risultato dell'edema citotossico (rigonfiamento delle cellule), sia responsabile dell'incremento del segnale in una scansione DWI. Altre teorie propongono che l'effetto sia dovuto a

cambiamenti nella permeabilità cellulare o al venir meno della flusso citoplasmatico dipendente dall'ATP. L'aumento del segnale DWI appare entro 5-10 minuti dall'insorgenza dei sintomi dell'attacco ischemico (in contrasto con la tomografia computerizzata, che normalmente identifica i cambiamenti nei tessuti con un ritardo di 4-6 ore) e rimane per un periodo fino a due settimane. La tomografia computerizzata, per la sua scarsa sensibilità all'ischemia acuta, è normalmente usata per verificare che non ci sia emorragia, che impedirebbe l'uso dell'attivatore tissutale plasminogeno (*t-PA*).

Accoppiato a misure di perfusione cerebrale, alcuni ricercatori sono stati in grado di determinare regioni di discordanza tra perfusione e diffusione, che potrebbero essere recuperate in seguito a terapia di riperfusione del tessuto.

È stato anche proposto che le misure di diffusione tramite MRI potrebbero essere in grado di identificare cambiamenti molto piccoli nella diffusione dell'acqua extracellulare, il che potrebbe avere applicazioni nel campo della risonanza magnetica funzionale: il corpo cellulare di un neurone si ingrandisce quando conduce un potenziale d'azione, impedendo di conseguenza la naturale diffusione delle molecole d'acqua. Nonostante questo processo sia stato provato a livello teorico, le prove sperimentali non sono ancora del tutto convincenti.

Come molte altre applicazioni più avanzate, questa tecnica è normalmente associata a sequenze di eccitazione rapide, come ad esempio l'echo planar imaging.

Riassunto sequenze principali

Oltre alle sequenze di base, sono state sviluppate numerose altre sequenze utili allo studio e alla diagnosi di molteplici patologie. Qui di seguito una tabella in cui si riassumono le principali sequenze utilizzate nell'imaging a risonanza magnetica.

Gruppo	Sequenze	Abbreviazione	Principi fisici	Principali caratteristiche cliniche	Esempio
Spin echo	Pesatura in T1	**T1**	Misurazione del rilassamento longitudinale utilizzando tempo di ripetizione (TR) e tempo di echo (TE) brevi.	▪ Basso segnale proveniente dall'acqua,[12] come nel caso di edema, tumori, ischemia, infiammazione, infezione, emorragie croniche o acute,[14] ▪ Alto segnale dal grasso[12][14] ▪ Alto segnale dalle sostanze paramagnetiche come il gadolinio (utilizzato come mezzo di contrasto in risonanza magnetica[14] Sequenza standard e di confronto per le altre sequenze.	
	Pesatura in T2	**T2**	Misurazione del rilassamento trasversale utilizzando lunghi tempi di TR e TE.	▪ Alto segnale da tessuti ricchi di acqua.[12] ▪ Basso segnale del grasso.[12] ▪ Basso segnale per le sostenza paramagnetiche.[14] Sequenza standard e di confronto per le altre sequenze.	
	Pesatura di densità protonica	**DP**	Lungo tempo di TR (per ridurre il T1) e breve tempo TE (per minimizzare il T2)[19]	Artropatie e traumi muscolo-scheletrici.[20] ▪ Alto segnale dai menischi[21] (vedi immagine)	
Gradient echo	Precessione libera stazionaria	**SSFP**	Mantenimento di una magnetizzazione trasversale costante e residua su cicli successivi.[22]	Realizzazione di cardio RM (vedi video).[22]	
Inversion recovery	Short tau inversion recovery	**STIR**	Soppressione del grasso grazie all'impostazione di un tempo di inversione che annulla il suo segnale.[23]	Alto segnale nell'edema, come nelle più gravi fratture da stress.[24] Nell'immagine un caso di sindrome da stress tibiale	

	Fluid attenuated inversion recovery	**FLAIR**	Soppressione dei liquidi grazie ad un tempo di inversione che annulla il loro segnale.	Alto segnale da infarti lacunari, placche da sclerosi multipla, Emorragia subaracnoidea e meningite (vedi immagine).[25]	
	Double inversion recovery	**DIR**	Soppressione simultanea del liquido cerebrospinale e materia bianca graxei a due tempi di inversione.[26]	Altro segnale dalle placche della sclerosi multipla (vedi immagine).[26]	
Diffusion weighted (**DWI**)	Convenzionale	**DWI**	Misura del moto browniano delle molecole d'acqua.[27]	Alto segnale dopo pochi minuti dall'infarto cerebrale (nella foto).[28]	
	Apparent diffusion coefficient	**ADC**	Riduce la pesatura T2 prendendo multiple immagini DWI con differente pesatura DWI.[29]	Basso segnale pochi minuti dopo un ictus cerebrale (vedi immagini).[30]	
	Tensore di diffusione	**DTI**	Trattografia (nella foto) ottenuta misurando il moto browniano complessivo delle molecole d'acqua nelle direzioni delle fibre nervose.[31]	▪ Valutazione della deformazione della materia bianca dovuta ad un tumore[31] ▪ Una riduzione della anisotropia frazionale può indicare demenza[32]	
Perfusion weighted (**PWI**)	Dynamic susceptibility contrast	**DSC**	Viene iniettato gadolinio come mezzo di contrasto e viene realizzate immagini a rapida ripetizione (generalmente gradient-echo o echo-gradient pesate in T2) per quantificare la perdita di segnale indotta dalla suscettibilità.[33]	Negli infarti cerebrali, il tessuto ischemico e la penombra ischemica presentano una perfusione diminuita (immagine).[34]	
	Dynamic contrast enhanced	**DCE**	Misurazione dell'accorciamento del rilassamento T_1 indotto da un bolo di mezzo di contrasto di gadolinio.[35]		
	Arterial spin labelling	**ASL**	Marcatura magnetica del sangue arterioso		

			prima che entri nella regione di interesse dell'imaging.[36] Non è necessario infondere gadolinio come mezzo di cotrasto.[37]		
Risonanza magnetica funzionale (**fMRI**)	Blood-oxygen-level dependent	**BOLD**	Modifiche nella saturazione di ossigeno dipendente dal magnetismo dell'emoglobina che riflette l'attività del tessuto.[38]	Localizzazione delle aree del cervello più attive prima di un intervento chirurgico.[39]	
Magnetic resonance angiography (**MRA**) e venografia	Time-of-flight	**TOF**	Il sangue che entra nell'area di interesse non è stato saturato e quindi fornisce un segnale più elevato quando viene utilizzato un breve tempo di echo.	Diagnosi di aneurisma, stenosi o dissecazione.[40]	
	Phase-contrast MRA	**PC-MRA**	Due gradienti di uguale intensità ma in direzione opposte vengono usati per codificare lo sfasamento che è proporzionale alla velocità degli spin.[41]	Diagnosi di aneurisma, stenosi o dissecazione (immagine).[40]	 (VIPR)
Susceptibility weighted		**SWI**	Sensibile al sangue e al calcio.	Rilevare piccole emorragie (Nell'immagine un danno assonale diffuso) o il calcio.[42]	

Impiego clinico

L'imaging a risonanza magnetica è utilizzato, in campo medico, per lo studio di diversi organi e per la formulazione di diagnosi di molteplici patologie.

Encefalo

L'encefalo è probabilmente l'organo più studiato tramite risonanza magnetica. Solitamente si ricorre a sequenze pesate in T1 e T2, FLIR, *spin echo*, *inversion recovery*, *fast spin echo* e *gradient recovery*. Possono inoltre essere utilizzate tecniche avanzate, quali la diffusione, sia isotropica che anisotropica (trattografia). Possono essere effettuati studi di perfusione, con o senza mezzo di contrasto. Tali studi valutano i repentini cambiamenti dei vasi sanguigni: tra le tecniche utilizzate ritroviamo la *Dynamic Contrast-Enhanced MRI* pesata in T1 che

utilizza agenti di contrasto basati su gadolinio[43], oppure l'A*rterial Spin Labelling MRI*[44], la quale permette di ottenere immagini di perfusione senza iniezione di mezzo di contrasto con acquisizioni T2/T2*.



Esempio di risonanza magnetica funzionale (ottenuta tramite tecnica BOLD dell'encefalo

Inoltre, un utilizzo è lo studio funzionale del cervello, le cui aree attive possono venire evidenziate in base al segnale *Blood Oxygenation Level Dependent* (BOLD)[45], dipendente dal grado di ossigenazione del sangue. Ma la RM rappresenta solo l'ultima fase dell'attività cerebrale, essendo una tecnica che rileva il movimento dei protoni: l'attività nervosa può essere infatti così scomposta:

- attività nervosa: studiata mediante l'elettroencefalogramma;
- spostamento delle correnti ioniche;
- attivazione della pompa sodio potassio con consumo di ATP;
- consumo di glucosio per produzione di energia: fase studiabile con la PET;
- formazione dei flussi cerebrali: studio mediante fRM.

Invece, la spettroscopia a risonanza magnetica utilizza il principio del *chemical shift* per ottenere un grafico della biochimica cerebrale.

Lo studio dell'encefalo tramite risonanza magnetica è quello che permette di ottenere la maggior sensibilità alle alterazioni delle strutture. È possibile diagnosticare patologie ischemiche, infiammatorie, neoplastiche, degenerative e congenite. Le tecniche più avanzate, permettono uno studio approfondito valido spesso nella valutazione dei danni da ipoperfusione garantendo un miglior approccio terapeutico e uno studio preoperatorio. Nello specifico, a titolo di esempio, in risonanza magnetica viene studiata la malattia di Alzheimer[46] I FO in questa patologia, la sclerosi multipla, i processi espansivi come i tumori, gli ictus (nel processo finale durante l'edema cerebrale risultante; lo stravaso di sangue dell'ictus emorragico si vede meglio nella tomografia computerizzata), l'analisi per lo studio di tumori cerebrali.

Anche l'ipofisi viene spesso studiata in risonanza magnetica, grazie a sequenze T1 e T2 pesate con e senza saturazione del grasso. Il quesito diagnostico è solitamente la ricerca delle cause sottostanti a una condizione di iperpituitarismo o di un ipopituitarismo.

Rachide lombosacrale

Per lo studio del rachide la risonanza magnetica è la tecnica di *imaging* di elezione, permettendo l'esame di tutti gli elementi che la compongono senza dover ricorrere alla somministrazione di mezzo di contrasto. Generalmente si ricorre a sequenze T1 e T2 con soppressione del grasso mentre con lo studio del midollo spinale e dello spazio sottoaracnoideo si possono utilizzare sequenze mielo-RM.

Fegato, pancreas e vie biliari

L'esame del fegato di base prevede sequenze T1 e T2 dipendenti con e senza soppressione del grasso, prima e dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Quest'ultimo può essere di tipo paramagentico (chelanti di gadolinio) a secrezione renale o epatobiliare e superparamagnetico (basato da particelle di ossido di ferro) che funziona da contrasto negativo in T2 abbattendo il segnale del parenchima sano ed evidenzando quello patologico. Si ricorre a questo esame per studiare patologie focali e diffuse ed in particolare nei pazienti cirrotici che presentano difficoltà di studio tramite ecografia. Si possono analizzare e caratterizzare le cisti, gli angiomi, gli adenomi e le patologie maligne, come l'epatocarcinoma o l'eventuale presenza di metastasi.



Calcoli biliari nel coledoco visti grazie alla risonanza magnetica colangiopancreatografica.

Per quanto riguarda lo studio delle vie biliari, la risonanza è una valida alternativa alla colangio-pancreatografia endoscopica retrograda quando essa non sia eseguibile o non risolutiva per la diagnosi. La risonanza magnetica colangiopancreatografica può essere realizzata senza la somministrazione di mdc ma utilizzando sequenze fortemente pesate in T2 (in grado così di esaltare i liquidi). Le prime applicazioni di questa metodica risalgono ai primi anni 1990 e da allora vi è stata una continua evoluzione. È possibile diagnosticare la malattia di Caroli, la calcolosi biliare, la colecistite acuta e il colangiocarcinoma.

La risonanza è in grado di studiare il parenchima del pancreas alla ricerca di patologie focali o diffuse e anomalie vascolari. L'esame prevede l'acquisizione di immagini assiali e coronali T2 e T2 dipendenti con o senza soppressione del grasso, prima e dopo somministrazione di mdc. Nelle immagini T1 il pancreas presenta iperintensità rispetto agli altri organi vicini, mentre è ipointenso in quelle pesate in T2. Al fine di migliorare le immagini, è possibile somministrare secretina per via endovenosa in grado di stimolare la funzione esocrina della ghiandola con conseguente produzione di succo pancreatico e dilatazione dei vasi.

Rene, vie urinarie, vasi renali, surrene

La risonanza magnetica permette un'ottima differenziazione tra la parte corticale e la parte midollare del rene, poiché la prima ha tempi di rilassamento più brevi per T1 e T2. Questa differenziazione può essere ulteriormente esaltata in un'acquisizione dopo somministrazione di mezzo di contrasto per via venosa, grazie all'ampia vascolarizzazione della corticale rispetto alla midollare, un aspetto che tende a diminuire per il progressivo passaggio del mezzo di contrasto nella midollare e, successivamente, nelle vie escretrici. La risonanza magnetica del rene viene utilizzata per lo studio della patologia cistica (come il rene policistico) e dei tumori benigni e maligni.



Risonanza magnetica di un paziente affetto da rene policistico (i reni sono cerchiati in giallo.

Le vie urinarie possono essere studiate mediante sequenze fortemente pesate in T2 in grado, cioè, di esaltare il segnale proveniente dai liquidi. È necessario che il paziente sia ben idratato prima dell'esame e spesso si procede con la somministrazione di un diuretico (solitamente furosemide).

Lo studio dei vasi arteriosi renali (arteria renale in particolare) avviene solitamente dopo somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio ed è utilizzato maggiormente per la diagnosi di un'ipertensione nefrovascolare dovuta a una stenosi dell'arteria renale.

Un surrene normale, nelle sequenze T1 e T2 pesate, appare simile al fegato. Solitamente, per il suo studio, si realizzano sequenze sul piano coronale e assiale, T1 e T2 con e senza soppressione del grasso. Le indicazioni cliniche per questo tipo di esame sono generalmente incentrate sulla diagnosi iperplasie, mielolipomi, cisti, angiomi, metastasi e carcinomi della corticale.

Milza

Rispetto al parenchima epatico il segnale della milza in T1 appare ipointenso, mentre il segnale T2 iperintenso. Generalmente si prevedono sequenze T1 e T2 con e senza soppressione del grasso; pre e post somministrazione di mezzo di contrasto. Questa tecnica di *imaging* si utilizza per studiare la splenomegalia differenziando tra causa focale o diffusa. Inoltre si possono diagnosticare l'eventuale presenza di cisti ed, in particolare, per la loro eventuale rottura, di infezioni o emorragie, di amartomi, angioma, linfoangiomi, angiosarcomi o linfomi.

Intestino tenue e crasso

Per lo studio dell'intestino tenue solitamente si ricorre alla somministrazione di mezzo di contrasto bifasico che posseggono caratteristiche assibilabili all'acqua e quindi con alto segnale nelle sequenze T2 e a basso in quelle T1. Questi possono essere somministrati *per os* oppure attraverso un sondino nasogastrico posizionato all'altezza dell'angolo del Treitz. La principale applicazione clinica per questa indagine è la diagnosi e il *follow up* della malattia di Crohn.

Al 2018, l'esame del colon tramite risonanza magnetica, ancora è in via di perfezionamento. Solitamente si usa somministrare, nei giorni precedenti, del bario al fine di marcare le feci che poi risultano indistinguibili dall'acqua che viene somministrata prima dell'esecuzione dell'esame, una metodica preferita alla tradizionale pulizia completa del colon.

Per lo studio del retto, principalmente per la stadiazione del tumore del retto, è necessario invece procedere ad un clistere di pulizia antecedentemente all'esame.

Mammella

Risonanza magnetica della mammella

Fino ai primi anni del XXI secolo, si considerava la risonanza magnetica alla mammella una tecnica molto sensibile ma poco specifica, tuttavia oramai si ritiene che possa vantare una capacità diagnostica superiore anche alla mammografia e all'ecografia. Per avere i massimi risultati diagnostici è necessario ricorrere alla somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico (chelati di gadolinio) per via endovenosa ed utilizzare tecniche particolari, come immagini pesate in diffusione. Anche la spettroscopia può essere utile per rilevare la presenza di dati metaboliti aiutando così nella diagnosi. Per esaltare le diversità di tessuto spesso è utile utilizzare anche una soppressione del grasso. La paziente non necessità di particolare preparazione ma deve essere scelto il corretto momento per l'esecuzione in base al ciclo mestruale. La risonanza magnetica della mammella viene utilizzata per la caratterizzazione delle lesioni e per il *follow up* del tumore alla mammella. Trova amplia applicazione nelle pazienti portatrici di protesi mammaria. L'esame è raccomandato alle donne con alto rischio di sviluppare un tumore mammario (ad esempio donne con particolari malattie genetiche come sindrome di Li-Fraumeni e sindrome di Cowden).

Risonanza magnetica cardiaca

A partire dai primi anni del 2000, si è avuta una crescita di indagini al cuore mediante risonanza magnetica. Per realizzare questo tipo di esame è necessario disporre di apparecchiature ad alto campo magnetico (almeno 1 tesla) con accessori che permettono di monitorare il battito cardiaco e la respirazione in modo da sincronizzare l'acquisizione e ridurre gli artefatti da movimento. A volte, soprattutto per gli studi di perfusione miocardica, è necessaria la somministrazione di mezzo di contrasto con cui si otterranno immagini pesate in T1 dove le zone colpite da un evento ischemico appariranno iperintense rispetto alle aree sane. Oltre allo studio della perfusione, spesso conseguente ad un infarto del miocardio, sono molti i quesiti diagnostici per cui si può ricorrere alla risonanza magnetica. Ad esempio, può essere valutata la funzione ventricolare, un'eventuale malattia valvolare, una malattia coronarica, la presenza di cardiomiopatia e miocardite, tumori del cuore, malattie del pericardio e cardiopatie congenite.

Risonanza magnetica cardiaca su piano sagittale.

Aorta toraco-addominale

A partire dai primi anni del 2000, si è assistito a una costante crescita di interesse per la risonanza magnetica nella valutazione dell'aorta toracica e addominale. Lo studio può essere effettuato con o senza somministrazione di mezzo di contrasto a gadolinio, ottenendo immagini sui diversi piani anatomici e tridimensionali. Vi sono diverse applicazioni clinciche per questo esame, ad esempio la caratterizzazione di aneurismi aortici, il riconoscimento di ulcerazioni della parte del vaso, lo studio di eventuali ematomi intramurali e forme infiammatorie come l'arterite di Takayasu o l'identificazione di una dissecazione dell'aorta. Per quanto riguarda l'aorta addominale e le arterie renali è utile anche per identificare casi di ipertensione renovascolare e per lo studio pre e post trapianto di rene.

Apparato locomotore

La Risonanza Magnetica, sia per via del suo elevato contrasto sia per la sua possibilità di studiare la struttura e la vascolarizzazione a livello dei tessuti molli e delle articolazioni, è spesso usata come tecnica di secondo livello rispetto all'ecografia nello studio di questa strutture. Le tecniche RM, pur non consentendo di studiare il tessuto osseo, permettono comunque uno studio accurato del midollo osseo; utile in ambito sia oncologico sia traumatologico.

Artefatti tipici

Come con l'imaging a risonanza magnetica sono possibili molte diverse modalità di acquisizione dell'immagine, esistono parallelamente anche una serie di artefatti, cioè l'apparizione di strutture che non sono effettivamente presenti nell'oggetto osservato, tipici di questa branca della radiologia, e che sono normalmente associati a una non corretta codifica del k-spazio.

Aliasing

Quando il *field of view* nella direzione di codifica di fase dell'immagine acquisita è più piccolo dell'oggetto nello scanner, si ha un fenomeno detto *aliasing*. Le parti dell'oggetto al di fuori dell'area di imaging producono comunque un segnale, ma l'intensità dei gradienti applicati fa sì che esse acquisiscano una fase superiore a 2π. Esse vengono quindi considerate dall'algoritmo ricostruttivo come sovrapposte all'estremità opposta dell'immagine. Questo artefatto viene corretto aumentando la dimensione del *field of view*, sopprimendo il segnale indesiderato tramite *impulsi di saturazione*, oppure tramite algoritmi in grado di riconoscere le sovrapposizioni che sfruttano le diverse intensità ricevute da bobine riceventi poste in punti diversi dello spazio (acquisizione parallela o *parallel imaging*).



Esempio di aliasing: a sinistra una sezione di un fantoccio sferico acquisita con un campo di vista di dimensioni adeguate, a destra lo stesso oggetto acquisito con un campo di vista ridotto.

Artefatti da movimento

I movimenti volontari o involontari (peristalsi, movimento del *liquor*, battito cardiaco, respirazione) del paziente causano artefatti sulle immagini a risonanza magnetica. Questi artefatti si presentano come immagini ad anello o immagini fantasma. Per evitarli sono stati sviluppati diversi metodi, come sensori (sia tramite apparecchiature che utilizzando proprietà dei campi magnetici) che rilevano i movimenti, l'utilizzo di sequenze di acquisizione particolarmente veloci e l'impostazione del gradiente di fase verso la direzione in cui vi è meno movimento.



Artefatti da movimento (Studio coronale in T_1 delle vertebre cervicali

Artefatti da radiofrequenze

Una non perfetta schermatura della sala ove è presente il magnete può comportare il passaggio di radiofrequenze che interagiscono con il campo magnetico principale causando alterazioni visibili come artefatti, solitamente a forma di bande nella direzione della codifica di fase.

Ringing (o artefatto di Gibbs)



Esempio di ringing: accanto ai repentini cambi di intensità si creano delle bande

Quando in un'immagine è presente un repentino cambiamento di contrasto (nell'immagine a fianco una struttura di plastica, che risulta nera nell'immagine, è immersa in acqua), si formano attorno all'interfaccia delle "onde" spaziate ad intervalli regolari. Questo fenomeno prende il nome di *ringing* (o artefatto di Gibbs, dal fisico statunitense Willard Gibbs). Questo è un fenomeno conosciuto anche in teoria dei segnali e dovuto al sottocampionamento in frequenza di un segnale. Per rappresentare una repentina variazione di un segnale nel campo della trasformata di Fourier quale è il k-spazio, sarebbe necessaria l'acquisizione di un infinito numero di campioni. Data l'impossibilità pratica di soddisfare questo requisito, l'interfaccia non appare netta ma presenta queste caratteristiche oscillazioni.

Per eliminare questo artefatto è necessario eseguire la scansione ad una risoluzione più elevata.

Chemical shift

Si nota come la presenza di una banda bianca e una nera nel bordo tra due tessuti con diversa proprietà di *chemical shift* (di solito tra acqua e grasso). Questo artefatto è conseguente alle interazioni che i protoni hanno nella nube elettronica in cui si trovano e che li fanno precedere a una frequenza leggermente diversa. La sua presentazione è direttamente proporzionale con l'intensità del campo magnetico e inversamente proporzionale ai gradienti. Uno dei modi per eliminarlo è utilizzare acquisizioni con soppressione del grasso.

Dipendenti dal mezzo di contrasto

Una scorretta sincronizzazione tra l'arrivo del bolo di mezzo di contrasto e l'acquisizione delle immagini può comportare il verificarsi di particolari artefatti. Ad esempio, l'effetto Maki si presenta con un doppio contorno della parte dei vasi e con una netta ipodensità all'interno. Un'accentuata sfumatura dei contorni delle strutture in esame è invece conosciuto come effetto Blueberring.

Disomogeneità del campo magnetico

La presenza sul corpo del paziente di materiali conduttivi, come clip chirurgiche, protesi dentarie, protesi ortopediche,...) può tradursi in una disomogeneità del campo magnetico che comporterà la presenza di artefatti nell'immagine finale.

Note

1. ^ Rinck PA, *A short history of magnetic resonance imaging*, in *Spectroscopy Europe*, vol. 20, n. 1, 2008, p. 7.
2. ^ Mansfield P, Grannell PK, *"Diffraction" and microscopy in solids and liquids by NMR*, in *Physical Review B*, vol. 12, n. 9, 1975, pp. 3618-34, Bibcode:1975PhRvB..12.3618M, DOI:10.1103/physrevb.12.3618.
3. ^ Bruce Rosenblum e Fred Kuttner, *Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness*, Oxford University Press, 2011, p. 127, ISBN 978-0-19-979295-5.
4. ^ *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2003*, su *nobelprize.org*, Nobel Foundation. URL consultato il 28 luglio 2007 (archiviato il 18 luglio 2007).
5. ^ (**EN**) http://www.mrisafety.com/
6. ^ (**EN**) Neurospin (http://neurospin.org), sito ufficiale del progetto Neurospin.
7. ^ David L. Price, Janet P. De Wilde, Annie M. Papadaki, Jane S. Curran, Richard I. Kitney, <288::AID-JMRI1041>3.0.CO;2-P *Investigation of acoustic noise on 15 MRI scanners from 0.2 T to 3 T*, in *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, vol. 13, n. 2, 2001, pp. 288-293, DOI:10.1002/1522-2586(200102)13:2<288::AID-JMRI1041>3.0.CO;2-P. URL consultato il 19 aprile 2015.
8. ^ Z.H. Cho, S.H. Park, J.H. Kim, S.C. Chung, S.T. Chung, J.Y. Chung, *Analysis of acoustic noise in MRI*, in *Magnetic Resonance Imaging*, vol. 15, n. 7, 1997, pp. 815-822, DOI:10.1016/S0730-725X(97)00090-8. URL consultato il 19 aprile 2015.
9. ^ S. Allen Counter, Ake Olofsson, H. F. Grahn, Erik Borg, *MRI acoustic noise: Sound pressure and frequency analysis*, in *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, vol. 7, n. 3, 1997, pp. 606-611, DOI:10.1002/jmri.1880070327. URL consultato il 19 aprile 2015.
10. ^ M. McJury, R.W. Stewart, D. Crawford, E. Toma, *The use of active noise control (ANC) to reduce acoustic noise generated during MRI scanning: Some initial results*, in *Magnetic Resonance Imaging*, vol. 15, n. 3, 1997, pp. 319-322, DOI:10.1016/S0730-725X(96)00337-2. URL consultato il 19 aprile 2015.
11. ^ Coriasco & Rampado & Bradac, 2014, p. 20.
12. *Magnetic Resonance Imaging*, su *radiology.wisc.edu*, University of Wisconsin. URL consultato il 14 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2017).
13. ^ Keith A. Johnson, *Basic proton MR imaging. Tissue Signal Characteristics*, su *med.harvard.edu*, Harvard Medical School. URL consultato il 14 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).
14. Keith A. Johnson, *Basic proton MR imaging. Tissue Signal Characteristics*, su *med.harvard.edu*, Harvard Medical School. URL consultato il 14 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).
15. Tushar Patil, *MRI sequences*, su *slideshare.net*. URL consultato il 14 marzo 2016.
16. ^ *Magnetic Resonance Imaging*, su *radiology.wisc.edu*, University of Wisconsin. URL consultato il 14 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2017).
17. ^ Le Bihan D, Breton E, Lallemand D, Grenier P, Cabanis E, Laval-Jeantet M, *MR imaging of intravoxel incoherent motions: application to diffusion and perfusion in neurologic disorders*, in *Radiology*, vol. 161, n. 2, novembre 1983, pp. 401-407, 3763909.
18. ^ Moseley ME, Cohen Y, Mintorovitch J, Chileuitt L, Shimizu H, Kucharczyk J, Wendland MF, Weinstein PR, *Early detection of regional cerebral ischemia in cats: comparison of diffusion- and T2-weighted MRI and spectroscopy*, in *Magnetic Resonance in Medicine*, vol. 14, n. 2, maggio 1990, pp. 330-346, 2345513.
19. ^ Page 292 (https://books.google.se/books?id=1pV35-skfkwC&pg=PA292) in: Martin Vosper, Donald Graham, Paul Cloke, *Principles and Applications of Radiological Physics*, 6ª ed., Elsevier Health Sciences, 2011, ISBN 978-0-7020-4614-8.
20. ^ Jeremy Jones and Prof Frank Gaillard et al., *MRI sequences (overview)*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 gennaio 2017.
21. ^ Nicolas Lefevre, Jean Francois Naouri, Serge Herman, Antoine Gerometta, Shahnaz Klouche e Yoann Bohu, *A Current Review of the Meniscus Imaging: Proposition of a Useful Tool for Its Radiologic Analysis*, in *Radiology Research and Practice*, vol. 2016, 2016, pp. 1-25, DOI:10.1155/2016/8329296, ISSN 2090-1941.

22. Dr Tim Luijkx and Dr Yuranga Weerakkody, *Steady-state free precession MRI*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
23. ^ Mohammad Taghi Niknejad, *Short tau inversion recovery*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
24. ^ Ferco Berger, Milko de Jonge, Robin Smithuis and Mario Maas, *Stress fractures*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
25. ^ *Fluid attenuation inversion recoveryg*, su *radiopaedia.org*. URL consultato il 3 dicembre 2015.
26. Dr Bruno Di Muzio and Dr Ahmed Abd Rabou, *Double inversion recovery sequence*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
27. ^ Neuro and Dr Usman Bashir, *Diffusion weighted imaging*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
28. ^ Dr Yuranga Weerakkody and Prof Frank Gaillard et al., *Ischaemic stroke*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
29. ^ Mark Hammer, *MRI Physics: Diffusion-Weighted Imaging*, su *XRayPhysics*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
30. ^ H. An, A. L. Ford, K. Vo, W. J. Powers, J.-M. Lee e W. Lin, *Signal Evolution and Infarction Risk for Apparent Diffusion Coefficient Lesions in Acute Ischemic Stroke Are Both Time- and Perfusion-Dependent*, in *Stroke*, vol. 42, n. 5, 2011, pp. 1276-1281, DOI:10.1161/STROKEAHA.110.610501, ISSN 0039-2499.
31. Derek Smith and Dr Usman Bashir, *Diffusion tensor imaging*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 13 ottobre 2017.
32. ^ Terence C Chua, Wei Wen, Melissa J Slavin e Perminder S Sachdev, *Diffusion tensor imaging in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a review*, in *Current Opinion in Neurology*, vol. 21, n. 1, 2008, pp. 83-92, DOI:10.1097/WCO.0b013e3282f4594b, ISSN 1350-7540.
33. ^ Frank Gaillard et al., *Dynamic susceptibility contrast (DSC) MR perfusion*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 14 ottobre 2017.
34. ^ Feng Chen, *Magnetic resonance diffusion-perfusion mismatch in acute ischemic stroke: An update*, in *World Journal of Radiology*, vol. 4, n. 3, 2012, p. 63, DOI:10.4329/wjr.v4.i3.63, ISSN 1949-8470.
35. ^ Prof Frank Gaillard et al., *Dynamic contrast enhanced (DCE) MR perfusion*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
36. ^ *Arterial spin labeling*, su *University of Michigan*. URL consultato il 27 ottobre 2017.
37. ^ Prof Frank Gaillard et al., *Arterial spin labelling (ASL) MR perfusion*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
38. ^ I-han Chou, *Milestone 19: (1990) Functional MRI*, su *nature.com*, *Nature*. URL consultato il 9 agosto 2013.
39. ^ Dr Tim Luijkx and Prof Frank Gaillard, *Functional MRI*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 16 ottobre 2017.
40. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)*, su *Johns Hopkins Hospital*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
41. ^ Dr J. Ray Ballinger et al., *Phase contrast imaging*, su *Radiopaedia*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
42. ^ Dr Bruno Di Muzio and A.Prof Frank Gaillard, *Susceptibility weighted imaging*, su *radiopaedia.org*. URL consultato il 15 ottobre 2017.
43. ^ (**EN**) Peter Caravan, Jeffrey J. Ellison e Thomas J. McMurry, *Gadolinium(III) Chelates as MRI Contrast Agents: Structure, Dynamics, and Applications*, in *Chemical Reviews*, vol. 99, n. 9, 1999-9, pp. 2293-2352, DOI:10.1021/cr980440x.
44. ^ E T Petersen, I Zimine e Y-C L Ho, *Non-invasive measurement of perfusion: a critical review of arterial spin labelling techniques*, in *The British Journal of Radiology*, vol. 79, n. 944, 1º agosto 2006, pp. 688-701, DOI:10.1259/bjr/67705974.

45. ^ (EN) D. W. Tank, A. R. Kay e T. M. Lee, *Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 87, n. 24, 1º dicembre 1990, pp. 9868-9872, DOI:10.1073/pnas.87.24.9868.
46. ^ Grazie al tensore di diffusione dell'acqua nella sostanza bianca si sta studiando la precoce diminuzione del fascio.

Bibliografia

- Mario Coriasco, Osvaldo Rampado e Gianni Boris Bradac, *Elementi di risonanza magnetica*, Springer, 2014, ISBN 978-88-470-5640-4.
- Valli Guido; Coppini Giuseppe. *Bioimmagini* 2ª ed.. Bologna, Pàtron, 2005. ISBN 978-88-555-2838-2
- Cittadini Giorgio, *Diagnostica per immagini e radioterapia*, Genova, ECIG, 2002, ISBN 978-88-7545-930-7
- (EN) *US3789832*, United States Patent and Trademark Office, Stati Uniti d'America.: Raymond V. Damadian, *Apparatus and Method for Detecting Cancer in Tissue*, 1972 (primo brevetto nel campo dell'MRI)
- (EN) *US3932805*, United States Patent and Trademark Office, Stati Uniti d'America.: Zenuemon Abe, *Method of obtaining internal information of a measuring target from the out-side by the application of a nuclear magnetic resonance phenomenon*, 1973
- (EN) TRTF/EMRF: The history of MRI (Peter A. Rinck, ed). url = http://www.magnetic-resonance.org/ch/20-01.html
- (EN) Guadalupe Portal; Aliosvi Rodriguez Whole body magnetic resonance imaging in early diagnosis in Trinidad BMJ (2010) ISSN 1756-1833 url = http://www.bmj.com/rapid-response/2011/12/19/re-whole-body-magnetic-resonance-imaging
- (EN) Ian L. Pykett, *NMR Imaging in Medicine* (PDF), in *Scientific American*, vol. 246, n. 5, 1º maggio 1982, pp. 78-88, DOI:10.1038/scientificamerican0582-78 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2016).
- (EN) Perry Sprawls, *Magnetic Resonance Imaging Principles, Methods, and Techniques*, Medical Physics Publishing, 2000, ISBN 978-0-944838-97-6.
- (EN) Simon, Merrill e Mattson, James S, *The pioneers of NMR and magnetic resonance in medicine: The story of MRI*, Ramat Gan, Israel, Bar-Ilan University Press, 1996, ISBN 0-9619243-1-4.
- (EN) Haacke, E Mark, Brown, Robert F, Thompson, Michael e Venkatesan, Ramesh, *Magnetic resonance imaging: Physical principles and sequence design*, New York, J. Wiley & Sons, 1999, ISBN 0-471-35128-8.
- (EN) Lee SC, Kim K, Kim J, Lee S, Han Yi J, Kim SW, Ha KS e Cheong C, *One micrometer resolution NMR microscopy*, in *J. Magn. Reson.*, vol. 150, n. 2, giugno 2001, pp. 207-13, Bibcode:2001JMagR.150..207L, DOI:10.1006/jmre.2001.2319, PMID 11384182.
- (EN) P Mansfield, *NMR Imaging in Biomedicine: Supplement 2 Advances in Magnetic Resonance*, Elsevier, 1982, ISBN 978-0-323-15406-2.
- (EN) Eiichi Fukushima, *NMR in Biomedicine: The Physical Basis*, Springer Science & Business Media, 1989, ISBN 978-0-88318-609-1.
- (EN) Bernhard Blümich e Winfried Kuhn, *Magnetic Resonance Microscopy: Methods and Applications in Materials Science, Agriculture and Biomedicine*, Wiley, 1992, ISBN 978-3-527-28403-0.
- (EN) Peter Blümer, *Spatially Resolved Magnetic Resonance: Methods, Materials, Medicine, Biology, Rheology, Geology, Ecology, Hardware*, a cura di Peter Blümler, Bernhard Blümich, Robert E. Botto, Eiichi Fukushima, Wiley-VCH, 1998, ISBN 978-3-527-29637-8.
- (EN) Zhi-Pei Liang e Paul C. Lauterbur, *Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing Perspective*, Wiley, 1999, ISBN 978-0-7803-4723-6.

- (EN) Franz Schmitt, Michael K. Stehling e Robert Turner, *Echo-Planar Imaging: Theory, Technique and Application*, Springer Berlin Heidelberg, 1998, ISBN 978-3-540-63194-1.
- (EN) Vadim Kuperman, *Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Applications*, Academic Press, 2000, ISBN 978-0-08-053570-8.
- (EN) Bernhard Blümich, *NMR Imaging of Materials*, Clarendon Press, 2000, ISBN 978-0-19-850683-6.
- (EN) Jianming Jin, *Electromagnetic Analysis and Design in Magnetic Resonance Imaging*, CRC Press, 1998, ISBN 978-0-8493-9693-9.
- (EN) Imad Akil Farhat, P. S. Belton, Graham Alan Webb e Royal Society of Chemistry (Great Britain), *Magnetic Resonance in Food Science: From Molecules to Man*, Royal Society of Chemistry, 2007, ISBN 978-0-85404-340-8.

Voci correlate

- Mezzo di contrasto
- Risonanza magnetica nucleare
- Risonanza magnetica funzionale
- Medicina nucleare
- Gradient echo
- FLAIR
- Echo-planar imaging
- Turbo spin echo
- Acquisizione parallela

Altri progetti

- Wikiquote contiene citazioni di o su **imaging a risonanza magnetica**
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **imaging a risonanza magnetica (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Magnetic_resonance_imaging?uselang=it)**

Collegamenti esterni

- (EN) Corso online di introduzione all'MRI (https://web.archive.org/web/20130802090126/http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/).
- (EN) Atlante MRI del cervello umano (http://brainmaps.org/index.php?action=viewslides&datid=17).
- (EN) Portale informativo sulla tecnologia MR (http://www.mr-tip.com/).
- (EN) A SHORT HISTORY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING FROM A EUROPEAN POINT OF VIEW (https://web.archive.org/web/20021210120153/http://www.emrf.org/FAQs%20MRI%20History.html).
- (EN) Sito di informazione sulle misure di sicurezza riguardo all'MRI (http://www.mrisafety.com/). Contiene informazioni riguardo alla possibilità di effettuare esami in pazienti con vari tipi di impianti e protesi.
- (EN) Proposed Methodology to Evaluate Unnecessary Imaging (http://www.siaecm.org/radiologia/index.asp).
- (EN) An Excursion into the History of Magnetic Resonance Imaging (http://www.magnetic-resonance.org/sources/Magnetic%20Resonance%2012th%20edition%202018%20Offprint%20History.pdf)

Controllo di	LCCN (EN) sh85079741 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85079741) · GND

autorità	(DE) 4120806-7 (https://d-nb.info/gnd/4120806-7) · BNF (FR) cb120656832 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120656832) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120656832) · J9U (EN, HE) 987007543558105171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007543558105171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007543558105171)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Imaging_a_risonanza_magnetica&oldid=125744586"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 17 feb 2022 alle 06:40.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

RADIOLOGIA PER APPARATI

WIKIPEDIA

Radiologia del sistema osteo-articolare

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia del sistema osteo-articolare** (radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica) consente di indagare numerose patologie a carico dello scheletro, dei muscoli, delle articolazioni, dei tendini e dei legamenti. Ognuna di queste metodiche presenta vantaggi e svantaggi nello studiare una particolare patologia o distretto corporeo.

Indice

Indicazioni
- Radiologia convenzionale
- Ecografia
- Tomografia computerizzata
- Risonanza magnetica

Alterazioni elementari del tessuto osseo
- Alterazioni elementari della struttura ossea
  - Osteoporosi
  - Osteosclerosi
  - Osteolisi
  - Osteonecrosi
  - Osteodistrofia
- Alterazioni elementari della forma ossea

Metodiche radiologiche nelle differenti patologie dell'apparato osteo-articolare

Note

Bibliografia

Indicazioni

Radiologia convenzionale

Questa tecnica permette di studiare in dettaglio la struttura delle ossa sfruttando la forte radiopacità di questo tessuto, dovuta al fatto che il calcio in esso contenuto presenta un numero atomico più elevato degli altri elementi chimici contenuti nei tessuti circostanti. Oltre a permettere l'agevole distinzione fra l'osso compatto e quello spongioso, permettendo di evidenziare eventuali alterazioni strutturali, queste tecniche consentono di studiare anche la forma e i rapporti fra i vari segmenti scheletrici[1].

Ecografia

L'ecografia è la metodica di prima scelta per lo studio dei tessuti molli. Si utilizzano a tal fine sonde lineari ad alta frequenza (7,5-10 MHz) che vanno mantenute perpendicolari ai fasci muscolari durante le indagini per evitare artefatti. La metodica consente di differenziare bene il tessuto muscolare dalle sue guaine di rivestimento, di studiare la struttura dei fasci e di valutarne la vascolarizzazione mediante le metodiche color doppler. Di solito a tal fine si utilizzano scansioni sagittali e assiali.

Lo studio dei tendini è altrettanto accurato (permettendo di evidenziarne anomalie strutturali) e si può fare sia con le stesse sonde utilizzabili sui muscoli sia con sonde di tipo settoriale da 10-15 MHz, utilizzando scansioni longitudinali e assiali lungo il decorso degli stessi. Per migliorare la definizione si possono anche usare dei distanziatori.

Radiografia di un cranio umano in proiezione latero-laterale.


Ricostruzione tridimensionale di una TC toracica con un filtro che visualizza l'osso.

L'ultrasonografia ossea quantitativa (QUS) permette di studiare come il tessuto osseo riflette le onde sonore, permettendo di identificare i soggetti a rischio di fratture. Di solito si studiano, con sonde da 0,1 a 1 MHz, il calcagno e le falangi delle mani. Tale metodica sta venendo posta come alternativa alla densitometria ossea nello studio dei soggetti affetti da osteoporosi[2].

Misurazione ecografica dello spessore del muscolo retto femorale

Tomografia computerizzata


Immagine sagittale di un ginocchio ottenuta mediante risonanza magnetica

Rispetto alla radiologia convenzionale questa tecnica permette non solo di ottenere immagini 3D, ma anche di avere una maggiore risoluzione spaziale. Altro importante vantaggio è che consente di visualizzare bene non solamente l'osso ma anche i tessuti molli circostanti. Il principale uso di questa tecnica è quindi lo studio delle patologie articolari, oncologiche e dei traumi complessi, difficilmente analizzabili con la semplice radiologia convenzionale. Per lo studio di muscoli e tendini tuttavia questa metodica non è quella di prima scelta a causa della non ottimale risoluzione in contrasto[3].

Risonanza magnetica

Il tessuto osseo, avendo al suo interno poche molecole d'acqua, non è direttamente visualizzabile mediante le metodiche RM (il segnale visibile in tale sede è interamente dovuto al midollo osseo). La RM eccelle nello studio dei tessuti molli e delle articolazioni (cartilagine, legamenti, tendini, muscoli, menischi, ecc.). In oncologia la RM permette di evidenziare bene l'invasione midollare e l'estensione delle lesioni neoplastiche ai tessuti molli[4].

Alterazioni elementari del tessuto osseo

L'osso può essere alterato sia nella sua struttura sia nella sua forma. La radiologia convenzionale è l'esame che classicamente consente di rilevare le alterazioni strutturali, ed è basandosi su questa metodica che sono state definite le alterazioni elementari della struttura dell'osso (differenti alterazioni, da sole o in combinazione, sono presenti nei vari quadri clinici). Le alterazioni di forma possono invece essere congenite o acquisite, a seconda delle differenti patologie.

Alterazioni elementari della struttura ossea

Sono divise in *qualitative* e *quantitative*.

Le alterazioni quantitative sono caratterizzate da mantenimento della normale struttura ossea, ma con associato deficit o incremento della radiopacità. In caso di aumento della radiopacità (e quindi rarefazione della struttura ossea) si parla quindi di *osteoporosi*, al contrario si parla invece di *osteosclerosi*. Altre alterazioni dello stesso tipo sono l'*osteolisi* (in cui il tessuto osseo distrutto è occupato da tessuto di altro tipo, in tal caso si osserverà una lacuna nelle lesioni studiate), l'*osteonecrosi* (in tal caso si può osservare distribuzione disordinata della matrice minerale ossea per morte della componente organica) e la *periostosi* (in cui si ha proliferazione alterata del periostio).

Le alterazioni *qualitative* della struttura ossea sono invece definite *osteodistrofia* (in tale caso si ha sostituzione del tessuto osseo normale con tessuto fibroso)[5].

Osteoporosi

È causata dalla perdita di massa ossea. Per essere rilevabile dalla radiologia convenzionale l'entità di tale perdita deve essere pari almeno al 30-40% del totale. Per tale ragione la radiologia convenzionale consente di evidenziare questo fenomeno solo in fase tardiva (al contrario della densitometria ossea, per questo utilizzata nella diagnosi precoce). L'osteoporosi si differenzia dall'*osteopenia* per il grado di perdita (si parla di osteoporosi solo se la perdita è maggiore di 2,5 deviazioni standard rispetto alla popolazione sana). Rispetto all'*osteomalacia* nell'osteoporosi il rapporto fra matrice minerale e organica è conservato. Radiologicamente l'osso affetto si mostra molto nitido, con evidenza di poche trabecole residue a livello dell'osso spongioso, più evidenti lungo le linee di forza. Lo spazio midollare risulta aumentato di volume e si perde la distinzione fra osso corticale e spongioso, con iper-evidenza del primo che risalta sulla relativa radiotrasparenza del secondo. Spesso sono evidenti anche segni di microfratture (come strie radiopache trasversali e deformazione dei profili ossei). L'osteomalacia si ha per alterazioni nella deposizione della matrice minerale. Solo nel bambini influenza anche le cartilagini di accrescimento e porta al rachitismo. Nell'adulto può essere secondaria a deficit nutrizionali (forma *primitiva*) o dovuta a problemi renali (forma *secondaria*). In tutti i casi radiologicamente si osserva sfumatura del disegno trabecolare, formazioni di orli osteoidi e assottigliamento della corticale, con contemporanea presenza di fratture patologiche e deformazioni. Nel rachitismo (malattia dell'età infantile causata da deficit di vitamina D) le lesioni sono più gravi e interessano anche le cartilagini di accrescimento (in tale caso si osserva sfrangiamento, spezzettamento e irregolarità della zona di apposizione di nuovo osso). Nelle zone sottoposte a carico è possibile osservare anche una deformazione "a coppa", mentre a livello sterno-costale è visibile il *rosario*

radiografia di una mano normale (A Scafoide, B semilunare, C piramidale, D Pisiforme, E Trapezio, F Trapezoide, G Capitato, H Uncinato)

costale rachitico (dovuto a rammollimento dello sterno in tali sedi). Sono evidenti anche deformazioni di carico dffuse, cifosi e scoliosi. Anche nello scorbuto (dovuto a carenza di Vitamina C) è possibile evidenziare segni radiologici tipici[6].

Osteoporosi a livello della mano e del polso. Si noti la relativa radiotrasparenza e rarefazione delle trabecole ossee rispetto all'immagine a sinistra

Osteosclerosi

L'addensamento della struttura ossea si può presentare secondo 3 modalità: l'*ossificazione*, l'*affastellamento* e il *collasso*.

Nell'ossificazione si ha aumento di deposizione di matrice. Se ciò avviene nel contesto dell'osso trabecolare si parla di *spongiosclerosi*. Se il processo avviene a livello dell'osso compatto si parla invece di endostosi (in tal caso si ha riduzione degli spazi midollari) o *periostosi* (con modificazione di dimensioni e forma delle ossa coinvolte).

Nell'affastellamento la struttura dell'osso viene riorganizzata senza produzione di nuovo tessuto osseo. Spesso tale riorganizzazione è causata da modifiche del carico a cui l'osso è sottoposto, con conseguente cambio dell'orientamento delle trabecole ossee.

A sinistra osteosclerosi diffusa in un bacino affetto da osteopetrosi, a destra un bacino normale

Malattia di Paget a livello dell'anca destra

Nel collasso si ha invece cedimento della struttura ossea, con disordinata riduzione degli spazi occupati dal tessuto stesso.

Le forme di osteosclerosi sono distinte in *pure o idiopatiche* oppure in *secondarie o complicate*.

Le forme idiopatiche comprendono l'*osteopetrosi* in cui è presente osteosclerosi generalizzata, la *melorestosi* in cui è interessato un solo segmento scheletrico e le *osteosclerosi localizzate nel cranio*.

Le forme secondarie sono invece dovute a sostanze tossiche (fosforo, fluoro, piombo, bismuto), tumori ossei, metastasi ossee osteoblastiche (ad esempio da carcinoma prostatico), malattie infiammatorie, malattie distrofiche (esempio malattia di Paget)[7].

Metastasi osteoaddensanti da carcinoma prostatico

Grossa metastasi osteolitica in prossimità dell'articolazione sacro-iliaca di destra (frecce)

Osteolisi

Nel caratterizzare le aree di osteolisi è importante definirne la localizzazione, la struttura mono o plurilacunare, la forma, i margini e il comportamento del tessuto intorno. Un'osteolisi superficiale è definita *usura* (evolve in *carie* se si estende in profondità) mentre un'osteolisi profonda può essere anche una *caverna* o una *cisti*. Nelle osteolisi non neoplastiche il tessuto distrutto può essere rimpiazzato da fluido, mentre spesso in quelle causate da tumori è il tessuto neoplastico a occupare le zone erose, che può avere aspetti vari. I margini delle lesioni neoplastiche inoltre spesso non sono netti e il tessuto intorno spesso presenta sclerosi reattiva o invasione intorno alle lesioni più aggressive[8].



Crollo vertebrale a livello di T12

Osteonecrosi avascolare della testa del femore

Osteonecrosi

Sono differenziate in asettiche e settiche. Le prime possono essere idiopatiche e interessare ogni segmento scheletrico (tipiche quelle a carico della testa del femore nella Malattia di Legg-Calvé-Perthes) oppure post-traumatiche (causate da devascolarizzazione di un moncone di frattura), emboliche (ad esempio da embolia gassosa), tossiche o da agenti fisici (folgorazione, congelamento).

Il tipico aspetto radiologico delle osteonecrosi settiche (osteomielite) e quello "a sarcofago" (ove il moncone osseo è circondato da tessuto di granulazione)[9].

Osteodistrofia

Si presenta con lacune di varie dimensioni più o meno confluenti, che nelle fasi iniziali non presentano orletti sclerotici (data l'inattività del tessuto fibroso). Quando il processo patologico raggiunge la corticale il periostio incomincia ad apporre osso nuovo come forma di compenso, mantenendo l'aspetto della corticale stessa. Sono evidenti inoltre fratture patologiche.

Osteomielite a livello del primo metatarso

Le varie patologie che danno osteodistrofia sono differenziate osservando le sedi del processo patologico e la genesi (esempio iperparatiroidismo). Nella malattia di Paget le alterazioni strutturali sono prevalentemente osteosclerotiche.
Inizialmente la malattia mostra aree di osteolisi e di fibrosi, che poi gradualmente vengono sostituite da aree osteosclerotiche. Questa malattia può aumentare il rischio di fratture patologiche, oltre che avere un modesto rischio di trasformazione neoplastica (osteosarcoma). Quando la malattia è prevalentemente sclerotica può porre dubbi diagnostici con le metastasi da carcinoma prostatico[10].

Osteodistrofia renale

Alterazioni elementari della forma ossea

Nell'*ipoplasia* si assiste al deficit di sviluppo di un osso o di parte di esso, mentre nell'*iperplasia* succede il contrario.

Nell'*iperostosi* si osserva invece aumento dello spessore di un osso, il contrario avviene nell'*ipostosi*.

Nella *disostosi* si osserva deformazione di un osso[11].

Metodiche radiologiche nelle differenti patologie dell'apparato osteo-articolare

Le voci elencate in seguito trattano la diagnosi radiologica delle più diffuse patologie di questo apparato:

- Radiologia della patologia non oncologica dello scheletro
- Radiologia della patologia oncologica dello scheletro
- Radiologia delle articolazioni e dei tessuti molli

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 771.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 773.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 771-772.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 772.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 773-775.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 775-777.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 777-778.

8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 778.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 778-779.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 779.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 779-780.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_del_sistema_osteo-articolare&oldid=123935971"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta l'8 nov 2021 alle 22:55.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia della patologia non oncologica dello scheletro

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia della patologia non oncologica dello scheletro** (radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica) è spesso un utile ausilio alla diagnosi di numerose patologie scheletriche.

Indice

Patologie congenite
- Osteogenesi imperfetta
- Osteopetrosi
- Meloreostosi
- Nanismo acondroplasico
- Encondromatosi
- Esostosi multipla
- Osteopelicia
- Mucopolisaccaridosi
- Sclerosi poliostotica infantile
- Iperostosi generalizzata con pachidermia
- Emoglobinopatie

Traumi
- Fratture traumatiche
- Fratture patologiche
- Fratture da stress
- Fratture delle sincondrosi
- Riparazione delle fratture
- Lussazione

Infezioni

Malattie causate da agenti fisici
- Congelamento
- Ustioni
- Folgorazione
- Radiazioni ionizzanti

Malattie causate da agenti chimici
- Metalli pesanti
- Alluminio
- Fluoro

- Farmaci

Patologie endocrine
- Gigantismo e acromegalia
- Ipopituarismo
- Ipertiroidismo
- Ipotiroidismo
- Iperparatiroidismo
- Ipoparatiroidismo
- Sindrome di Cushing
- Diabete

Malattie metaboliche e carenziali
- Osteoporosi
- Rachitismo e osteomalacia
- Carenza di rame
- Tesaurismosi

Reumatologia

Note

Bibliografia

Voci correlate

Patologie congenite

Queste patologie si manifestano alla nascita e sono spesso di carattere ereditario. Di solito la diagnosi è basata sull'anamnesi e sulla clinica, mentre le metodiche radiologiche sono utilizzate per localizzare le alterazioni scheletriche. TC e RM sono utilizzate anche per lo studio dei tessuti molli.

Osteogenesi imperfetta

Questa malattia è causata da un difetto nella sintesi del collagene di tipo 1. A livello osseo la malattia si presenta con un quadro di osteoporosi diffusa e un conseguente aumentato rischio di fratture. A livello radiologico la malattia può avere 3 aspetti: presentare ossa sottili e gracili, arti brevi e inspessiti oppure alterazioni cistiche degli arti. Nei bambini con le forme più gravi è possibile osservare aree radiotrasparenti con margini sclerotici a carico delle epifisi delle ossa lunghe (calcificazioni "a popcorn"). Si osserva inoltre appattiamento dei corpi vertebrali e slargamento dei seni frontali e mastoidei[1].

Osteopetrosi

È una malattia in cui si evidenzia osteosclerosi diffusa, dovuta a un'iperattività degli osteoblasti che porta ad aumentata ossificazione. La radiologia convenzionale evidenzia bene il quadro di osteosclerosi diffusa, specie a livello vertebrale. Nella forma associata ad acidosi tubulare detta anche *"malattia a cervello di marmo"* è possibile evidenziare anche calcificazioni cerebrali usando la TC[2].

Meloreostosi

Radiografia di un bacino di un soggetto affetto da osteopetrosi, che evidenzia diffuso incremento della densità ossea

Meloreostosi dell'arto superiore sinistro.

In questa malattia si ha osteosclerosi di un unico segmento osseo che porta a dolore articolare e difficoltà di movimento. La patologia interessa l'osso affetto in direzione prossimo-distale a livello della componente compatta dando il tipico aspetto a "cera di candela accesa". Il contorno del segmento affetto è pertanto estremamente radiopaco e irregolare all'esame radiologico standard, portando anche alla formazione di protuberanze ossee in sede articolare (osteocondroma). Di solito la patologia colpisce gli arti inferiori[3].

Radiografia di un soggetto con osteogenesi imperfetta di tipo V

Nanismo acondroplasico

Questa malattia ereditaria è dovuta a una mutazione del gene FGFR3 (Fibroblast Growth Factor Receptor 3). La radiologia tradizionale evidenzia: base del cranio corta con gran forame occipitale ristretto, torace stretto, appiattimento dei corpi vertebrali, falangi corte e slargate (a "coppa"), ossa del bacino di dimensioni ridotte e femori incurvati[3].

Encondromatosi

Malattia ereditaria caratterizzata dalla crescita diffusa di encondromi a carico delle ossa lunghe, che possono dare fratture patologiche o evolvere anche in senso maligno. Radiologicamente si evidenziano come aree radiotrasparenti che a volte erodono l'osso adiacente[3].

Esostosi multipla

In questa malattia si ha crescita di multiple protuberanze ossee con deformazione dei segmenti affetti. Le esostosi sono dapprima cartilaginee e ossificano nel tempo, colpendo soprattutto femore, tibia, omero e perone. Oltre a essere problematiche dal punto di vista estetico le esostosi raramente possono evolvere in senso maligno[3].

Osteopelicia

È una malattia ereditaria che non dà sintomi ma che può essere rinvenuta mediante esame radiografico come aree di osteosclerosi diffusa nodulari o striate a carico dell'osso spongioso[3] .

Mucopolisaccaridosi

Sono malattie causate da difetti enzimatici ereditari che portano all'accumulo di mucopolisaccaridi acidi. Sono presenti varie forme cliniche (a seconda dell'enzima coinvolto e del metabolita che si accumula in diversi distretti corporei) che possono presentare anche alterazioni a carico dello scheletro[3].

Sclerosi poliostotica infantile

Malattia infantile caratterizzata da osteosclerosi diffusa che risparmia epifisi e metafisi delle ossa lunghe[3] .

Iperostosi generalizzata con pachidermia

Esordisce intorno ai 15 anni di età portando ad aumento dello spessore delle ossa lunghe e col tempo a calcificazioni dei legamenti e delle membrane interossee, con conseguente aumento di spessore degli arti (definito *pachidermia*)[4].

Emoglobinopatie

In queste patologie l'alterata sintesi dell'emoglobina a livello delle cellule progenitrici del midollo osseo, porta a un'ipossia sistemica che, a livello renale, induce un'aumentata sintesi di eritropoietina. L'effetto di questo ormone è stimolare come forma di compenso la replicazione delle cellule progenitrici midollari, portando quindi a un'iperplasia del midollo osseo stesso che si ripercuote sulla struttura e sulla forma delle ossa, dando slargamento delle cavità midollari e rarefazione delle trabecole. L'effetto più evidente si ha nelle talassemie e si evidenzia principalmente a livello del cranio, con marcata osteopenia ed espansione delle ossa nasali, temporali e mascellari, che porta a una *facies* tipica. A livello del tavolato esterno della volta cranica è possibile anche rilevare delle strie radiopache radiali (*cranio "a spazzola"*).

Nell'anemia falciforme si hanno anche trombosi a livello sistemico dovute ad agglutinazione dei globuli rossi alterati, con conseguente osteonecrosi se questo fenomeno avviene a livello osseo (specie a carico delle mani, dei piedi e di diafisi ed epifisi delle ossa lunghe, con conseguente arresto della crescita).

La scintigrafia ossea permette di evidenziare gli infarti ossei come aree ipocaptanti inizialmente e che in tempi successivi presentano ipercaptazione reattiva del tracciante, mentre la RM è utile per studiare l'iperplasia midollare e la risposta di questa alle terapie[5].

Traumi

La soluzione di continuità di un osso, di una cartilagine o di entrambi questi tessuti è definita *frattura*. Le fratture possono essere classificate dal punto di vista eziologico. Si parla quindi di frattura *traumatica* se questa è causata da forze esterne che superano la resistenza meccanica del tessuto colpito, di frattura *patologica* se la frattura è causata da alterazioni della struttura ossea e di frattura *"da stress"* se questa è causata da sforzi ripetuti nel tempo che indeboliscono il tessuto osseo nelle sedi di inserzione muscolare. L'esame più spesso utilizzato per individuare le fratture, per via del basso costo e della bassa esposizione a radiazioni è quello radiografico standard. La TC è utilizzata di solito per studiare distretti complessi come il cranio, il massiccio facciale, la spalla, il bacino e la caviglia. La risonanza magnetica, pur non potendo studiare direttamente la matrice minerale ossea, è adatta per lo studio delle fratture interne che danno edema e contusione in questa sede come esame di seconda istanza. La medicina nucleare permette tramite la scintigrafia ossea di studiare invece molto bene le fratture da stress o quelle multiple a carico di più

segmenti corporei (essendo un esame *total body*); inoltre la sua elevata sensibilità la rende molto adatta alla ricerca di lesioni traumatiche secondarie ad abusi su minori. L'angiografia si usa solamente in quei casi ove si sospetta un'ischemia causata dalla frattura[6].

Fratture traumatiche

Frattura dell'omero

L'esame radiologico standard va di norma eseguito in 2 proiezioni per rilevare anche un'eventuale lussazione dei segmenti scheletrici coinvolti, valutando la sede della frattura, l'estensione (la frattura è definita *completa* se interessa l'osso a tutto spessore, *incompleta* se interessa solo la corticale, a *"legno verde"* se un'infrazione corticale si ramifica nell'osso più profondo oppure *"da infossamento"* se non si ha abbastanza energia da rompere completamente la corticale), l'eventuale *apertura* (definita quando il moncone osseo rompe la cute) e la direzione (che può essere longitudinale, trasversale, obliqua o spiraliforme). Le linee di frattura possono essere inoltre singole o multiple. Una frattura che raggiunge un'articolazione può invece essere definita a seconda delle strutture che raggiunge (intra o extracapsulare, sopra o sottolegamentosa). Possono essere evidenti, in caso di frattura completa, anche più frammenti ossei; in tale caso è bene analizzarne la forma (quelli taglienti possono essere pericolosi per i tessuti molli adiacenti). Una frattura è composta se l'*apposizione* fra i frammenti è completa, altrimenti si parla di frattura *scomposta*; tale spostamento può avvenire lateralmente, longitudinalmente (con accorciamento del segmento scheletrico colpito), "ad axim" (in cui è frammenti sono angolati secondo l'asse) o "ad peripheriam" (i frammenti ruotano attorno al proprio asse). Lo studio radiologico delle parti molli, specie nelle fratture esposte, è indispensabile per valutare la presenza di corpi estranei, schegge ossee o bolle d'aria (dovute al trauma o anche da comunicazione della sede di frattura con cavità corporee normalmente piene di aria)[7].



Crollo vertebrale, frattura tipica da osteoporosi

Fratture patologiche

Sono fratture che avvengono in corrispondenza di ossa danneggiate da altre patologie, anche in assenza di traumi. Il dato anamnestico, insieme con il riscontro all'esame radiologico standard di aree malate in corrispondenza delle fratture, permette di porre praticamente sempre una diagnosi certa, che può essere coadiuvata anche da TC o RM ad esempio nel sospetto di patologia neoplastica. In caso di interessamento metastatico delle vertebre queste dapprima si deformano e poi collassano (*crollo vertebrale*)[8].

Fratture da stress

Sono causate da sforzi intensi e ripetuti a carico di un'inserzione muscolare su un osso. La scintigrafia ossea, la TC o la RM permettono di fare la diagnosi[8].

Fratture delle sincondrosi

Questo tipo di frattura avviene su strutture molto sensibili ai traumi durante il periodo di accrescimento ed è perciò richiesta molta attenzione nella sua valutazione. La classificazione più utilizzata è quella di Salter e Harris. L'esame radiologico standard permette di evidenziare, se presente, lo spostamento del nucleo di ossificazione, altrimenti va eseguita un'attenta comparazione con l'osso controlaterale, cercando un aumento di spessore della linea epifisaria dal lato colpito. Nel 30% dei casi queste fratture portano a deformità[9].

Tipo	Descrizione
Tipo 1	Frattura confinata nel piatto di accrescimento (*distacco epifisario puro*)
Tipo 2	Piatto di accrescimento staccato dalla metafisi assieme a piccolo frammento osseo
Tipo 3	Rima di frattura estesa verticalmente fra epifisi e piatto di accrescimento
Tipo 4	Rima di frattura estesa verticalmente fra epifisi, piatto di accrescimento e metafisi
Tipo 5	Devascolarizzazione della regione germinativa (tardivamente si osserva riduzione o assenza di crescita ossea)

Riparazione delle fratture

La radiologia convenzionale permette di seguire nel tempo i processi riparativi a carico delle fratture, evidenziando di norma già dopo 3 settimane la formazione del *callo osseo*. Dopo 2-4 mesi il callo incomincia a strutturarsi nella sua porzione più esterna e poi via via verso l'interno dell'osso colpito, dopo 16-18 mesi si hanno nuove trabecole ossee e dopo 2 anni queste si dispongono lungo le linee di carico, lasciando a volte come segno della pregressa frattura solo un lieve inspessimento dell'osso compatto. Un ritardo dei processi descritti sopra (persistenza della linea di frattura oltre i tempi stabiliti, ritardo nella formazione del callo osseo) è indice di problemi nel processo di riparazione; se invece i capi ossei non sono ben riallineati e non si osserva calcificazione, con osteosclerosi degli stessi, il quadro clinico evolve verso la pseudoartrosi. Più spesso quest'ultimo fenomeno si osserva a carico dello scafoide, della tibia e del femore. Un'immobilizzazione o riduzione insufficienti può portare invece a ipertrofia del callo osseo e deformità[10].

Lussazione

Una lussazione è la perdita completa di contatto fra i capi di un'articolazione. Di solito per la diagnosi è sufficiente eseguire una radiografia a singola proiezione (una proiezione ortogonale viene sempre comunque eseguita per incrementare la sensibilità). TC e RM consentono di rilevare anche eventuali danni a carico dei tessuti molli adiacenti[11].

Infezioni

Quando un'infezione interessa sia l'osso sia il midollo osseo si parla di osteomielite. L'infezione può avvenire per via ematogena, per contatto con un'area infetta adiacente o per contatto diretto con l'esterno a causa di una frattura o un intervento chirurgico. Le infezioni ossee di origine ematogena colpiscono alcune

Osteomielite a livello del primo metatarso. È evidente l'aspetto "a sarcofago"

sedi preferenziali, per via della loro maggiore vascolarizzazione. La vascolarizzazione dello scheletro varia con l'età del paziente: nel neonato epifisi e metafasi sono ancora collegate dal punto di vista vascolare, quindi un'infezione a carico dei una delle due sedi interesserà anche l'altra (questo fino all'adolescenza); mentre nell'adulto, in assenza della predetta connessione vascolare e con la chiusura delle cartilagini di accrescimento, l'infezione avrà sede prevalentemente epifisaria. In età infantile inoltre i focolai settici spesso sono multipli e diffusi, nell'adolescente sono perlopiù colpite le ossa lunghe, mentre nell'adulto è spesso interessato lo scheletro assile (tutto con l'eccezione degli arti). Nella fasi iniziali della malattia spesso l'esame radiologico non evidenzia alterazioni, come è invece in grado di fare la RM. PIù tardivamente è possibile distinguere il tessuto osseo morto (definito *sequestro*) da quello sano in quanto separato da tessuto di granulazione. Questo tessuto può essere poi circondato da tessuto osseo reattivo che a sua volta verrà circondato da nuovo tessuto di granulazione, dando il classico aspetto a *"sarcofago"*. Questo tipo di reazione da un lato rende sicuramente l'osso più solido ma dall'altro rende più difficile l'eliminazione del sequestro, favorendo quindi la cronicizzazione dell'infezione. Un'osteomielite col tempo può anche drenare all'esterno se l'infezione coinvolge anche i tessuti molli fino alla cute.

Ascesso di Brodie a livello della porzione distale della tibia, evidente come un'area litica circondata da un alone di osteosclerosi

Particolari forme di osteomielite sono il patereccio (tipido delle falangi distali delle dita in seguito a infezioni superficiali) e la spondilite/spondilodiscite (che colpisce le vertebre). Nella spondilodiscite prevalgono i fenomeni di osteosclerosi, con osteofitosi e riduzione degli spazi intersomatici. Analoghi fenomeni di apposizione ossea si hanno in generale con la cronicizzazione dei processi infettivi. L'ascesso di Brodie è un'osteomielite con sede metafisaria (più spesso a carico della tibia) che porta a periostosi, osteosclerosi dell'osso circostante e alla formazione di una raccolta purulenta o mucoide. Nell'osteomielite sclerosante di Garrè il processo cronico porta invece a un'osteosclerosi tale da occludere il canale midollare.

La TC permette di caratterizzare le infezioni ossee e il coinvolgimento dei tessuti molli, la scintigrafia ossea (eseguita anche con tecnica *trifasica* mirata al segmento sospetto) e la PET con fluorodesossiglucosio presentano un'elevata sensibilità, consentendo di individuare il processo infettivo molto precocemente. La PET inoltre consente di individuare nelle forme ematogene eventuali focolai settici metastatici. La scintigrafia con granulociti marcati presenta sensibilità e specificità molto elevate (ma non è utilizzabile nella diagnosi di spondilodiscite, in quanto i granulociti neotrofili non riescono a raggiungere l'infezione in tale forma clinica). La RM presenta sensibilità e specificità simili alla scintigrafia ossea trifasica. Nella

tubercolosi ossea (morbo di Pott) si osservano aree di osteolisi (occupate da tessuto granulomatoso) circondate da osteosclerosi. Col tempo il progredire della necrosi caseosa porta all'eburneizzazione delle vertebre coinvolte (*vertebra d'avorio*) e al loro crollo. In tali casi TC e RM sono molto utili[12].

Malattie causate da agenti fisici

Congelamento

Il congelamento danneggia i tessuti tramite fenomeni di vasocostrizione e trombosi che portano a ischemia. Di solito queste lesioni interessano le porzioni distali dello scheletro e si presentano come aree osteoporotiche. Sono ovviamente interessati anche i tessuti molli circostanti, ove nei casi più gravi si osserva necrosi[13].

Ustioni

A livello dei tessuti molli un'ustione si presenta con fenomeni di necrosi coagulativa, mentre a livello osseo si presenta come un'area osteoporotica (prodotta dagli osteoclasti attivati dai fenomeni di iperemia). A livello periarticolare compaiono successivamente delle calcificazioni[13].

Folgorazione

Il danno tissutale indotto dall'elettricità quando attraversa il corpo umano dipende dal tipo di corrente (continua o alternata), dalla tensione e dal quantitativo di acqua dei tessuti attraversati. Per effetto Joule l'energia trasportata dagli elettroni viene convertita in calore, che danneggia i tessuti producendo ustioni. Il danno finale quindi è simile a quello prodotto da un'ustione, ma aggravato anche dai traumi indotti dagli spasmi muscolari causati dalla corrente elettrica[13].

Radiazioni ionizzanti

Una dose di radiazioni all'osso pari a 400 cGy può determinare ipotrofia del tessuto colpito, con conseguenti deformità. Le zone con maggiore radiosensibilità di tutto lo scheletro sono le epifisi; difatti un'irradiazione in tale sede può anche causarne il distacco o la necrosi. L'azione delle radiazioni si ha soprattutto sugli osteoblasti, portando quindi a ridotta apposizione di nuovo osso e alla loro possibile trasformazione neoplastica (osteosarcoma, firosarcoma, istiocitoma fibroso maligno, condrosarcoma). La lesione da raggi spesso si presenta quindi osteoporotica, con aree di osteonecrosi e osteosclerosi reattiva, associata a periostosi. Tale quadro è ovviamente anche associato a un maggiore rischio di fratture patologiche, e inoltre è a volte molto simile a quello delle neoplasie ossee radioindotte, rendendo difficile la diagnosi differenziale. La RM in tali casi consente di distinguere i due tipi di quadro clinico grazie al differente segnale dato dai tessuti neoplastici rispetto a quelli solamente irradiati[13].

Malattie causate da agenti chimici

Metalli pesanti

L'avvelenamento dato da questi elementi chimici (il più frequente è il piombo) in età pediatrica e adolescenziale porta alla formazione di linee trasversali radiopache a livello delle metafisi delle ossa lunghe durante l'accrescimento (soprattutto a livello del ginocchio). Negli adulti invece questo tipo di avvelenamento porta a danno renale, con conseguente osteodistrofia. L'eliminazione dal corpo del metallo può spesso far regredire questa alterazioni[14].

Alluminio

L'assunzione di grandi quantità di composti contenenti questo elemento (per assunzione diretta o come conseguenza dell'emodialisi) porta al suo accumulo nella matrice ossea, con conseguenti alterazioni della mineralizzazione, osteopenia e fratture patologiche (vertebre, coste, epifisi delle ossa lunghe)[14].

Fluoro

Tipicamente questo tipo di intossicazione si ha a causa di un'eccessiva introduzione di questo elemento nell'acqua potabile, per esposizione professionale o tramite farmaci contenenti questo elemento. Il quadro clinico include osteosclerosi (aumentata radiopacità diffusa, specie a livello delle ossa del bacino, della colonna vertebrale e del torace), osteofitosi e calcificazione dei legamenti dello scheletro assile[14].

Farmaci

I farmaci che più frequentemente danno alterazioni ossee sono i corticosteroidi, portando a osteoporosi diffusa, fratture patologiche (crolli vertebrali) e da stress che si riparano con deformità e calli ipertrofici. L'assunzione prolungata può dare anche osteonecrosi da microfratture (testa del femore e dell'omero, epifisi distali di femore e tibia, testa dei metatarsi, astragalo e osso semilunare). La scintigrafia ossea permette di evidenziare le microfratture, mentre la densitometria ossea permette di quantificare il quadro di osteoporosi. Le iniezioni intrarticolari di corticosteroidi possono dare calcificazioni e frammentazione dei segmenti ossei intrarticolari. Alcuni chemioterapici, come il metotrexate o la ifosfamide, possono anch'essi dare quadri di osteoporosi diffusa[15].

Patologie endocrine

Gigantismo e acromegalia

Sono due patologie causate da un'iperproduzione dell'ormone della crescita (la prima in età pediatrica, la seconda in età adulta) da parte di un adenoma ipofisario. Nel gigantismo l'eccesso di ormone porta ad aumentata apposizione di osso, portando a statura elevata, mentre nell'acromegalia si ha riattivazione dell'ossificazione encondrale (ad esempio a livello condro-costale) e periostale (con allargamento di alcuni segmenti scletrici come la mandibola, le ossa dell'orbita, gli zigomi, le ossa lunghe e quelle delle mani)[16].

Ipopituarismo

Questa malattia è causata da deficit nella produzione di ormone della crescita per danno alla porzione anteriore dell'ipofisi. Si presenta come nanismo causato da un deficit nell'apposizione di osso, che porta a persistenza delle cartilagini di accrescimento e alla scomparsa dei nuclei di ossificazione[16].

Ipertiroidismo

Si presenta a livello osseo con un quadro di osteoporosi diffusa e fratture patologiche[16].

Ipotiroidismo

Il quadro osseo cambia a seconda dell'età di insorgenza. In età pediatrica e adolescenziale porta a un ritardo nella crescita, con scomparsa dei nuclei di ossificazione se a insorgenza molto precoce, oppure a loro deformazione. Si può notare anche salienza delle suture craniche[17].

Iperparatiroidismo

Si presenta come un quadro di *osteite fibrocistica* (sostituzione del tessuto osseo con tessuto fibroso, osteoporosi e osteomalacia) associato a fratture patologiche e alla formazione di cisti e (nei casi più gravi) *tumori bruni* (agglomerati di osteoclasti che distruggono l'osso in modo simile a una lesione tumorale osteolitica, se presenti appaiono come lesioni osteolitiche a margini ben definiti)[17].

tumori bruni a livello delle mani

L'*osteodistrofia renale* è invece l'insieme delle alterazioni ossee che compaiono nei pazienti con insufficienza renale cronica, ove è presente un iperparatiroidismo secondario; in tali casi, oltre al quadro tipico dell'iperparatiroidismo, si rileva osteosclerosi a carico dello scheletro assile. Il quadro più tipico lo si osserva a livello vertebrale, ove si evidenzia addensamento a banda delle porzioni superiori e inferiori delle vertebre (*vertebre a maglia da rugby*)[17].

Ipoparatiroidismo

Si manifesta tipicamente come osteosclerosi, specie a carico della volta cranica e delle ossa della faccia. A tale quadro si associano numerose calcificazioni a carico dei tessuti molli, dei legamenti e dell'encefalo (nuclei della base, cervelletto, plessi corioidei)[17].

Sindrome di Cushing

A livello osseo si presenta con quadri di osteoporosi e osteonecrosi diffusi, associati a fratture patologiche (quadro non dissimile da quello dovuto all'eccessiva assunzione di corticosteroidi descritto nel paragrafo dei farmaci)[17].

Diabete

Il quadro osseo tipico è un'osteopenia diffusa. A livello dei tessuti molli una condizione molto frequente e temuta sono le ulcere e le infezioni, specie a livello del piede (*piede diabetico*) ove colpiscono più spesso le sedi sottoposte a maggiore carico (calcagno, prima e quinta articolazione metatarso-falangea)[17].

Malattie metaboliche e carenziali

Osteoporosi

radiografia di una mano normale

È la malattia metabolica più comune a livello osseo, caratterizzata da fragilità ossea e maggiore rischio di fratture. Può essere diffusa o distrettuale ed è classificata (in funzione dell'età e della causa di insorgenza) in *senile*, *postmenopausale* e *secondaria* (cioè dovuta ad altre condizioni patologiche).

Osteoporosi a livello della mano e del polso. Si noti la relativa radiotrasparenza e rarefazione delle trabecole ossee rispetto all'immagine a sinistra

L'osteoporosi diffusa, come dice il nome, coinvolge tutto lo scheletro, prediligendo le ossa con maggior componente trabecolare (colonna vertebrale e ossa lunghe in primis) e successivamente coinvolgendo anche l'osso compatto[18].

L'osteoporosi senile ha uguale prevalenza nei due sessi ed è causata da ridotta attività fisica e insufficiente apporto di vitamina D e/o calcio; quella *postmenopausale* è invece tipica del sesso femminile ed è causata dall'eccesso di estrogeni (ormoni che stimolano l'attività degli osteoclasti), che portano a una notevole perdita di massa ossea negli anni immediatamente successivi alla menopausa, che poi tende a rallentare. L'osteoporosi *secondaria* può essere invece causata da molte patologie o anche dall'assunzione di farmaci (specie i corticosteroidi, di cui si è già parlato nel relativo paragrafo, ma anche gli anticoagulanti, alcuni chemioterapici, il litio, alcuni antiepilettici e alcuni diuretici)[18].

L'osteoporosi distrettuale è invece di solito rilevata a livello delle ossa degli arti ed è spesso dovuta al loro disuso (es. immobilizzazione dopo una frattura o paralisi) ma anche all'algodistrofia. In quest'ultima patologia l'esame radiografico standard nelle prime fasi è spesso negativo; sono invece utili la scintigrafia ossea trifasica o la RM.

L'aspetto dell'osso osteoporotico è stato già descritto nel paragrafo precedente ove sono elencate le lesioni elementari della struttura del tessuto osseo. Le vertebre spesso si osservano con le porzioni superiori e inferiori concave (*"vertebre a lente biconcava"*), fino ad assumere col tempo l'aspetto *"a focaccia"*. Spesso in questi casi sono anche evidenti le *"ernie di Schmorl"* dovute a erniazione del disco intervertebrale all'interno di un soma vertebrale per rottura del piatto osseo sovrastante.

L'esame radiologico più indicato per il monitoraggio di questa malattia è la densitometria ossea, mentre le eventuali fratture possono essere studiate mediante la radiografia dei segmenti interessati. A livello della colonna una radiografia in proiezione latero-laterale può essere analizzata anche mediante software completamente automatici che misurano le altezze dei corpi vertebrali (*morfometria vertebrale*, eseguibile anche tramite una densitometria ossea con tecnica DEXA).

La RM è utile per differenziare i crolli vertebrali dovuti a osteoporosi da quelli su base neoplastica, specie a livello di colonna vertebrale e bacino. L'intensità del segnale RM infatti permette di distinguere le due patologie e anche di stimare da quanto tempo è avvenuta la frattura[19].

Rachitismo e osteomalacia



Radiografia delle gambe di un bambino di 2 anni affetto da rachitismo

Sono patologie quasi sempre causate da un deficit di vitamina D. Il rachitismo colpisce in età pediatrica e adolescenziale, mentre l'osteomalacia è tipica dell'età adulta. In entrambi i casi si ha deficit di mineralizzazione delle ossa, mentre nel rachitismo anche ritardo di crescita.

Nel bambino il quadro osseo mostra deficit di mineralizzazione e disorganizzazione delle cartilagini di accrescimento (slargamento e riduzione della radiopacità), con associata anomala formazione delle trabecole ossee. A livello condro-costale è possibile osservare il *rosario rachitico* (causato dallo slargamento delle cartilagini di accrescimento in tale sede), mentre il cranio può assumere una configurazione squadrata. È possibile apprezzare altre deformità da carico a livello delle ossa lunghe.

Nell'adulto si ha invece iperproduzione di matrice ossea non adeguatamente ossificata, con trabecole ridotte in spessore e numero, mentre l'osso compatto mostra anomalie microscopiche che portano a deposizione di matrice ossea mal ossificata nel suo contesto, con evidenza di aree più radiotrasparenti. Nell'osteomalacia sono inoltre tipiche le *linee di Looser*, strie radiotrasparenti che interessano la corticale ossea in maniera perpendicolare e in modo incompleto e simmetrico fra i due lati del corpo. Spesso queste linee si rilevano a livello delle scapole, delle coste, del bacino e di alcune ossa lunghe e sono dovute anch'esse all'accumulo di matrice malmineralizzata che porta a frattura dei segmenti coinvolti[20].

Carenza di rame

Si manifesta con un quadro radiologico che comprende osteopenia, linee radiopache in sede metafisaria, fratture epifisarie e disallineamenti fra epifisi e metafisi. Queste alterazioni sono in gran parte reversibili se si provvede subito a somministrare il metallo carente[14].

Tesaurismosi

In queste patologie l'accumulo di metaboliti a livello del midollo osseo induce riassorbimento a livello dello scheletro coinvolto, specie a livello corticale. In taluni casi sono anche evidenti piccole aree osteolitiche simil-cistiche con distribuzione "a carta geografica" o "a tarlatura". Il quadro clinico ovviamente predispone al rischio di fratture patologiche, soprattutto a livello della colonna vertebrale. È possibile anche riscontrare rigonfiamenti e osteonecrosi. La scintigrafia ossea è utilizzabile per valutare con un esame *total body* il coinvolgimento scheletrico, mentre la scintigrafia midollare, la TC e la RM sono utilizzabili allo stesso scopo per valutare l'interessamento midollare da parte della malattia (il midollo infiltrato appare più radiopaco, con segnale RM alterato e non presenta uptake di radiocolloidi). L'istiocitosi X (malattia caratterizzata dalla presenza di cellule con granuli tipici) può dare alla radiologia tradizionale differenti quadri clinici a seconda della gravità e dell'estensione del processo morboso (in tale malattia la scintigrafia ossea è spesso negativa, mentre la RM è sensibile ma non specifica):

- nel *granuloma eosinofilo* si evidenzia radiologicamente con lesioni osteolitiche ben delimitate, con riassorbimento dell'osso periostale, scollamento del periostio e presenza di tessuto neoformato nel suo contesto. Tali lesioni si evidenziano a livello del cranio, della colonna vertebrale, delle coste e a livello di metafisi e diafisi delle ossa lunghe;
- nella *malattia di Hand-Schuller-Christian* l'interessamento osseo da parte della malattia dà spesso interessamento del cranio con aspetto "a carta geografica";
- nella *malattia di Letterer-Siwe* si manifesta con lesioni osteolitiche, specie a livello delle ossa della testa[21].

Reumatologia

Nella sclerodermia si può avere coinvolgimento a livello di tutto lo scheletro da parte della malattia (erosioni), in particolare a livello delle coste e soprattutto delle falangi distali delle mani (assottigliamento *"a punta di matita"*) ove può portare anche alla completa distruzione delle falangi colpite. Nel 5% dei pazienti affetti da sarcoidosi è possibile che la malattia coinvolga anche lo scheletro, dando osteoporosi generalizzata, caratterizzata da aspetto delle trabecole *"a nido d'ape"* (specie a livello delle falangi). Sono inoltre presenti anche lesioni cistiche, specie a livello di mani e piedi[22].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 780.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 780-781.
3. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 781.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 781-782.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 791-792.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 782.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 782-783.
8. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 783.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 783-784.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 784.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 784-785.
12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 785-788.
13. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 788.
14. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 789.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 789-790.
16. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 790.
17. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 791.
18. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 792.
19. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 792-793.
20. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 793-794.
21. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 794-795.
22. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 795.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia del sistema osteo-articolare

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_della_patologia_non_oncologica_dello_scheletro&oldid=124351461"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 dic 2021 alle 17:11.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia della patologia oncologica dello scheletro

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia della patologia oncologica dello scheletro** (radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica) è un utile ausilio al clinico per definire la natura e l'aggressività delle lesioni tumorali localizzate a livello delle ossa. In questa voce sono elencati i tumori e le lesioni simil-tumorali di più frequente riscontro a livello scheletrico e per ognuna le metodiche radiologiche più impiegate nel loro studio.

Indice

Valutazione radiologica dei tumori e delle lesioni simil-tumorali
Lesioni simil-tumorali
Tumori che producono tessuto osseo
Tumori che producono tessuto cartilagineo
Tumori che producono tessuto fibroso
Tumori da istiociti
Tumori che producono tessuto adiposo
Tumori a origine vascolare
Leucemie e linfomi
Tumori a plasmacellule
Sarcoma di Ewing
Cordoma
Metastasi
Note
Bibliografia
Voci correlate

Valutazione radiologica dei tumori e delle lesioni simil-tumorali

La radiologia tradizionale, sebbene non sempre sia in grado di determinare la natura di una lesione espansiva ossea, è comunque in grado di fornire informazioni circa la velocità di crescita e l'aggressività delle lesioni sospette. Queste informazioni, unite alla clinica, permettono quasi sempre una corretta diagnosi. Tuttavia non tutte le lesioni con aspetto radiologico aggressivo in realtà poi sono davvero maligne

(lo stesso discorso vale anche al contrario, come verrà illustrato nei paragrafi successivi). Crescita e aggressività sono valutate mediante le tecniche di diagnostica per immagini esaminando i seguenti aspetti morfologici:

- la *distruzione ossea* può avere margini netti ed essere ben delimitata dall'osso circostante (*geografica*, tipico delle lesioni a crescita lenta), oppure *tarlante* (multiple aree adiacenti che insieme formano un margine irregolare) o *permanente* (con margini non ben definiti, aspetto tipico delle lesioni più aggressive);
- la *reazione dell'osso circostante* se presente indica un accrescimento lento (*"orletto sclerotico"*);
- la corticale può apparire *espansa*, *erosa*, *interrotta* o *permeata*. Una corticale maggiormente distrutta è indice di maggiore aggressività;
- la presenza di *periostosi* è un altro indice di crescita lenta. Se è presente erosione corticale, una lesione aggressiva può anche scollare il periostio dalla sua sede naturale (*triangolo di Codman*). Se l'aggressività è poi estremamente elevata è possibile anche osservare la comparsa di strie sottili di osso neoformato (aspetto a *bratte di cipolla*, a *raggi di sole* o *a pettine*);
- *matrice* della lesione (ossia lo studio del suo contenuto). Un contenuto liquido spesso fa pensare ad esempio a una cisti, ma è possibile trovare anche cartilagine, osso, oppure altro (es. tessuto fibroso, metastasi, ecc.);
- la *sede* delle lesioni (sia nell'intero ambito scheletrico sia la porzione del singolo osso che viene colpita) è inoltre estremamente importante in quanto sedi diverse correlano con differenti lesioni in funzione dell'età, del sesso e della clinica del paziente. Anche la posizione sul piano trasversale (*centrale*, *eccentrica*, *corticale* o *iuxtacorticale*) aiuta nella diagnosi differenziale;
- il *numero* delle lesioni[1].

Lesioni simil-tumorali

Radiografia di una cisti ossea semplice localizzata a livello della porzione prossimale dell'omero in un bambino di 13 anni

Le lesioni cistiche dell'osso sono le seguenti:

- cisti ossea semplice: può essere *solitaria* o *multiloculare*. La patogenesi è sconosciuta (forse secondaria a ostruzione vasale che causa edema e rimodellamento osseo) e si presenta molto frequentemente nella popolazione. Tipicamente sono presenti nella popolazione maschile in età giovane-adulta (prima e seconda decade di vita) a livello delle metafisi delle ossa lunghe e specie a livello di omero, femore e tibia. Queste lesioni all'esame radiologico standard appaiono radiotrasparenti, in posizione centrale sul piano trasversale e spesso circondate da reazione osteoaddensante dell'osso circostante. La RM evidenzia molto bene il contenuto liquido di queste lesioni mentre la TC può essere usata per studiare i distretti anatomicamente più complessi. Spesso queste cisti (di norma clinicamente silenti) si manifestano dando fratture patologiche[2].



La stessa lesione mostrata a sinistra vista mediante RM utilizzando una sequenza T2 pesata. La lesione, a contenuto liquido, appare iperintensa



Cisti aneurismatica localizzata a livello della porzione prossimale della tibia vista mediante radiografia (A) e mediante RM con sequenze pesate in T1(B), T2(C), T1 dopo somministrazione di mezzo di contrasto (D) e T2 FATSAT

- cisti ossea epidermoide: è molto meno comune della cisti semplice, da cui differisce perché il suo lume è rivestito da un epitelio squamoso che secerne nella cavità fluido sebaceo, che si miscela con la cheratina derivante dallo sfaldamento dell'epitelio stesso. Molto probabilmente queste cisti sono dovute a impianto di tessuto ectodermico in sede ectopica, ad esempio a causa di un trauma. Tipicamente queste cisti si osservano a livello del cranio e delle falangi. L'aspetto radiologico è simile a quello della cisti semplice, con a volte reazione dei tessuti molli adiacenti[3].

Ganglio intraosseo a livello della porzione distale della tibia rilevato mediante radiografia. La lesione appare osteolitica e circondata da un orletto sclerotico.

- cisti aneurismatica: è più frequente nella prima e nella seconda decade di vita, si manifesta clinicamente con dolore e tumefazione ed è costituita da cavità piene di sangue, che verosimilmente si creano a causa di un'ostruzione vasale o per la creazione di fistole artero-venose. Le metafisi delle ossa lunghe sono le sedi maggiormente interessate, seguiti dagli archi posteriori delle vertebre (specie dorsali). All'esame radiologico standard queste cisti appaiono come lesioni espansive osteolitiche. Può presentarsi anche interruzione della corticale e reazione del periostio, simulando un tumore maligno in quanto queste lesioni crescono rapidamente. L'angiografia consente di evidenziare l'aumentata irrorazione sanguigna a carico di queste cisti, mentre la TC è l'esame migliore per definirne estensione e caratteristiche. All'esame TC la cisti si presenta tipicamente con sepimenti interni e lobulata, oltre che con liquido all'interno (ben evidente anche con un esame RM)[4].
- ganglio intraosseo: si presenta in tutte le età come una lesione osteolitica simile ai geoidi tipici dell'osteoartrosi (ma di maggiori dimensioni) localizzata sotto le cartilagini a livello delle epifisi delle ossa lunghe (radio, tibia) e dell'acetabolo; a margini netti e con orletto sclerotico. Istologicamente queste cisti sono piene di materiale mucoso e circondate da tessuto connettivo[5].

Tumori che producono tessuto osseo

I tumori benigni dell'osso che producono tessuto osseo sono l'osteoma, l'osteoma osteoide e l'osteoblastoma; mentre quelli maligni ricadono sotto la definizione di osteosarcoma.

Gli *osteomi* sono costituiti da tessuto osseo compatto. Sono tipici dell'adulto e radiologicamente si presentano come lesioni molto radiopache, ma omogenee, con margini netti. Di solito si localizzano a livello delle ossa facciali e spesso protrudono nelle cavità aeree ini presenti (es. seni paranasali). Multipli osteomi si osservano nella sindrome di Gardner[6].

Osteoma del seno frontale sinistro rilevato mediante una radiografia in proiezione antero-posteriore. La lesione appare radiopaca rispetto all'aria che riempie il seno frontale ed omogenea

L'*osteoma osteoide* è tipico dei maschi fra la prima e la terza decade di vita e clinicamente ha una presentazione tipica (dolore notturno che si allevia dopo terapia con acido acetilsalicilico). Le sedi più colpite sono le diafisi di femore e tibia, oppure i peduncoli vertebrali. Radiologicamente si evidenzia come un'area trasparente (*nidus*) circondata da un orletto di sclerosi (che in alcuni casi è talmente estesa da nascondere la porzione centrale radiotrasparente) L'esame TC spesso consente di porre diagnosi, mentre l'esame RM spesso mostra a livello di queste lesioni edema perilesionale. La scintigrafia ossea, per la sua elevata sensibilità, spesso è dirimente nei casi dubbi (lesioni piccole) consentendo di indirizzare meglio le metodiche radiologiche[6].



Osteoma osteoide rilevato mediante TC a livello della fibula ed evidente come una piccola lesione ipodensa con un "core" iperdenso



Osteoblastoma a livello della porzione posteriore della settima vertebra cervicale osservato mediante TC. La lesione appare ipodensa con calcificazioni iperdense nel suo contesto. Intorno alla lesione è possibile osservare un orletto di sclerosi non sempre ben definito (caratteristica di una forma di malattia aggressiva)

L'*osteoblastoma*, seppur benigno, talvolta può mostrare un comportamento aggressivo, entrando in diagnosi differenziale con l'osteosarcoma. È più frequente nella seconda e terza decade di vita e si manifesta spesso a livello degli archi posteriori delle vertebre o delle diafisi delle ossa lunghe. In modo simile all'osteoma osteoide si presenta come un'area radiotrasparente circondata da un orlo di sclerosi, con spesso associate aree di ossificazione nella porzione centrale. L'esame TC spesso consente di caratterizzare bene queste lesioni, definendone anche l'aggressività (in tali casi si osserva rottura del periostio)[7].

L'*osteosarcoma* è il tumore maligno primitivo dell'osso più frequente. Presenta nel suo contesto apposizione di nuova matrice ossea con vari gradi di mineralizzazione. È una patologia più frequente nei maschi fra la seconda e la terza decade di vita. Una sede frequente è a livello del ginocchio, nella regione metafisaria. Radiologicamente si presenta come una lesione aggressiva, disomogenea (per la presenza di osso con diverso grado di mineralizzazione) a margini mal definitivi e con rapida distruzione della corticale e scollamento del periostio (*triangolo di Codman*). Nella variante teleangectasica spesso le cavità di osteolisi sono piene di sangue. La TC consente di valutare in modo preciso l'estensione locale della malattia, la sua aggressività e la composizione delle lesioni, mentre la RM è estremamente utile nel valutare l'estensione loco-regionale (le cosiddette *skip lesions*, cioè metastasi che si

Osteosarcoma a livello della tibia

propagano per via ematogena fino ai distretti ossei vicini. Appaiono come lesioni ipointense nelle sequenze T1 pesate e iperintense in quelle T2 pesate). Anche la scintigrafia ossea e la PET con FDG possono essere utilizzate efficacemente per studiare le metastasi a distanza. La variante *paraostale* è tipica della terza e quarta decade di vita, ha prognosi peggiore e si localizza a livello della porzione distale del femore come una lesione radiopaca, con margini irregolari, che origina dalla corticale avvolgendola[7].

Tumori che producono tessuto cartilagineo



TC di un condroma localizzato a livello della superficie anteriore del femore. Notare le calcificazioni nel suo contesto.

Immagini RX e TC di un condrosarcoma della pelvi. All'esame radiografico (A) si evidenzia una minima reazione periostale. Alla TC (B) si osserva invece una lesione osteolitica a margini mal definiti e con calcificazioni nel suo contesto.

I tumori benigni dell'osso che producono tessuto cartilagineo sono il condroma e l'osteocondroma, quelli maligni sono rappresentati da condrosarcoma.

Osteocondroma a livello del ginocchio osservato mediante RM

Il *condroma* può localizzarsi all'interno di un osso (*encondroma*) o sulla sua superficie (*eccondroma*). Possono essere rilevati condromi multipli nell'ambito di alcune sindromi (sindrome di Ollier, sindrome di Maffucci se associati anche emangiomi dei tessuti molli). Gli encondromi sono frequenti nella popolazione e si sviluppano di solito all'interno di un osso lungo (es. falangi delle mani a livello delle metafisi). Sono lesioni a margini netti, lobulate, quasi mai aggressive, con espansione della corticale e calcificazioni circolari, tipiche del tessuto cartilagineo. La probabilità di trasformazione maligna aumenta con l'aumento delle dimensioni delle lesioni e del loro numero[8].

L'*osteocondroma* è una protuberanza ossea ricoperta da cartilagine che cresce a partire dalle cartilagini di accrescimento, di solito non dolorosa (salvo l'instaurarsi di flogosi per compressione dei tessuti adiacenti). La diagnosi non è difficile anche con la radiologia tradizionale, tuttavia TC e RM sono utili per valutare lo spessore della cartilagine (che non deve superare il centimetro)[9].

Il *condrosarcoma* colpisce soggetti adulti dalla terza alla sesta decade di vita, può avere localizzazione centrale o periferica e di solito colpisce la metafisi femorale, l'ileo, le coste e la scapola. Tipicamente presenta calcificazioni *ad anello* e può presentare vari gradi di aggressività. La TC è la tecnica migliore per caratterizzare queste lesioni, mentre la RM consente di valutare il coinvolgimento dei tessuti molli adiacenti e la loro compressione. Questo tumore capta sia i difosfonati marcati utilizzati per la scintigrafia ossea sia il fluorodesossiglucosio utilizzato in [10].

Tumori che producono tessuto fibroso



Fibrosarcoma della mandibola di un bambino rilevato mediante TC. L'immagine A, acquisita alla diagnosi, mostra una lesione osteolitica con rottura della corticale ossea, che appare dopo 4 mesi (immagine B) di dimensioni incrementate e con maggiori componenti sia iperdense che ipodense.

Il *fibroma non ossificante* è un tumore benigno molto frequente, solitamente trovato per caso eseguendo esami radiologici per altre ragioni su soggetti in età infantile sani. Si localizza di solito a livello delle metafisi delle ossa lunghe, per poi spostarsi in regione diafisaria durante l'accrescimento. Radiologicamente si presenta come un'area radiotrasparente di forma ovale, con a volte un orletto sclerotico intorno, in posizione eccentrica e senza reazione del periostio[11].

Fibroma non ossificante a livello della tibia prossimale rinvenuto in una ragazzina di 10 anni mediante radiografia e sottoposto a follow up. Col tempo la lesione tende a spostarsi distalmente. A 13 anni si osserva l'inizio di un processo di ossificazione, con comparsa di un orletto di sclerosi. Nel radiogramma eseguito a 17 anni la lesione è scomparsa, sostituita da un'area di osteosclerosi.

Il *fibrosarcoma* è un tumore maligno dell'osso raro, composto da tessuto fibroso, senza produzione di matrice ossea. Di solito esordisce nella terza o quarta decade di vita nelle stesse sedi dell'osteosarcoma. Radiologicamente si evidenzia come aree di osteolisi tarlante, con sclerosi e reazione periostale scarsa. La matrice non è caratterizzabile con le tecniche radiologiche[11].

Tumori da istiociti



Istiocitoma fibroso maligno dello sterno rilevato mediante TC in una paziente sottoposta a radioterapia 19 anni prima per un'eteroplasia mammaria. Si rileva una lesione osteolitica aggressiva che distrugge la corticale ossea ed infiltra i tessuti circostanti.

Gli istiociti sono cellule del sistema immunitario adibite alla fagocitosi dei microorganismi patogeni e del materiale estraneo. Fanno parte della linea monocito-amacrofagica, il cui principale rappresentante presente a livello del tussuto osseo è l'osteoclasto. Il tumore benigno dell'osso in cui la cellula tumorale è l'istiocita è chiamato *istiocitoma fibroso*, mentre quelli maligni includono l'*istiocitoma fibroso maligno* e il *tumore gigantocellulare*.



Istiocitoma fibroso benigno dell'osso parietale rilevato mediante TC. Si evidenzia una lesione osteolitica, a margini ben definiti, circondata da un orletto di sclerosi. (A: immagine assiale, B: immagine sagittale, C: render 3D)

L'istiocitoma fibroso è simile istologicamente al fibroma non ossificante, ma si manifesta dopo i 20 anni a livello di epifisi e diafisi delle ossa lunghe. Radiologicamente appare come un'area di osteolisi circondata da osteosclerosi[11].

L'istiocitoma fibroso maligno di solito insorge nel contesto di osso già malato (es. malattia di Paget) fra la quinta e la sesta decade di vita, localizzandosi a livello delle metafisi delle ossa lunghe, in regioni simili a quelle tipiche dell'osteosarcoma. Differisce dal fibrosarcoma a livello istologico solo per la disposizione delle cellule che lo costituiscono e radiologicamente si presenta in modo simile (aree di osteolisi tarlante, mal delimitate, corticale erosa, minima reazione periostale e matrice non caratterizzabile)[11].

Tumore gigantocellulare del 4°metacarpo della mano sinistra rilevato mediante radiografia. Per la sede e l'aspetto tale lesione può essere confusa con un encondroma

Il tumore gigantocellulare istologicamente è composto da cellule giganti multinucleate associate a cellule più piccole dello stroma. Si manifesta nella terza e quarta decade di vita a livello delle metafisi delle ossa lunghe (specie a livello del ginocchio). Radiologicamente appare come una lesione osteolitica, in posizione eccentrica, con corticale assottigliata e rigonfia. A seconda del grado di interruzione della corticale, valutato meglio mediante la TC, è distinto in varie forme cliniche (*calma*, *attiva* e *aggressiva*). La RM è utile invece per evidenziare il coinvolgimento extraosseo o presenza di liquido[12].

Tumori che producono tessuto adiposo

Il lipoma in sede ossea è una lesione molto rara che tipicamente si sviluppa nelle ossa lunghe con una cavità midollare e nel calcagno. Radiologicamente appare come una regione di osteolisi, circondata da un piccolo orletto sclerotico, con presenza al suo centro di un nidus radiopaco. Mediante la TC la matrice di questo tumore è facilmente caratterizzabile, vista la differente radiotrasparenza del tessuto adiposo rispetto a quelli circostanti[13].

Tumori a origine vascolare

I tumori ossei benigni che originano dalle cellule endoteliali (cioè quelle che compongono i capillari e la parete interna dei vasi sanguigni più grandi) sono detti *emangiomi* se benigni, *angiosarcomi* se maligni.

L'emangioma osseo è tipico dell'età adulta e si sviluppa di solito a livello delle vertebre e del cranio. A livello vertebrale radiologicamente presenta nel suo contesto trabecole a disposizione verticale e inspessite (vertebra *a palizzata*), mentre nelle altre sedi l'emangioma appare come un'area di radiotrasparenza con

Lipoma intraosseo dello sfenoide. L'immagine TC evidenzia una lesione osteolitica a livello del seno sfenoidale con calcificazioni al centro e con una matrice con densità compresa fra -30 e -90 HU, indice di contenuto lipidico.

trabecole disposte radialmente, associate ad assottigliamento ed espansione della corticale. Queste lesioni aumentano il rischio di frattura patologica del distretto colpito. La TC è particolarmente utile nel valutare le lesioni vertebrali[13].

TC di un emangioma vertebrale. In sagittale è ben evidente l'aspetto "a palizzata" della vertebra coinvolta

L'angiosarcoma osseo è un tumore maligno raro che più spesso colpisce le ossa lunghe degli arti inferiori. Radiologicamente appare come aree di osteolisi multiple, senza reazione osteosclerotica dell'osso circostante[13].

Leucemie e linfomi

Radiografia di un femore con multiple localizzazioni di mieloma

Alcuni tumori ematologici, pur non avendo localizzazioni scheletriche, possono dare quadri tipici a livello osseo. La leucemia acuta infantile ad esempio porta a osteoporosi diffusa, con assottigliamento diffuso della corticale delle ossa lunghe, comparsa di strie metafisarie radiotrasparenti, in associazione ad aree di osteolisi circondate da reazione periostale. Nelle leucemie dell'adulto queste manifestazioni sono simili, ma meno gravi.

Nel linfoma di Hodgkin la malattia può interessare l'osso, specie a livello dei corpi vertebrali, ove si manifesta come aree di osteolisi che possono portare al crollo delle vertebre coinvolte. Se nell'ambito di queste lesioni prevale la reazione osteosclerotica all'azione distruttrice indotta dalle cellule neoplastiche si può osservare anche osteosclerosi (*vertebra d'avorio*)[14].

Tumori a plasmacellule

Il tipico tumore maligno composto da plasmacellule è il mieloma multiplo; questa neoplasia si manifesta di solito dalla quarta all'ottava decade di vita. Radiologicamente le lesioni ossee da mieloma appaiono come aree di osteolisi rotonde, a margini netti e prive di orletto sclerotico. La malattia colpisce principalmente il cranio, le vertebre (ove spesso risparmia gli archi posteriori, segno tipico di questa patologia) e le coste. TC e RM sono molto utili per valutare il coinvolgimento.

Il plasmacitoma si manifesta clinicamente come una lesione simil-mieloma solitaria che tende a espandersi, e che presenta nel suo contesto grossolane trabecolature residue. In tale caso la radiologia tradizionale spesso consente solo di porre diagnosi tardive, mentre la RM mostra maggiore sensibilità[15].

Sarcoma di Ewing

Il sarcoma di Ewing è un tumore maligno abbastanza frequente fra i giovani di razza bianca fino alla terza decade di vita. Colpisce tutti i segmenti scheletrici, ma soprattutto la metafisi femorale, l'ileo, la tibia, il perone e le coste. Radiologicamente si presenta come un'area di osteolisi permeante, con frequente associazione a reazione periostale del tipo *a bratte di cipolla* o *a palizzata*; spesso si osserva inoltre invasione dei tessuti molli adiacenti (ben rilevabile mediante TC e RM). Alla scintigrafia ossea e alla PET con fluorodesossiglucosio il tumore si presenta avidamente captante[15].

Radiografia della tibia di un bambino con sarcoma di Ewing: la freccia evidenzia evidenzia l'area osteolitica, con la tipica reazione periostale.

Cordoma

Il cordoma è un tumore localmente aggressivo che origina da residui della notocorda, manifestandosi di solito a livello del sacro, dalla terza alla sesta decade di vita, come lesioni osteolitiche associate a invasione dei tessuti molli adiacenti e distruzione della corticale[15].

Metastasi

metastasi osteoaddensanti da carcinoma prostatico (frecce)

Le metastasi da tumori ossei originatesi in altri distretti corporei sono le lesioni tumorali di più frequente riscontro a livello osseo. I tumori che più frequentemente danno queste lesioni sono i carcinomi del polmone, della prostata e della mammella; ma anche tumori primitivi a carico del colon-retto, del rene, del pancreas e della tiroide possono fare lo stesso.

Le metastasi ossee radiologicamente si manifestano in modo differente a seconda del tumore primitivo da cui originano. Le metastasi da carcinoma prostatico si manifestano tipicamente come lesioni *osteoaddensanti* (per questo appaiono molto captanti alla scintigrafia ossea), mentre quelle da primitività polmonare spesso appaiono *miste* (caratterizzate da regioni di osteolisi frammiste a osteosclerosi reattiva, anche queste captano alla scintigrafia ossea), mentre altri tumori (come quello di origine renale) danno lesioni metastatiche *osteolitiche* (che, per tale ragione, non captano alla scintigrafia ossea).



Grossa metastasi osteolitica a livello dell'ala iliaca di destra (frecce)

Oltre al grado di radiotrasparenza un altro aspetto da valutare sono il numero delle lesioni, i margini (se irregolari o sfumati sono indice di maggiore malignità) e l'eventuale presenza di reazione periostale. È inoltre opportuno ricercare sempre eventuali fratture patologiche o regioni che sono a rischio per tale evento (specie in distretti "delicati", come la testa del femore o il rachide). La RM è particolarmente utile per valutare l'eventuale compromissione midollare da metastasi vertebrali, mentre la scintigrafia ossea, per le neoplasie che presentano metastasi osteoaddensanti o miste, presenta sensibilità molto elevata (specificità altrettanto elevata è possibile ottenerla utilizzando la metodica SPECT-TC, che permette di combinare il dato scintigrafico con quello radiologico). La PET può essere anch'essa utilizzata a tale scopo utilizzando differenti traccianti a seconda del primitivo da studiare (per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata)[16].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 795-797.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 797.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 797-798.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 798.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 798-799.
6. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 799.
7. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 800.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 800-802.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 771802.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 802-803.
11. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 803.
12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 803-804.
13. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 804.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 804-805.
15. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 805.
16. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 805-806.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia del sistema osteo-articolare
- Tumori delle ossa

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_della_patologia_oncologica_dello_scheletro&oldid=125679484"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 13 feb 2022 alle 06:02.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Radiologia delle articolazioni e dei tessuti molli

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia delle articolazioni e dei tessuti molli** (radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica) è molto utile nello studio di numerose patologie a carico di queste strutture. Qui in seguito sono elencate le principali patologie a carico di questi distretti e le metodiche radiologiche più utilizzate per il loro studio.

Indice

Patologia delle articolazioni
- Patologia degenerativa articolare
- Generalità sulle artropatie infiammatorie
- Artrite reumatoide
- Spondilite anchilosante
- Sindrome di Reiter
- Artrite psoriasica
- Gotta
- Condrocalcinosi e malattie da depositi di cristalli
- Ocronosi
- Iperparatiroidismo
- Acromegalia
- Emofilia
- Lupus Eritematoso Sistemico
- Sclerodermia
- Polimiosite, dermatomiosite e connettivite mista

Patologia dei tessuti molli
- Traumi
- Oncologia

Patologie a carico di specifiche articolazioni
- Polso e mano
- Gomito
- Spalla
- Articolazione sacro-iliaca
- Anca
- Ginocchio
- Caviglia

Note

Bibliografia

Voci correlate

Patologia delle articolazioni

Patologia degenerativa articolare

osteofiti in sede vertebrale

La patologia degenerativa articolare è molto comune nella popolazione e spesso è possibile osservare segni radiologici tipici anche in pazienti asintomatici (praticamente in tutti i soggetti studiati sopra i 50 anni è possibile osservare segni radiologici di artrosi); per tale ragione la valutazione della patologia degenerativa articolare non può prescindere dalla correlazione con la clinica e con l'età dei soggetti studiati (gli stessi reperti rinvenuti in età più giovane sono più probabilmente patologici).

La degenerazione articolare non procede mai in modo casuale durante la vita e alcune articolazioni sono più esposte al problema di altre. In generale un interessamento asimmetrico è più sospetto per essere patologico. In condizioni normali (in assenza di traumi o patologia della cartilagine), le articolazioni meno stabili sono quelle più soggette all'artrosi (es. ginocchio) così come quelle sottoposte a ripetuti stress meccanici (es. articolazione acromion-claveare).

L'alterazione degenerativa più precoce osservabile è la *condropatia* (a carico della cartilagine); poi col tempo il danno si estende alle altre strutture. La condropatia si manifesta prima nelle donne e nei soggetti di razza bianca, negli obesi e in chi svolge intensa attività fisica (lavoro pesante, sport). Questo danno non è evidenziabile con gli esami radiografici diretti, ma può essere visto mediante la RM, l'artrografia o l'artro-TC come una riduzione in spessore della cartilagine. Il danno osseo si incomincia a osservare solo dopo la sua esposizione nelle fasi più avanzate.

Le lesioni ossee rilevabili radiologicamente sono l'atrofia, la sclerosi, la formazione di *geoidi* e di *osteofiti*.

I *geoidi* si formano a causa dei ripetuti microtraumi a cui sono soggette le superfici ossee esposte in articolazione, che portano alla penetrazione di liquido sinoviale nel tessuto osseo stesso; appaiono come delle aree di osteolisi (di massimo 3 centimetri di diametro), a margini ben definiti, spesso circondati da un fine orletto sclerotico e con aspetto simile a quello di una ciste.

Gli *osteofiti* sono invece protuberanze ossee (costituite da osso corticale e spongioso) che si formano nelle zone di artrosi con meno carico, deformando la struttura stessa dell'articolazione; possono essere *marginali*, *centrali* o *inserzionali* (a seconda della sede di comparsa). Gli osteofiti *marginali* si sviluppano parallelamente alla direzione del carico e hanno verosimile funzione compensatoria (aumentano la superficie esposta al carico, diminuendo quindi la pressione a carico dell'osso malato). Gli osteofiti *centrali* rappresentano verosimilmente il tentativo da parte dell'organismo di "creare spessore" a livello dell'articolazione malata (non potendo però produrre cartilagine il tessuto malato reagisce apponendo nuovo osso). Gli osteofiti inserzionali invece si creano a livello delle inserzioni di capsule e legamenti. Gli osteofiti possono dare dolore e impotenza funzionale man mano che si ingrandiscono (e, specie quelli marginali, comprimono i tessuti molli circostanti)[1].

Generalità sulle artropatie infiammatorie

In queste patologie il danno alle articolazioni è sempre dovuto a un processo flogistico, che incomincia sempre a livello della capsula articolare ove si genera il cosiddetto *panno sinoviale*. Queste malattie sono di solito malattie sistemiche caratterizzate anche da un coinvolgimento dello scheletro nelle fasi più tardive. Dato che il tessuto osseo non è il primo a essere colpito, nella diagnosi precoce sono più indicate le tecniche adatte allo studio dei tessuti molli (ecografia e RM), che consentono di evidenziare il danno a livello sinoviale. In questa fase la radiologia tradizionale può tuttavia evidenziare comunque versamento articolare, ispessimento dei tessuti molli e dislocazione dei cuscinetti adiposi periarticolari, pur non riuscendoci bene a livello di tutti i distretti (facilmente studiabili sono le articolazioni metacarpo-falangee, le interfalangee e il ginocchio, mentre è più complesso lo studio dell'anca). Col progredire del processo morboso all'esame radiologico tradizionale è possibile evidenziare osteopenia a livello periarticolare, ove si inserisce la capsula articolare, secondaria alla flogosi (tipico reperto rinvenibile nei pazienti affetti da artrite reumatoide). Questa sede è la prima a essere colpita in quanto non è protetta dalla cartilagine articolare (*area nuda*). Differenti artropatie infiammatorie prediligono colpire determinate articolazioni piuttosto che altre; lo studio delle sedi affette è quindi importante per la diagnosi differenziale, così come correlare i dati con la clinica e valutare la simmetria delle suddette alterazioni. La metodica di scelta per lo studio dei tessuti molli è la RM dopo somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio; tale metodica consente infatti di rilevare con elevata sensibilità le alterazioni flogistiche più precoci, oltre che monitorarle nel tempo (secondo recenti studi l'intensità del segnale RM a livello delle lesioni flogistiche attive correla con l'aggressività del processo flogistico localmente)[2].

Artrite reumatoide

Questa malattia ha andamento cronico-recidivante e colpisce i soggetti adulti (prevalentemente donne). Il rinvenimento in circolo del fattore reumatoide può aiutare nella diagnosi, tuttavia questo autoanticorpo può essere rinvenuto anche in altre artropatie infiammatorie o non essere presente in quadri di malattia radiologicamente inequivocabili (*artrite reumatoide sieronegativa*).

Radiografia di una mano affetta da artrite reumatoide

All'esame radiologico standard il segno tipico di questa patologia è il restringimento precoce e simmetrico delle rime articolari, associato a edema, erosioni ossee e osteoporosi distrettuale che si fa sempre più diffusa col progredire della patologia. Di solito non si osservano né reazione osteosclerotica/riparativa né presenza di osteofiti. Qualunque articolazione può essere colpita, ma le più interessate dalla patologia sono il polso, le metacarpo-falangee e le interfalangee prossimali. Le interfalangee distali di solito sono risparmiate nella forma clinica che colpisce l'adulto (sono colpite nella forma giovanile, e mai da sole).

A livello delle mani alcuni aspetti tipici sono: la *tumefazione fusiforme*, la deformazione *"a collo di cigno"* (iperestensione delle articolazioni interfalangee prossimali, flessione delle interfalangee distali), la deformazione *"a bouttonière"* (flessione delle articolazioni interfalangee prossimali associata a iperestensione di quelle distali) e il *"pollice dell'autostoppista"*. In fase avanzata si osserva deviazione in direzione ulnare delle dita e in direzione radiale dell'articolazione fra radio e ossa del carpo, con progressione verso la lussazione e il conseguente accorciamento delle dita (dita *"a telescopio"*). Le anchilosi si osservano raramente e solo nelle forme giovanili o sieronegative. Nelle grosse articolazioni si ha restringimento delle

rime articolari, che rispetto all'osteoartrosi appare indipendente dalla direzione del carico. In fase avanzata sono colpiti anche tendini e legamenti, con conseguente instabilità articolare a livello ad esempio della spalla e del polso.

La colonna cervicale (colpita nel 50% dei pazienti) va studiata sempre con molta attenzione, in quanto può essere colpito dalla malattia il legamento trasverso che unisce il dente dell'epistrofeo all'atlante, dando flessione dell'articolazione atlo-epistrofeica, ben visibile al radiogramma standard della colonna cervicale acquisito in proiezione laterale e in flessione. Anche lo stesso dente dell'epistrofeo può essere colpito.

Nelle forme giovanili si può osservare anche precoce fusione delle cartilagini di accrescimento e macrosomia epifisaria (tipicamente a livello dell'epifisi distale del femore).

Nel morbo di Still (una delle forme giovanili dell'artrite reumatoide) a livello osseo è possibile osservare anche reazioni periostali a livello delle falangi prossimali e dei metacarpi, oltre ad anchilosi del polso, delle articolazioni interfalangee e delle interapofisee in sede cervicale[3].

Spondilite anchilosante

Aspetto "a canna di bamboo" della colonna vertebrale in un paziente affetto da spondilite anchilosante

Questa artropatia cronica e progressiva colpisce soprattutto i soggetti maschi in giovane età, prediligendo il rachide e le articolazioni sacro-iliache. Quasi sempre i soggetti affetti sono positivi per l'isoforma del gene HLA-B27 ed il fattore reumatoide è negativo.

Radiografia anteroposteriore della mano sinistra di un soggetto con artrite psoriasica. Si noti il coinvolgimento infiammatorio-erosivo delle articolazioni del I dito e l'iniziale coinvolgimento dell'interfalangea distale del III dito.

All'esame radiografico diretto fin dalle fasi precoci di malattia è possibile osservare squadratura delle vertebre toraciche e lombari, associata alla presenza di sindesmofiti anteriori a ponte fra i corpi vertebrali ed alla fusione posteriore delle articolazioni interapofisarie (colonna *"a canna di bambù"*). A livello del calcagno è inoltre possibile osservare erosioni nelle sedi di inserzione dei tendini, mentre a livello delle piccole articolazioni si hanno alterazioni simili a quelle osservabili nell'artrite reumatoide[4].

Sindrome di Reiter

È una malattia ad eziogenesi infettiva che colpisce soprattutto gli uomini. Nel 60% dei casi si ha positività per l'allele HLA B27. Vengono colpite in questa patologie soprattutto le articolazioni dell'arto inferiore e del piede. All'esame radiografico sono documentabili alterazioni a livello delle articolazioni metatarso-falangee

ed aspetto *"cotonoso"* a livello del calcagno. Può essere colpita, in modo tipico, anche una sola delle due articolazioni sacro-iliache (a differenza della spondilite anchilosante che le colpisce sempre entrambe)[5].

Artrite psoriasica

La psoriasi colpisce anche le articolazioni nel 5-7% dei pazienti affetti. Nella maggior parte dei casi sono interessate dal processo morboso le articolazioni interfalangee prossimali e distali di mani e piedi, le coxo-femorali, le ginocchia , le caviglie ed il rachide. Radiologicamente si osservano erosioni ossee a livello delle sedi colpite e reazioni periostale, più evidente a livello delle falangi (La presenza di osteodistruzione accompagnata da reazione riparativa da a livello delle articolazioni interfalangee il tipico aspetto radiografico *"ad orecchie di topo"*). Nelle fasi tardive in sede calcaneare è possibile osservare la presenza di osteofiti a larga base di impianto associati a reazione periostale ad aspetto *cotonoso*. La scintigrafia ossea mostra uptake del radiotracciante in zone differenti da quelle erose e una tipica distribuzione "verticale" (asimmetrica) delle lesioni[6].

Gotta

Radiografia raffigurante un piede colpito da gotta, evidente come lesioni osteolitiche a livello dell'alluce.


Condrocalcinosi della colonna cervicale

È una forma di artrite che si manifesta nei soggetti affetti da iperuricemia per deposizione di cristalli di acido urico a livello articolare. Nel 75% dei casi è colpita la prima articolazione metatarso-falangea (*podagra*), ma sono interessate anche la caviglia, il ginocchio, il gomito ed il polso. La diagnosi radiologica di questa condizione clinica non è agevole, tuttavia è necessario ricercare alcuni segni tipici:

- lesioni osteolitiche erosive superficiali a margini netti
- lesioni osteolitiche profonde con orletto osseo che in parte ricopre la lesione ed in parte si estende oltre i confini del segmento scheletrico colpito avvolgendolo (*segno dell'orletto avvolgente*)

A livello delle suddette lesioni non si osserva osteoporosi (a differenza dell'artrite reumatoide) e nemmeno osteosclerosi. Le articolazioni, anche colpite in modo significativo, possono poi risultare radiologicamente indenni. La distribuzione delle alterazioni inoltre è casuale ed asimmetrica. Sono talvolta evidenti inoltre calcificazioni a livello dei tessuti molli in corrispondenza di depositi di acido urico, anch'esse asimmetriche[6].

Condrocalcinosi e malattie da depositi di cristalli

La condrocalcinosi è caratterizzata dalla deposizione di cristalli di pirofosfato di calcio (evento che può peraltro verificarsi anche in soggetti sani). All'esame radiografico è possibile evidenziare in questi pazienti tenui calcificazioni della cartilagine ialina, dei menischi delle capsule articolari e dei tendini. Cristalli di

idrossiapatite possono depositarsi spesso in sede paratendinea, paracapsulare ed a livello delle borse sinoviali in pazienti con insufficienza renale cronica o connettiviti; radiologicamente queste calcificazioni si presentano dense ed omogenee, solitamente a forma di nuvola[7].

Ocronosi

Nei pazienti affetti da alcaptonuria si può avere deposizione di acido omogentisico sotto forma di polimeri a livello dei dischi intervertebrali e delle cartilagini. Radiologicamente si possono osservare riduzioni degli spazi intersomatici, spondilosi ed alterazioni articolari[8].

Iperparatiroidismo

Si presenta radiologicamente a livello articolare in modo tipico con riassorbimento subperiostale e subcondrale, specie a carico delle articolazioni acromion-claveari, sterno-claveari, sacro-iliache e della sinfisi pubica. È possibile anche evidenziare quadri simili-condrocalcinosi e simil-artrite reumatoide[8].

Acromegalia

Questa patologia si manifesta a livello articolare come ipertrofia della cartilagine e conseguente sua ipossia. Radiologicamente si osserva quindi dapprima ampliamento degli spazi articolari e successivamente loro riduzione; a quest'ultimo quadro si associa quindi un'osteofitosi tipica (osteofiti *"a becco"*) a carico di specifici distretti (faccia inferiore della testa omerale, margine superiore della sinfisi pubica, facce radiali dei metacarpi, e laterali degli acetaboli)[8].

Emofilia

In seguito ai ripetuti episodi di emartro causati dalla patologia, è spesso osservabile sinovite cronica reattiva iperplastica, con erosione della cartilagine e sofferenza dell'osso sottostante. Senza avere informazioni cliniche questo quadro radiologico può essere confuso con quello dato dall'artrite reumatoide giovanile[8].

Lupus Eritematoso Sistemico

In quasi tutti i pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è presente un coinvolgimento articolare da parte del processo morboso. Tale interessamento è solitamente simmetrico e coinvolge principalmente le mani, le caviglie e le spalle. Tipicamente a livello di queste articolazioni è possibile osservare disallineamenti articolari (sempre riducibili, spesso anche solo con le manovre di posizionamento nella macchina radiogena) dovuti a lassità dei tessuti molli periarticolari. La componente ossea può essere invece interessata da fenomeni erosivi e di osteonecrosi (dovuti al trattamento della patologia di base con corticosteroidi), mentre le falangi possono, per le medesime ragioni, presentare acrosclerosi ed acro-osteolisi[8].

Sclerodermia

Radiologicamente il segno tipico di questa patologia è il riassorbimento osseo a livello delle falangi distali della mano, associato a calcificazioni sottocutanee e periarticolari. È possibile osservare anche calcinosi[8].

Polimiosite, dermatomiosite e connettivite mista

Radiografia di un ginocchio affetto da dermatomiosite

Nella polimiosite e nella dermatomiosite la radiologia tradizionale permette di evidenziare calcificazioni nelle sedi muscolare (specie di coscia e braccio) e sottocutanea.

A livello delle piccole articolazioni delle mani è possibile inoltre osservare deformazioni simil-artrite reumatoide, calcificazioni e lussazioni. Un quadro radiologico simile a quest'ultimo si può osservare da solo anche nella connettivite mista[8].

Patologia dei tessuti molli

Traumi



Ematoma muscolare rilevato mediante ecografia

L'ematoma muscolare, spesso conseguenza di un trauma, dopo 48-72 ore dall'evento può essere evidenziato dall'ecografia come un'area anecogena, con rinforzo a livello della parete posteriore. La TC può essere utilizzata allo stesso scopo (fornendo maggiore dettaglio, ma irradiando il paziente), mentre la RM consente una valutazione sia dell'estensione del processo morboso sia del suo andamento clinico (l'emoglobina presenta segnale RM). Un ematoma non correttamente curato può esitare in fibrosi e necrosi, che evolve in calcificazioni rilevabili con la TC (ove si evidenzia l'area necrotica circondata da un orlo di calcificazione iperdenso) o anche in miosite ossificante.

Per lo studio dei tendini la metodica migliore è quella ecografica, mentre la RM è utilizzabile per le strutture profondi non accessibili all'ecografia[9].

Oncologia

Sarcoma polmonare indifferenziato in un bambino

I tumori dei tessuti molli possono originare ovunque ed a partire da qualunque tipo di tessuto (muscolo, tessuto fibroso, tessuto adiposo, sinovia, endotelio,..). Dopo la valutazione cinica, l'ecografia è l'esame radiologico più indicato da eseguire in prima istanza su una lesione sospetta; tale esame può infatti documentarne la sede, l'estensione, i rapporti con le strutture circostanti (e l'eventuale loro infiltrazione, condizione che definisce l'intra o extra-compartimentalità della lesione) la matrice (solida o cistica) e la vascolarizzazione mediante la metodica doppler. TC ed RM consentono valutazioni dei medesimi aspetti più accurate e sono quindi utilizzate in seconda battuta (la RM in particolare consente uno studio molto accurato della compartimentalità). L'obbiettivo delle metodiche radiologiche in questo caso è infatti quello di differenziare le lesioni maligne da quelle benigne (quest'ultime sono di solito extra-compartimentali). La radiologia tradizionale è utile solo nei pochi casi di lesioni che presentano calcificazioni nel loro contesto (sinovialsarcoma). L'angiografia ormai non è più utilizzata per studiare l'invasione dei grossi vasi in quanto, com'è già accaduto con la TC per lo studio dell'invasione ossea, la RM

presenta un'accuratezza molto maggiore. Alcuni tipi di tumori possono essere diagnosticati praticamente con certezza già mediante l'imaging utilizzando TC o RM in quanto presentano densità o segnale tipici (es. il lipoma). La RM è anche utilizzata nel follow-up di questi pazienti, che deve essere molto stretto data l'aggressività delle patologie maligne di questo distretto[10].

Patologie a carico di specifiche articolazioni

Polso e mano

Immagine RM (a) e radiografica (b) di un paziente affetto da malattia di Kienbock. È evidente sia il collasso sia l'alterato segnale a livello dell'osso semilunare.

Polso e mano, oltre a rappresentare le sedi più frequenti di trauma, sono un'unità anatomo-funzionale unica. Le fratture in questo distretto sono più frequentemente a carico dei metacarpi e delle falangi, mentre la frattura delle ossa del carpo più frequente è quella a carico dello scafoide. Le lesioni traumatiche più frequente in sede carpale sono le lussazioni e le fratture-lussazioni, che richiedono sempre una diagnosi ed un trattamento rapidi. La diagnostica radiologica a livello di tale distretto si avvale di proiezioni antero-posteriori e laterali, oltre che di altre apposite. TC ed RM consentono valutazioni più accurate e sono utilizzate in seconda battuta. Una frattura o una lussazione dell'osso semilunare può anche esitare in osteonecrosi dello stesso per sua devascolarizzazione (*malattia di Kienbock*); richiedendo quindi una diagnosi precoce, che è affidata alla RM; TC ed esame radiologico standard possono evidenziare osteosclerosi infatti solo nelle fasi tardive.

A livello del carpo le sindromi più frequenti da instabilità legamentosa sono dovute al *legamento interposto* che può mostrare instabilità in sede *dorsale* (DISI) o *ventrale* (VISI), di solito come conseguenza di lesioni osteo-legamentose che si verificano alla giunzione fra le due filiere carpali. In questo caso una proiezione radiografica laterale spesso consente di porre diagnosi, evidenziando l'inclinazione *volare* (VISI) o dorsale (DISI) dello scafoide.

Le tenosinoviti in questo distretto sono tipicamente dovute a traumi, sovraccarico o all'artrite reumatoide. La malattia di De Quervain è la tenosinovite più comune del versante dorsale del polso ed è diagnosticata mediante ecografia o RM

La sindrome del tunnel carpale, dovuta ad intrappolamento del nervo mediano, è spesso diagnosticata mediante la semplice clinica o con l'ausilio dell'elettromiografia, tuttavia l'ecografia è utile per ricercare masse occupanti spazio che possono essere all'origine della patologia, mentre la RM può mostrare l'edema a livello del nervo, dell'uncino dell'osso uncinato e della deflessione palmare del reticolo dei muscoli flessori delle dita. La RM può evidenziare anche una tenosinovite dei tendini flessori, spesso causa della patologia[11].

Gomito

La radiografia è spesso utilizzata nello studio dei pazienti traumatizzati al gomito col fine di ricercare fratture e lussazioni, utilizzando proiezioni antero-posteriori, laterali ed oblique; la TC è utilizzata per uno studio anatomicamente più dettagliato e per la ricerca di frammenti ossei (utilizzando anche un'iniezione di mezzo di contrasto in sede intrarticolare), mentre la RM può documentare lesioni ai legamenti causa di sublussazione.

Nell'epicondilite (malattie degenerativa frequente in alcuni sportivi e lavoratori, causata da danneggiamento da sforzo delle strutture tendinee epicondilari mediali) la radiografia può rilevare calcificazioni periarticolari a livello delle inserzioni tendinee, mentre la RM può studiare dettagliatamente queste strutture


Epicondilite diagnosticata mediante RM

Molto frequente è la neuropatia da intrappolamento del nervo ulnare a livello del tunnel cubitale del gomito per ispessimento dei tessuti molli che lo costituiscono; in tali casi la RM è dirimente nel rilevare la causa della patologia[12].

Spalla

Le conseguenze dei traumi a livello delle spalle cambiano di incidenza in funzione dell'età del paziente. Nei bambini sono frequenti le fratture a carico della clavicola; nella terza e quarta decade invece spesso si rilevano lussazioni ed il distacco fra l'acromion e la clavicola, mentre nell'anziano sono tipiche le fratture dell'omero. La radiologia tradizionale nella maggior parte dei casi è un ottimo ausilio al clinico nel definire il tipo di danno e la sua gravità, menttre la TC è usata nei casi più complessi e la RM per definire l'eventuale danno ai tessuti molli[13].

La sindrome da instabilità gleno-omerale può essere distinta in acuta e cronica e può essere causata da traumi o essere congenita. Nella lussazione acuta i radiogrammi sono importanti nel definire la direzione della lussazione (anteriore quasi sempre, ma a volte anche inferiore o posteriore) e l'eventuale compresenza di fratture. Nelle lussazioni revidivanti sono utili anche la TC con mezzo di contrasto intrarticolare e la RM (permettono di rilevare eventuali cause congenite o esiti di pregressi traumi predisponenti, come la frattura di Hill-Sachs o quella di Bankart)[14].

La periartrite scapolo-omerale (detta anche *sindrome da impingement* o *da conflitto*) è una conseguenza del ripetuto attrito che si ha nel tempo fra le strutture della cuffia dei rotatori, specie a livello dei tendini del muscolo sovraspinoso e dell'arco funzionale coraco-acromiale, causato da una riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale associata ad un elevato carico. Inizialmente la patologia si manifesta come borsite sottoacromiale e successivamente colpisce le strutture tendinee della cuffia dei rotatori, fino a romperle. Quando quest'ultimo evento si verifica la testa omerale risale nell'articolazione, bloccandola. Sia la risalita della testa omerale sia la riduzione dello spazio sottoacromiale, causata ad esempio da artrosi scapolo-omerale, possono essere rilevate mediante un esame radiografico, mentre i danni alle strutture tendinee ed alla borsa sottoacromiale sono dimostrabili mediante l'ecografia o, più precisamente, mediante l'RM (che consente anche di documentare l'eventuale breccia di risalita della testa omerale nei tessuti molli ed il trofismo muscolare; queste ultime informazioni sono molto utili nel definire la prognosi del paziente e nel planning terapeutico)[15].

La più comune neuropatia da intrappolamento a livello della spalla è quella che coinvolgi il nervo sovrascapolare a livello dell'incisura coracoidea, della fossa sovraspinosa o dell'incisura spinoglenoidea. La RM in tali casi può non solo studiare il nervo stesso, ma anche i muscoli sovra e sottospinoso che spesso in questa patologia mostrano segnale alterato[16].

Articolazione sacro-iliaca

La spondilite anchilosante spesso esordisce tramite una sacro-ileite, tanto che in assenza di lesioni a tale livello la diagnosi è molto difficile da porre. Radiologicamente in tali casi si osservano erosioni ossee superficiali e sclerosi dell'osso subcondrale, bilaterali e simmetriche. Col tempo si ha quindi espansione delle erosioni, comparsa di osteosclerosi e riduzione del lume articolare, fino all'anchilosi. Altro aspetto

tipico di questa patologia è l'entesopatia, che si manifesta come calcificazioni a carico dei legamenti. La radiografia semplice di solito permette di fare diagnosi anche da sola. Quadri simili a quelli della spondilite anchilosante si possono evidenziare anche in seguito a malattie infiammatorie croniche intestinali (*sacro-ileite enteropatica*)[16].

Nell'artrite reumatoide raramente sono coinvolte le articolazioni sacro-iliache. Nei pochi casi in cui lo sono spesso il coinvolgimento è asimmetrico e di lieve entità[16].

Nel 10-25% dei pazienti con psoriasi cutanea si osserva coinvolgimento anche delle articolazioni sacro-iliache da parte della malattia, con sclerosi ed erosioni simmetriche associate ad ampliamento degli spazi articolari[16].

La sacro-ileite settica può essere causata sia da emboli settici sia da invasione per contiguità a partire da traumi o da una malattia infiammatoria pelvica. Tale artrite solitamente è monolaterale ed è associata ad una clinica suggestiva per infezione. Radiologicamente è possibile osservare erosioni ossee, mentre la scintigrafia mostra uptake di radiofarmaco incrementato più precocemente. La TC, oltre a portare a maggiore sensibilità nel rilevare le alterazioni ossee, può evidenziare anche un focolaio settico in sede pelvica causa della malattia[17].

Una delle più comuni forme di artrite tubercolare colpisce l'articolazione sacro-iliaca. Radiologicamente tale patologia si manifesta con erosioni ossee marginali, osteoporosi periarticolare e lieve riduzione degli spazi articolari (un quadro radiologico come descritto con relativo risparmio degli spazi articolari è suggestivo di artrite tubercolare)[18].

Anca

La patologia degenerativa a carico dell'anca è molto frequente nella popolazione, in quanto questa articolazione deve sorreggere gran parte del peso del corpo. Radiologicamente l'artrosi a tale livello si manifesta con riduzione dello spazio articolare, osteofiti, geoidi e sclerosi dell'osso subcondrale. Nei quadri avanzati si può arrivare anche a migrazione della testa del femore in direzione assiale, supero-laterale o supero-mediale. Mentre la scintigrafia ossea mostra incrementato uptake di radiofarmaco in sede articolare prima ancora che siano rilevabili i segni radiografici, la RM consente di effettuare diagnosi differenziale con altre forme cliniche (fra cui la temuta osteonecrosi della testa femorale)[18].

Osteonecrosi avascolare della testa del femore

L'osteonecrosi della testa femorale è spesso causata da insufficiente apporto ematico o dalla sua completa interruzione. Le cause di questo quadro clinico possono essere varie (traumi, agenti fisici e chimici, idiopatica). La malattia ha una lenta evoluzione che, nel giro di 3-4 mesi, porta a sostituire l'area ischemica con tessuto riparativo. Tale fenomeno può poi esitare in artrosi. L'esame radiografico standard pertanto nei primi periodi appare di norma muto, come anche la TC. I primi segni di osteonecrosi appaiono solo in seguito al collasso strutturale del tessuto osseo necrotico, mostrando un'area radiopaca solo dopo molti mesi dall'evento, con conservazione dell'interfaccia articolare. La metodica più accurata per rilevare questa patologia è la scintigrafia ossea, che mostra l'area ischemica dapprima ipocaptante nei primi giorni e poi ipercaptante in seguito all'instaurarsi dei processi riparativi. La RM in tale patologia, oltre a presentare sensibilità elevata, consente di monitorare nel tempo l'andamento dei processi riparativi e di classificare pertanto i soggetti affetti secondo i seguenti stadi[19]:

Stadio	Descrizione
I	Morte cellulare
II	Iperemia
III	Reazione attorno alla necrosi
IV	Comparsa dell'osteonecrosi all'esame radiologico standard
V	Collasso osseo per frattura subcondrale, artrosi secondaria

Malattia di Legg-Calvé-Perthes di destra

Raggi X dei fianchi di una donna di 40 anni, con displasia dell'anca destra.

La malattia di Legg-Calvé-Perthes è un'osteonecrosi della testa femorale che insorge fra i 4 e gli 8 anni di vita a livello del nucleo di ossificazione localizzato nella testa del femore. Radiologicamente si evidenzia con riduzione in dimensioni, sublussazione laterale, fissurazione e frammentazione del nucleo stesso, associati a collasso ed appiattimento della testa del femore[20].



Epifisiolisi della testa femorale

Le fratture a livello del femore più temibili sono quelle che si localizzano a livello della testa e sono divisibili in intra ed extracapsulari. La peggiore complicanza di tale evento è la necrosi ischemia della testa femorale (dovuta a rottura dell'arteria tributaria), che rende necessaria la sua sostituzione con una protesi. È possibile diagnosticare precocemente questa condizione mediante la scintigrafia ossea o la RM.

Le fratture dell'acetabolo sono sempre diagnosticabili mediante l'esame radiologico standard, anche ricorrendo a proiezioni oblique. La TC consente in tali casi una definizione anatomica migliore, oltre a permettere l'identificazione di eventuali frammenti ossei e di ulteriori fratture a livello del bacino.

La lussazione della testa femorale spesso si associa a fratture acetabolari. La direzione di tale lussazione può essere posteriore (nella maggior parte dei casi), anteriore o centrale. In tali casi una valutazione TC permette di studiare bene l'alterazione dei rapporti articolari e la presenza di frammenti ossei[21].

L'epifisiolisi della testa del femore è una lesione del piatto di accrescimento causata da un trauma. A livello prossimale tale regione è intrarticolare eduna sua rottura, specie fra i 9 ed i 16 anni, porta a disturbi nella crescita dell'osso. In tali casi l'epifisi femorale presenterà uno scivolamento postero-mediale-inferiore ed il piatto risulterà slargato. La lesione guarisce poi formando un callo osseo, con conseguente blocco della crescita. Nel tempo la lesione esiterà quindi in varismo della testa, accorciamento e slargamento del collo femorale e maggior rischio di insorgenza di osteonecrosi a livello della testa stessa[22].

La displasia congenita dell'anca è una patologia che richiede una pronta diagnosi, volta a portare ad un tempestivo intervento terapeutico atto ad impedire la lussazione dell'articolazione con migrazione laterale della testa femorale. Tale diagnosi è aiutata sia da metodiche ecografiche, sia dalla radiologia tradizionale,

che consentono di individuare dei segni tipici tramite misurazioni effettuate sulle immagini. TC ed RM possono aiutare a indagare questi pazienti, migliorando l'accuratezza della diagnosi tramite immagini tridimensionali (la RM, che non utilizza radiazioni ionizzanti, è particolarmente vantaggiosa in tale contesto)[23].

Ginocchio

Il ginocchio è l'articolazione più soggetta a traumi, con conseguenti fratture, lussazioni, lesioni a carico di menischi e tessuti molli. La radiografia del ginocchio di solito si effettua in proiezione antero-posteriore per studiare i condili femorali, i piatti tibiali, la spina tibiale e la testa del perone, mentre lo studio della rotula è affidato alla proiezione latero-laterale. La proiezione assiale di rotula si usa a volte per studiare il compartimento femoro-rotuleo. TC ed RM presentano nello studio di questa articolazione un'elevatissima sensibilità e specificità[24].

L'*osteocondrite dissecante* è una malattia caratterizzata dal distacco di parte della superficie articolare. Sono maggiormente colpiti i giovani adulti maschi, più spesso a livello dei condili femorali. Radiologicamente tale patologia si evidenzia, solo negli stadi avanzati, come una linea radiotrasparente fra il condilo ed il suo frammento. TC ed RM consentono poi di valutare il grado del distacco (parziale o completo) in modo più preciso[24].

L'*osteonecrosi spontanea* è una patologia dell'anziano che interesa il versante di carico del condilo femorale mediale. Si manifesta radiologicamente come un'area di radiotrasparenza che col tempo evolve verso un'osteolisi. La TC consente di diagnosticare la malattia precocemente distinguendo le trabecole ossee necrotiche da quelle sane, mentre la RM consente anche di studiare le lesioni a carico dei tessuti molli vicini[24].

Nello studio della *condropatia femoro-rotulea* la RM è l'unica tecnica che consente di studiare molto precocemente le alterazioni della cartilagine, specie se associata alla somministrazione di mezzo di contrasto in sede intrarticolare[24].

La *lussazione della rotula* può avere origine traumatica o essere causata da una contrazione paradossa del muscolo quadricipite femorale. Questa condizione di solito è transitoria e non sempre quindi viene identificata dall'esame radiologico diretto[25].

Nella *sindrome da iperpressione rotulea* radiologicamente si può osservare restringimento dello spazio articolare femoro-rotuleo esterno, associato a degenerazione articolare. La RM in tali casi consente di evidenziare alterazioni a carico della cartilagine, oltre alla reazione sinoviale[26].

Le lesioni dei menischi hanno di solito eziologia traumatica o degenerativa. La diagnosi di alterazioni a carico di queste strutture è effettuabile mediante la RM o la TC. In RM le rotture meniscali sono aree di alterato segnale che dalla profondità dell'organo raggiungono la sua superficie. Nel caso in cui la superficie non venga raggiunta si parla solo di degenerazione meniscale. Le lesioni traumatiche presentano di solito direzione verticale, mentre quelle di natura degenerativa di solito sono in direzione orizzontale o radiale. Il piano di scansione più utilizzato in RM per studiare i menischi è quello sagittale. Il menisco mediale è tendenzialmente più colpito di quello laterale; quest'ultimo, quando interessato da un processo morboso, si presenta inoltre slargato ed a forma di disco (*menisco discoide*) invece che di semiluna. Le rotture *"a manico di secchio"* sono di tipo longitudinale con associata lussazione del frammento posto centralmente e sono ben evidenziabili mediante la RM.

La porzione periferica dei menischi può essere interessata da cisti, costituite da raccolte di materiale mixoide, ben evidenziabili anch'esse mediante RM[26].

rottura di menisco "a manico di secchio" rilevata mediante RM



rottura del legamento crociato anteriore

Il legamento più spesso lesionato a livello del ginocchio (a causa di traumi in valgo) è il *collaterale mediale*. Una sua rottura è evidenziabile indirettamente all'esame radiologico standard mediante l'osservazione di un allargamento del comparto femoro-tibiale mediale o, meno frequentemente, come frattura delle inserzioni del legamento. Lesioni croniche possono anche presentare calcificazioni (di *Pellegrini-Stieda*). La RM in acuto permette di evidenziare alterazioni che vanno da lievi irregolarità fino alle rotture[27].

Traumi da iperestensione o di torsione possono portare a lesioni del *legamento crociato anteriore*. La radiologia tradizionale consente di evidenziare tale condizione indirettamente, mostrando edema a carico dei tessuti molli circostanti, versamento intrarticolare, fratture della porzione prossimale della tibia o di quella distale del femore (fratture di Segond, della spina tibiale anteriore, posteriore del piatto tibiale esterno, osteocondrale del condilo femorale laterale). La RM in acuto può mostrare la scomparsa del legamento associata ad edema e, più tardivamente, evidenziare le fibre superstiti se la rottura non è stata completa. A tal fine si usano di solito piani di scansione sagittali e trasversi[28].

La *tendinosi del rotuleo* si presenta più frequentemente nei giovani sportivi. In tale patologia l'ecografia è l'esame diagnostico di primo livello, in grado di evidenziare l'ingrossamento del tendine e la sua ipoecogenicità. In tal caso la radiologia tradizionale non è indicata, mentre la RM, usando piani di scansione sottili e sagittali, evidenzia aumento di spessore del tendine e disomogeneità del suo segnale[28] .

Caviglia

La distorsione della caviglia è la principale conseguenza dei traumi a livello di questo distretto, oltre ad essere la principale causa delle sue alterazioni a lungo termine. La distorsione può essere in inversione o in eversione, coinvolgendo differenti strutture anatomiche e dando quindi diversi quadri clinici. La radiologia tradizionale è l'esame diagnostico di primo livello per questo distretto, è di norma effettuata utilizzando proiezioni antero-posteriori e laterali, e consente di mostrare bene sia le fratture sia alcune rotture legamentose che portano a scomposizioni del mortaio della caviglia o a fratture di segmenti ossei specifici. Nel caso in cui la radiologia tradizionale non mostri alterazioni è necessario eseguire proiezioni aggiuntive sotto stress oppure un esame TC o RM (queste ultime 2 tecniche consentono di studiare anche i tessuti molli)[29].

Le fratture in prossimità della caviglia possono coinvolgere un solo malleolo (*unimalleolare*), entrambi i malleoli (*bimalleolare*), i 2 malleoli e la tibia distale (*trimalleolare*) oppure essere composte da più fratture comminute (*complesse*).

Nella *frattura del pilone* la linea di frattura dalla porzione distale della tibia si estende fino all'articolazione tibio-astragalica.

Distorsione della caviglia con associata frattura della fibula

Frattura del quinto metatarso

La *frattura di Tillaux* si estende dall'articolazione tibiale distale alla corticale laterale ed in caso di spostamento laterale del frammento rotto necessita di correzione chirurgica.

La frattura del terzo distale del perone è detta *frattura di Pott*; in caso sia presente anche la lacerazione della sindesmosi tibio-peroneale si parla invece di *frattura di Dupuytren* (in quest'ultimo caso si ha instabilità della caviglia)

Frattura bimalleolare

Frattura trimalleolare

Il calcagno di solito si frattura in seguito a cadute dall'alto (per tale ragione la sua frattura è anche denominata *frattura dell'amante*). In tali casi è sempre bene eseguire una TC del distretto ed un controllo radiologico del rachide per la ricerca di altre fratture occulte o per verificare se la lesione ossea raggiunga l'articolazione sottoastragalica. La frattura da stress del calcagno è invece tipica dei marciatori e degli anziani affetti da osteoporosi;in tali casi la RM è spesso di aiuto, così come la scintigrafia ossea, mentre l'esame radiologico standard è spesso muto.

A livello dell'astragalo di solito si rilevano fratture-avulsioni della superficie superiore del collo, mentre le fratture del collo e del corpo sono meno frequenti. In tali casi la radiologia tradizionale è sufficiente a fare diagnosi, mentre la RM è un utile completamento per lo studio dei tessuti molli.

Altre fratture frequenti da trauma diretto sono quelle a carico del quinto metatarso e dell'ultima falange dell'alluce[30].

Anche i legamenti della caviglia sono spesso danneggiati da traumi, specie il legamento peroneo-astragalico anteriore. L'esame RM, (eseguito dopo quello radiologico standard per la ricerca di fratture) consente anche in questo distretto di studiare in modo accurato i legamenti. In tali casi la risonanza magnetica può rlevare, oltre all'interruzione dei legamenti coinvolti, anche edema, emorragie e reazione sinoviale. I legamenti del seno del tarso sono spesso coinvolti dal trauma della caviglia e pertanto vanno sempre studiati (per tale distretto la RM è l'unica tecnica che mostra una buona accuratezza. In caso di dolore laterale ed instabilità del retropiede la sua esecuzione è sempre indicata).

I tendini della caviglia più spesso colpiti dai traumi sono quello di Achille e quello del muscolo tibiale posteriore. In tali casi l'indagine diagnostica di primo livello è l'ecografia, mentre TC ed RM sono utilizzate nei casi dubbi. Il tendine di Achille, oltre a rompersi, può anche andare incontro a tendinite cronica (si

rileva in tal caso un suo ispessimento). La presenza di un osso navicolare accessorio può invece indurre la degenerazione inserzionale del tendine del muscolo tibiale posteriore; tale quadro è ben evidenziabile sia dalla TC sia dalla RM[31].

Note

1. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 806-809.
2. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 809-810.
3. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 810-812.
4. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 812.
5. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 812-813.
6. Passariello e Simonetti, 2010, p. 813.
7. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 813-814.
8. Passariello e Simonetti, 2010, p. 814.
9. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 815.
10. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 815-816.
11. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 816-817.
12. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 817.
13. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 817-818.
14. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 818.
15. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 818-819.
16. Passariello e Simonetti, 2010, p. 819.
17. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 819-820.
18. Passariello e Simonetti, 2010, p. 820.
19. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 820-821.
20. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 821.
21. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 821-822.
22. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 822.
23. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 822-823.
24. Passariello e Simonetti, 2010, p. 823.
25. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 823-824.
26. Passariello e Simonetti, 2010, p. 824.
27. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 824-825.
28. Passariello e Simonetti, 2010, p. 825.
29. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 825-826.
30. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 826.
31. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 826-827.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia del sistema osteo-articolare

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_delle_articolazioni_e_dei_tessuti_molli&oldid=124750990"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 dic 2021 alle 14:21.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia del sistema linfatico

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia del sistema linfatico** (radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica) consente di indagare numerose patologie a carico dei linfonodi, delle vie linfatiche e degli organi linfoidi. Le malattie del midollo osseo non sono trattate in questa voce, in quanto già illustrate in Radiologia del sistema osteo-articolare e nelle sue sottovoci.

Indice

Indicazioni

Milza

- Varianti anatomiche
- Traumi
- Cisti non neoplastiche
- Ascesso
- Infarto splenico
- Splenomegalia
- Tumori Benigni
- Tumori maligni

Ruolo della medicina nucleare

Note

Bibliografia

Voci correlate

Indicazioni



Un linfonodo studiato mediante metodica color-doppler

L'ecografia può essere utilizzata efficacemente (mediante sonde al alta frequenza: 10-15 MHz) solo per studiare le stazioni linfonodali superficiali (collo, ascella, inguine) in quanto il fascio ultrasonoro non è in grado di raggiungere i linfocentri profondi. È possibile, mediante l'ecografia, discernere linfonodi affetti da patologia benigna rispetto a quelli invasi da cellule neoplastiche osservandone la sede, le dimensioni (quelli benigni di solito sono meno grandi di un centimetro di diametro), la presenza o meno dell'ilo (assente nelle stazioni linfonodali invase da cellule neoplastiche), la forma (i linfonodi benigni sono rotondi o ovali), lo spessore, la tendenza al comblomamento, le caratteristiche del parenchima e la sua vascolarizzazione (rilevabile mediante la

Linfonodi reattivi in un paziente HIV positivo che presentano captazione aspecifica alla PET con fluorodesossiglucosio. In questo caso l'imaging TC è dirimente nell'interpretazione dell'uptake di radiofarmaco

metodica ecodoppler. Una vascolarizzazione a partenza dall'ilo è un indice di benignità, una anarchica di malignità). L'ecografia è anche utilizzabile per studiare il tessuto linfoide intestinale o localizzato a livello degli organi parenchimatosi.[1]



Localizzazioni linfonodali laterocervicali di linfoma non-Hodgkin rilevate mediante TC

La radiologia tradizionale consente di evidenziare eventuali adenopatie mediastiniche mediante la radiografia del torace, come anche segni di occlusione intestinale causate da iperplasia del tessuto linfoide mediante la radiografia dell'addome. La linfografia si effettua invece iniettando un mezzo di contrasto selettivo per il sistema linfatico a livello delle estremità degli arti, permettendo quindi la visualizzazione dell'anatomia delle vie linfatiche a tali livelli. Quest'ultimo esame è particolarmente utile nello studio del linfedema.[2]

La tomografia computerizzata (TC) multistrato, che utilizza scansioni sottili (spesse da 1 a 3 mm) e un mezzo di contrasto somministrato per via endovenosa, consente di studiare in dettaglio le strutture linfonodali superficiali ed anche profonde. La TC permette di misurare le dimensioni e di studiare la forma dei linfonodi, ma non è in grado di studiarne la struttura interna. Per tali motivi, usando la sola TC, è spesso impossibile distinguere un linfonodo reattivo da uno neoplastico. Tendenzialmente, utilizzando la TC, i linfonodi con diametro maggiore di un centimetro sono da considerare patologici. In oncologia la TC è comunque uno degli esami più utilizzati per studiare il coinvolgimento linfonodale da parte della malattia ed i rapporti anatomici delle metastasi con le strutture vicine. L'utilizzo di un mezzo di contrasto somministrato per via orale permette poi di distendere le anse intestinali, facilitando lo studio delle stazioni linfonodali in questo distretto. La TC è inoltre utilizzata per guidare eventuali biopsie.[2]

La risonanza magnetica (RM), come la TC, permette di studiare sia le stazioni linfonodali superficiali sia quelle profonde, ma anche questa tecnica non consente di distinguere le adenopatie reattive da quelle neoplastiche. Normalmente i linfonodi presentano segnale ipointenso nelle sequenze T1 pesate e lievemente iperintenso in quelle T2 pesate. Un linfonodo con aumentata cellularità (sia infiammatorio che neoplastico) presenta di solito un incrementato segnale nelle sequenze T2 pesate. Esistono in commercio mezzi di contrasto per RM costituiti da nanoaggregatui ferrosi, che vengono fagocitati dalle cellule del sistema reticolo-endoteliale. Questo processo porta a una caduta di segnale nelle sequenze T2 pesate nelle aree non affette da patologie. La Angio-RM consente inoltre di studiare in dettaglio i rapporti anatomici fra le lesioni sospette e le strutture vascolari.[3]

Milza

La milza è un organo linfoide situato nell'addome in sede postero-laterale sotto il diaframma. Non è un organo indispensabile alla vita, in quanto le sue funzioni di emocateresi, immunitaria e di riserva possono essere svolte anche da altri organi se questa viene asportata. È un organo spesso soggetto a rotture in seguito a traumi[4].

L'ecografia è utilizzabile per valutare, forma, dimensioni, struttura, rapporti anatomici e presenza di alterazioni focali a carico di questo organo (è meno efficace nel rilevare alterazioni diffuse, come avviene nei linfomi). Il parenchima di norma appare omogeneo e lievemente ipoecogeno rispetto al fegato.



Misurazione ecografica del diametro longitudinale della milza

Mediante la metodica doppler è possibile studiare i vasi tributari e rilevare eventuali aneurismi. I diametri dell'organo sono misurabili in modo accurato mediante scansioni oblique intercostali. Di solito si misurano un diametro longitudinale ed uno ilo-capsulare (dall'ilo splenico all'apice della grande curvatura splenica). I valori normali di queste misure sono minori di 11 e 5 cm rispettivamente[4].

Alla TC l'organo normale appare omogeneo, con una densità compresa fra le 55 e le 65 unità Hounsfield (HU). Lo studio senza mezzo di contrasto è utile solo nel rilevare emorragie recenti. La fase parenchimale dopo somministrazione è la più importante nel caratterizzare le lesioni spleniche, in quanto in fase arteriosa il parenchima è di norma molto disomogeneo[4].

La Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto e mediante le sue numerose sequenze consente di caratterizzare le lesioni spleniche in modo molto accurato. Nelle sequenze T1 pesate la milza è di norma ipointensa rispetto al fegato, mentre appare iperintensa nelle sequenze T2 pesate. Dopo somministrazione di mezzo di contrasto il pattern di enhancement si presenta dapprima arciforme e poi omogeneo[5].

L'angiografia ha valenza soprattutto interventistica nel trattamento di aneurismi e ipersplenismo. È utile anche nello studio della milza migrante e del tronco spleno-portale[5].

Varianti anatomiche

Le tecniche di imaging radiologico sono molto utili nel rilevare anomalie congenite come le milze accessorie, la polisplenia e l'asplenia (milze multiple possono ingrandirsi in seguito a splenectomie o linfomi). La splenosi (impianto di tessuto splenico in sede peritoneale o polmonare dopo traumi) e la milza migrante (da lassità dei legamenti che la fissano) possono essere altrettanto facilmente identificate[6].

Traumi



rottura di milza

I traumi splenici sono molto frequenti e possono essere di tipo *penetrante*, *iatrogeno* (se la causa è un intervento chirurgico), oppure non penetrante (la trazione esercitata dalle strutture adiacenti causa la rottura dell'organo). La milza può anche rompersi senza subire traumi (*rottura spontanea*). Ecografia e TC identificano con molta precisione le raccolte ematiche che si formano in seguito a questi eventi, così come l'eventuale emoperitoneo conseguente. Un ematoma splenico è iperecogeno e iperdenso fino a 24 ore dalla sua genesi, per poi diventare sempre più ipodenso e anecogeno. La RM consente di documentare a livello del trauma le variazioni della struttura dell'emoglobina. La TC in tali casi è l'esame di scelta, in quanto nel politraumatizzato consente anche un'indagine di tutto il corpo[7].

Cisti non neoplastiche

Le cisti spleniche non neoplastiche sono di 3 tipi:

- cisti *idatidee* (da echinococco)

- epitaliali congenite
- pseudocisti post-traumatiche

La milza è coinvolta nelle infezioni da echinococco solo nel 5% dei pazienti, con spesso contemporaneo coinvolgimento di altri organi (specie il fegato). Alla TC tali cisti appaiono ipodense, senza rinforzo dopo somministrazione di mezzo di contrasto, ben circoscritte, con calcificazioni a livello della parete ed a volte deformazione del profilo del'organo ed aspetto multiloculato. In ecografia le cisti da echinococco spleniche si presentano anecogene con rinforzo a livello della parete posteriore. In RM si osserva in tali casi ipointensità nelle sequenze T1 pesate e iperintensità molto disomogenea nelle sequenze T2 pesate. Le cisti figlie alle sequenze T1 pesate appaiono più ipointense della cisti madre.

Le cisti epitaliali congenite sono spesso singole. In TC appaiono ipodense, ben circoscritte ed omogenee. Non si osserva in tale caso potenziamento dopo mezzo di contrasto e a volte sono evidenti trabecolature o setti. In RM tali cisti appaiono ipointense nelle sequenze T1 pesate e iperintense in quelle T2 pesate.

Le cisti post-traumatiche cambiano di aspetto a mano a mano che trascorre tempo dal trauma, presentano spesso calcificazioni parietali e sedimentazioni periferiche. Anche il segnale RM varia col tempo trascorso dal trauma; le cisti con contenuto iperproteico appaiono iperintense nelle sequenze T1 pesate e con potenziamento periferico[8].

Ascesso

Gli ascessi multipli della milza sono perlopiù evidenti nei pazienti immunodepressi. All'ecografia l'ascesso splenico appare come un'area ipoecogena che presenta un rinforzo a livello della sua parete posteriore. In TC l'ascesso appare come area ipodensa. Nelle sepsi da candida è possibile osservare multiple piccole lesioni ed occlusione delle arteriole con conseguenti aree infartuali. In RM gli ascessi sono ipointensi nelle sequenze T1 pesate e iperintensi in quelle T2 pesate. Dopo somministrazione di mezzo di contrasto possono mostrare enhancement periferico[9].

Infarto splenico



infarti splenici

All'ecografia appare come un'area ipoecogena cuneiforme, con la base rivolta verso la periferia dell'organo e l'apice rivolto verso l'ilo. Col tempo la lesione diventa iperecogena e disomogenea in quanto il parenchima splenico viene sostituito con tessuto fibrotico e calcifico cicatriziale. Alla TC l'area infartuale inizialmente appare ipodensa e non mostra accumulo di mezzo di contrasto, per poi diventare isodensa nel tempo. A volte è possibile la comparsa di un'area cistica nella sede di un pregresso infarto splenico. Il segnale RM inizialmente è dovuto alla presenza di prodotti di degradazione dell'emoglobina e non incrementa dopo somministrazione di mezzo di contrasto; col tempo la comparsa di aree di necrosi colliquativa porta la lesione a diventare ipointensa nelle sequenze T1 pesate e iperintensa in quelle T2 pesate[10].

Splenomegalia

L'ingrandimento della milza può sottendere cause molto diverse fra loro. Tutte le metodiche radiologiche sono in grado di quantificare i diametri dell'organo. L'ecografia in questi casi di solito evidenzia un'ecostruttura omogenea e con echi piccoli, con eventuale presenza in alcune forme cliniche di aree nodulari ipoecogene. TC ed RM sono molto utili nel rilevare lesioni focali anche piccole nel contesto di

milze ingrandite. Nelle malattia infiammatorie l'ecostruttura mostra echi più grossolani,intensi e con irregolarità proporzionale al grado di fibrosi; un quadro simile si rileva anche misurando le variazioni di densità in TC. Nelle forme congestizie acute in TC l'arteria splenica appare piccola e con ramificazioni periferiche accentuate, mentre nelle forme croniche si osserva ingrandimento dell'arteria splenica associata a sviluppo armonico delle sue diramazioni; in tali casi l'ecografia mostra un organo normoecogeno, ma consente di valutare l'ipertensione portale mediante le metodiche doppler. La vena splenica in caso di ipertensione portale può anche presentare aneurismi[11].

splenomegalia in un paziente con leucemia linfatica cronica

Tumori Benigni

I tumori benigni della milza sono rari; fra questi i più frequenti sono l'emangioma, il linfangioma e l'amartoma.

Gli emangiomi sono i tumori della milza più frequenti e sono spesso presenti anche in altri organi. Le loro dimensioni di norma non superano i 15 mm. Gli emangiomi cavernosi sono più comuni in questo distretto di quelli capillari. La variante *a cellule della sponda* si presenta come nodularità multiple, è composta da canali vascolari della polpa rossa e ne esiste anche una variante maligna. In ecografia tali lesioni appaiono iperecogene e omogenee se di piccole dimensioni, altrimenti si presentano disomogenei, ipoecogeni, con contorni irregolari e calcificazioni nel loro contesto. In TC l'emangioma capillare appare come una lesione omogenea iso o iperdensa. L'enhancement dopo iniezione di mezzo di contrasto è simile a quello dell'aorta, ma meno importante. La variante cavernosa può apparire simile oppure mostrarsi isodensa rispetto al sangue e lievemente iperdensa rispetto al parenchima sano. Spesso anche in TC sono evidenti calcificazioni o componenti cistiche. La rottura emorragica di queste lesioni è frequente e ben rilevata dalla TC. I noduli di emangioma *a cellule della sponda* sono ipodensi in fase portale e isointensi rispetto al parenchima in fase tardiva. In RM gli emangiomi sono iso-ipointensi nelle sequenze T1 pesate e nettamente iperintensi nelle sequenze T2 pesate. Emangiomi molto grandi possono avere aspetto disomogeneo per la presenza di aree di emorragia, trombosi o necrosi ischemica nel loro contesto. Dopo iniezione di mezzo di contrasto paramagnetico questi emangiomi possono dare enhancement omogeneo e persistente oppure periferico precoce che tardivamente diventa omogeneo o anche periferico con progressione centripeta ed evidenza di una cicatrice centrale[12].

Anche i linfangiomi splenici sono spesso associati ad analoghe lesioni in altri organi. Il linfangioma può essere cistico, capillare o cavernoso. La forma cistica ecograficamente appare come piccole cisti a contenuto finemente ecogeno confluenti. In TC tali cisti non accumulano mezzo di contrasto e presentano densità fra 15 e 35 HU, con a volte calcificazioni curvilinee. In RM tali lesioni sono disomogenee per la presenza di setti, ipointense nelle sequenze T1 pesate e nettamente iperintense in quelle T2 pesate. Le forme ad alto contenuto proteico sono nettamente iperintense nelle sequenze T1 pesate[12].

Gli amartomi sono costituiti da parenchima splenico frammisto a calcificazioni, necrosi e cisti. All'ecografia appaiono come masse ipo-isoecogene relativamente omogenee e rotondeggianti. In TC tali lesioni sono iso-ipodense e presentano lento enhancement dopo iniezione di mezzo di contrasto. In RM sono ipo-isointensi nelle sequenze T1 pesate e iperintensi in modo disomogeneo in quelle T2 pesate. L'enhancement dopo iniezione di mezzo di contrasto paramagnetico è molto variabile e disomogeneo, ma si uniforma nelle fasi tardive[13].

Tumori maligni



metastasi spleniche da carcinoma del colon-retto

Il tumore maligno di più frequente riscontro a livello splenico è il linfoma, che può essere primitivo o secondario. Il linfoma non Hodgkin a piccole cellule è quello primitivo di più frequente riscontro, mentre il coinvolgimento della milza da parte di una malattia linfomatosa sistemica è un fenomeno molto frequente. Tale interessamento può essere multificale, miliare o manifestarsi come splenomegalia. Nel 70% dei casi in cui la milza è interessata da linfoma è presente anche interessamento dei linfonodi para-aortici. Le lesioni voluminose possono poi andare incontro a necrosi, simulando l'aspetto di un ascesso nei pazienti con febbre. Se non è presente splenomegalia il coinvolgimento splenico da parte del linfoma di Hodgkin è esteso se sono presenti almeno 5 nodularità. In ecografia tali lesioni appaiono come nodularità ipoecogene con margini netti (in alcuni casi è visibile una sola grossa nodularità). In TC i nodi linfomatosi appaiono ipodensi, a margini mal definiti e presentano scarso potenziamento dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Alla RM basale i linfomi spesso non sono identificabili (a volte si rileva tenue ipointensità nelle sequenze T1 pesate e tenue iperintensità in quelle T2 pesate). Dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico l'infiltrazione diffusa presenta disomogeneo enhancement, mentre le lesioni focali no[14].

L'angiosarcoma è il tumore maligno non linfomatoso di più frequente riscontro a livello splenico. In ecografia appare come una grossa massa ben definita, disomogenea per la presenza di aree necrotiche ed emorragiche. Anche in TC l'aspetto di questo tumore e molto disomogeneo e variabile, mostrando eterogeneo uptake del mezzo di contrasto. In RM è simile ad un'area emorragica, con un anello periferico iperintenso in tutte le sequenze e porzione interna di aspetto molto variabile. Dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico il comportamento è molto variabile[15].

Le metastasi da organi distanti all'esame ecografico possono avere aspetto molto vario, mentre alla TC appaiono ipodense, a margini poco definiti e più evidenti dopo somministrazione di mezzo di contrasto. In RM le metastasi appaiono iso-ipointense nelle sequenze T1 pesate e iperintense in quelle T2 pesate, con pattern di impregnazione del mezzo di contrasto variabile in relazione all'istotipo del tumore primitivo[16].

Ruolo della medicina nucleare

La tomografia a emissione di positroni (PET) è l'esame di prima scelta nello studio dei linfomi. La PET è ormai sempre effettuata abbinata ad uno studio TC o RM coregistrato, utile per la localizzazione anatomica dei reperti PET. Anche in molte altre patologie (oncologiche e non) e mediante l'utilizzo di differenti radiofarmaci (primo fra tutti il fluorodesossiglucosio) la PET si sta imponendo come metodica di studio.[17]



Localizzazione di linfoma di Hodgkin rilevata mediante PET-TC

La linfoscintigrafia degli arti è utilizzabile per studiare la funzionalità delle vie linfatiche in questi distretti, utilizzando una minor dose di radiazioni ionizzanti e con maggior accuratezza rispetto alla linfografia. La ricerca del linfonodo sentinella si può avvalere anche dell'utilizzo di nanocolloidi marcati con ^{99m}Tc, che possono essere localizzati mediante immagini scintigrafiche.

La milza, oltre che mediante la FDG PET, può essere valutata con la scintigrafia con nanocolloidi e la scintigrafia con emazie marcate denaturate al calore[5].

Note

1. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 507-508.
2. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 508-510.
3. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 510.
4. Passariello e Simonetti, 2010, p. 623.
5. Passariello e Simonetti, 2010, p. 624.
6. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 624-625.
7. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 625-626.
8. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 626-627.
9. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 626.
10. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 627-628.
11. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 628-629.
12. Passariello e Simonetti, 2010, p. 629.
13. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 629-630.
14. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p.630.
15. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p.631.
16. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 631-632.
17. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 510-511.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 978-88-7947-515-0.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_del_sistema_linfatico&oldid=126483810"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 mar 2022 alle 10:38.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Studio TC del polmone

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Lo **studio TC del polmone** è un'indagine di secondo livello (solitamente dopo la radiografia del torace) per lo studio della patologia polmonare, oncologica e non. L'ecografia, così come l'imaging a risonanza magnetica (RM) hanno ruoli marginali nello studio del polmone, per via del contenuto aereo di tali organi che porta sia ad un basso segnale RM per mancanza di protoni sia ad una bassa riflessione delle onde sonore. La RM inoltre è fortemente soggetta ad artefatti in presenza di strutture in movimento (dato dalla respirazione e dal battito cardiaco). L'ecografia è infatti utilizzata solo per lo studio dei versamenti pleurici in vista di un loro drenaggio, mentre la RM è utilizzata perlopiù nello studio dei linfonodi e dei tessuti molli adiacenti ai polmoni.

Per quanto riguarda le metodiche medico-nucleari, la tomografia a emissione di positroni (PET), che spesso abbina alla scansione PET una scansione TC coregistrata, sta assumendo sempre più importanza nello studio della patologia oncologica polmonare e nello studio della sarcoidosi, mentre la scintigrafia polmonare rimane tutt'oggi un valido presidio nello studio dei pazienti con sospetta o diagnosticata tromboembolia polmonare che non possono eseguire una TC con mezzo di contrasto (per allergia allo stesso o per gravidanza in atto)[1].

Indice

Alterazioni elementari della trasparenza polmonare

Malattie dei polmoni, della pleura e dei bronchi

- Malattie infettive
- Tumori polmonari
- Malattie dei vasi sanguigni polmonari
- Fibrosi polmonare idiopatica
- Sarcoidosi
- Collagenopatie
- Malattie da inalazione
- Polmonite da ipersensibilità
- Patologie delle vie aeree
- Patologie della pleura

Uso della TC nella radiologia interventistica e nella radioterapia

Note

Bibliografia

Alterazioni elementari della trasparenza polmonare

Atelectasie a carico di entrambi i lobi inferiori

Diffuse opacità *"a vetro smerigliato"* in un paziente affetto da bronchiolite



Caverna tubercolare

L'aria contenuta nei polmoni attenua i raggi X emessi dal tomografo TC molto meno rispetto a quanto fanno gli altri tessuti dell'organismo, motivo per cui ogni processo patologico che sostituisce l'aria polmonare con del liquido o del tessuto porterà ad un aumento della densità localmente. In TC si parla quindi di *iperdensità* se si ha aumento della densità, ipodensità se questa diminuisce o isointensità se questa è simile a quella del parenchima polmonare sano[2].

L'atelectasia è causata dal mancato ricircolo di aria a livello di un lobo o di un segmento polmonare. Radiologicamente si presenta come un'immagine radiopaca coinvolgente il segmento interessato (quindi di forma triangolare) retraente e che tende a spostare i tessuti intorno (innalzamento di un emidiaframma, spostamento del mediastino e delle scissure interlobari[2].

La *consolidazione* (o *addensamento*) si ha per sostituzione di una porzione di parenchima polmonare con del liquido o tessuto. Radiologicamente si presenta come opacità "a chiazze", in cui a volte è possibile osservare all'interno l'immagine dei bronchi pieni di aria (*broncogramma aereo*). Il coinvolgimento col tempo poi può estendersi, di solito non oltrepassando le scissure. Nella consolidazione non si ha mai riduzione del volume polmonare[3].

Estesa area di consolidamento a livello del polmone destro da polmonite, è ben evidente il *broncogramma aereo*



Nodo polmonare solitario



Honeycombing in un paziente con sclerosi sistemica

Le *opacità a vetro smerigliato* sono delle consolidazioni senza cancellazione dell'architettura parenchimale, causate da inspessimento della parete degli alveoli e dal loro riempimento di liquido proteinaceo per alveolite[4].



Mesotelioma pleurico a destra evidente come netto inspessimento della pleura ed esteso versamento

I *noduli polmonari* sono formazioni rotondeggianti di diametro massimo mai superiore ai 3 centimetri (nodularità di dimensioni superiori sono dette *opacità rotondeggianti* o anche *masse polmonari*). Queste nodularità possono poi essere di dimensioni da 1 a 3 mm e diffuse (opacità *miliariche* o *micronodulari*), oppure avere diametro da 3 a 10 mm (opacità *sopramiliariche*). Le masse polmonari sono spesso di natura neoplastica, ma possono essere anche dovute ad altre cause (cisti da echinococco, versamenti pleurici saccati, ascessi, sequestri, ecc...). In presenza di masse che si proiettano al bordo del polmone è bene sempre studiare il rapporto fra queste e la pleura. Le masse extrapleuriche infatti formano un angolo smusso fra la pleura ed il loro bordo, mentre quelle polmonari si presentano con un angolo acuto (*segno dello scollamento pleurico di Grilli*)[4].

Aree di ipodensità in ambito polmonare sono da attribuire a *cisti* piene di aria (con eventuale liquido associato) che presentano pareti proprie, oppure a *cavitazioni* (di origine infettiva o neoplastica) causate da colliquazione del parenchima polmonare. Uno spessore delle pareti di queste formazioni inferiori ai 2 mm è un buon indice di benignità (valore predittivo positivo pari al 95%). Uno spessore di parete fra i 2 ed i 15 mm porta la probabilità di malignità al 50%, che sale al 95% in caso di lesioni con pareti più spesse di 15 mm. Anche l'eccentricità o l'irregolarità della cavitazione dispone per una sua malignità[5].

Le *opacità interstiziali* si presentano di forma lineare o reticolare e sono dovute ad inspessimento e fibrosi dei setti interlobulari o ad interstiziopatia. Spesso concomitano in tali casi le opacità a vetro smerigliato[6].

L'*Honeycombing* (aspetto a nido d'ape) è l'aspetto della fibrosi polmonare allo stadio terminale. Si presenta come opacità circolari di 2-10 mm, disposte a forma di alveare e con aspetto pseudo-cistico[6].

Le *linee di Kerley* sono particolari opacità lineari e sono di 3 tipi (A,B e C). Le linee di Kerley di tipo B sono perpendicolari alla pleura, più corte di 2 cm, in sede basale e dovute ad inspessimento dei setti interlobulari da deposito di emosiderina, causato da un pregresso edema polmonare. Le linee di Kerley A invece sono tralci profondi di tessuto connettivo e, come le C, non hanno significato clinico[6].

Opacità possono poi osservarsi a livello della pleura e della parete toracica, come ad esempio i versamenti pleurici, che cambiano posizione a seconda se il paziente è in clinostatismo o ortostatismo. Nei versamenti più grandi queste opacità sono dense, omogenee e senza broncogramma aereo. Un versamento col tempo può evolvere poi in fibrosi della pleura (*cotenna*); in tali casi si osserverà un'opacità para-costale o anche l'obliterazione del seno costo-frenico, fissità diaframmatica e retrazione del mediastino. In tali casi non si hanno cambiamenti cambiando la posizione del paziente[6].

Le *calcificazioni* in sede pleurica appaiono come placche concave e molto dense[6].

Ipodensità diffusa in ambito polmonare si piò osservare in numerose patologie (pneumotorace, enfisema polmonare, bronchiolite obliterante, dopo intervento chirurgico di lobectomia, cisti aeree, atelectasie, assenza congenita del muscolo pettorale, ecc...)[7].

Malattie dei polmoni, della pleura e dei bronchi

Malattie infettive

Polmonite lobare a destra

La polmonite lobare radiologicamente appare come un'area di consolidamento con broncogramma aereo che coinvolge un intero lobo ed è delimitata quindi dalle scissure. Non si ha in questo caso perdita di volume. Vari batteri o funghi possono causare questo tipo di polmonite[8].



Broncopolmonite obliterante



Ascesso polmonare

La broncopolmonite (o *polmonite a focolai*) presenta una distribuzione segmentaria ed a chiazze delle opacità, a volte associata a lieve perdita di volume. Può essere causata dallo stafilococco aureo, dall' haemophilus influenzae o dal micoplasma[8].

Polmonite da *pneumocistis carinii*



Caverna tubercolare

Gli *emboli settici* appaiono in ambito polmonare come nodularità a margini non definiti, spesso bilaterali[8].

L' *ascesso polmonare* radiologicamente si presenta come un nodulo con all'interno dell'aria o un livello idro-aereo. Sono causati da batteri anaerobi, aspergillus o mycobacterium tuberculosis[8].



Tubercolosi miliare

Aspergilloma sviluppatosi dentro una caverna tubercolare

Lo pneumatocele è causato dallo stafilococco aureo e radiologicamente appare come un'area di ipodensità a pareti sottili, dovuta ad intrappolamento d'aria, che persiste per mesi dopo la guarigione clinica[8].

La polmonite virale radiologicamente si presenta con opacità reticolo-nodulari, prevalentemente interstiziali e peribronchiali. Un aspetto radiologico simile si può anche avere nelle polmoniti da mycoplasma[8].

La polmonite da pneumocistis carinii si evidenzia radiologicamente con opacità "a vetro smerigliato" associate ad inspessimento dell'interstizio. Col progredire della malattia si possono poi evidenziare aree di consolidamento con aspetto cistico[9].

L'infezione primaria da M. tuberculosis, di norma clinicamente silente, può presentarsi radiologicamente come un focolaio polmonitico, adenopatie mediastiniche e raramente strie di linfangite. Il quadro di norma si risolve in un mese (persistenze più lunghe sono sospette per linfoma o sarcoidosi)[9].

L'infezione post-primaria da M. Tuberculosis è dovuta a riattivazioni di pregresse infezioni primarie, colpisce di solito gli apici polmonari, la porzione dorsale dei lobi superiori e la porzione apicale di quelli inferiori. Radiologicamente tale quadro clinico può presentarsi come chiazze radiopache confluenti (espressione di produzione di essudato da parte della malattia) oppure come *caverne* (aree di ipodensità circondate da tessuto fibroso e dovute a drenaggio di una zona colpita dalla *necrosi caseosa*). Dato che la TBC diffonde nei polmoni in senso cranio-caudale, a questi segni tipici nelle porzioni superiori sono associati focolai bronco-pneumonici in sede basale[9].

La tubercolosi *miliare* è dovuta ad embolismo settico da un complesso primario. Radiologicamente si presenta in ambito polmonare come nodularità di 1-7 cm, che spesso contengono al loro interno calcificazioni centrali e concentriche[9].

L'infezione polmonare da aspergillus (aspergillosi) può presentarsi in varie forme cliniche, in relazione allo stato di immunodepressione dei pazienti colpiti:

- l' *aspergillosi polmonare allergica* è tipica del paziente asmatico o affetto da fibrosi cistica. Radiologicamente si presenta con bronchiettasie centrali e sacculari a livello dei lobi superiori, con associata presenza di muco all'interno dei bronchi
- l' *aspergilloma* è dovuto alla crescita del fungo in una cavità preformata piena di aria all'interno del polmone (es. una bolla di enfisema o una caverna tubercolare). Radiologicamente si evidenzia come un'area di ipodensità con all'interno un incluso (il fungo in accrescimento).
- l' *aspergillosi invasiva* è tipica dei pazienti fortemente immunodepressi. Radiologicamente si presenta come multiple nodularità polmonari, con un alone di aspetto "a vetro smerigliato" (*"halo signi*", causato da emorragie intorno alle sedi di infezione). Questi noduli tendono a guarire formando delle cavitazioni. Una forma simile, ma meno aggressiva, tipica di pazienti un po' più immunocompetenti, è l'*aspergillosi semi-invasiva*[10].

Tumori polmonari

Adenocarcinoma polmonare a sinistra

Le neoplasie polmonari possono essere suddivise per sede anatomica in periferiche o centrali.


Carcinoma bronchiolo-alveolare

Le neoplasie periferiche radiologicamente si presentano come nodi o masse con margini irregolari (spiculate o mammellonate) spesso associate ad adenopatie ilari e mediastiniche. In alcuni casi queste masse possono essere escavate ed alcuni istotipi (carcinoma bronchilo-alveolare) possono evidenziarsi come aree "a vetro smerigliato" rendendo difficoltosa la diagnosi differenziale.

Le neoplasie centrali possono invece causare ostruzione bronchiale, con conseguente polmonite, bronchiectasie ed intrappolamento d'aria. Anche in tali casi spesso si associano linfoadenopatie ilari e mediastiniche, come pure segni cronici di linfangite, infiltrazione pleurica e metastasi al polmone controlaterale[11].

Nodo polmonare solitario

Il *nodo polmonare solitario* è un'opacità di diametro inferiore a 3 cm, forma rotondeggiante, senza alterazioni del parenchima adiacente e non associato ad adenopatie. Nel 90% dei casi questi nodi sono scoperti per caso facendo una TC del torace per altri motivi. Le dimensioni sono la prima cosa da considerare nella diagnosi di malignità di questi nodi (se maggiori di 3 cm quasi certamente si è di fronte ad un nodo maligno, mentre fra 1 e 3 cm sono maligni solo il 40% dei casi e sotto il centimetro sotto il 20%). I nodi maligni presentano inoltre margini irregolari e microcalcificazioni eccentriche (calcificazioni lamellari, centrali o diffuse invece suggeriscono una genesi benigna). I noduli maligni inoltre, dopo somministrazione di mezzo di contrasto per via endovenosa di solito incrementano la loro densità di un valore maggiore di 15 Unità Hounsfield. Il software *Advanced Lung Analysis* (ALS) consente di studiare nel tempo su acquisizioni seriate il cambiamento in dimensioni di questi nodi, con una sensibilità del 98% rivalutando il nodo sospetto dopo 3-4 mesi. Un tempo di raddoppiamento delle dimensioni minore di 200 giorni è sospetto per malignità, mentre se tale parametro è maggiore di 500 giorni più probabilmente si ha a che fare con una forma benigna. La PET con fluorodesossiglucosio è indicata per lo studio dei nodi sospetti di dimensioni maggiori di 1 cm (dimensioni minori vanno valutate caso per caso, per il rischio di falsa negatività dell'indagine)[12].

La TC è anche utilizzata per guidare le biopsie dei nodi polmonari sospetti[13].

La stadiazione del tumore polmonare può essere effettuata sia usando la TC da sola sia mediante la PET/CT (con maggiore sensibilità nello studio dei parametri N ed M), mentre la RM è utile per studiare l'infiltrazione della parete toracica e dei tessuti molli adiacenti (in quanto il grasso della parete presenta segnale molto diverso dal tumore). Questa considerazione vale soprattutto per i tumori dell'apice polmonare, ove la RM è superiore alla TC[14].

Nella stadiazione dei linfonodi, dimensioni di questi oltre ai 10 mm fanno propendere verso la malignità delle adenopatie. L'unica eccezione sono le stazioni sottocarenali, in cui la soglia è 12 mm. Tuttavia la diagnosi di certezza di malignità in sede linfonodale può essere ottenuta solo mediante biopsia dei linfonodi sospetti, in quanto nessuna tecnica radiologica o medico-nucleare è in grado di distinguere un linfonodo infiammatorio da uno neoplastico[15].

Le metastasi a distanza del tumore polmonare più spesso colpiscono l'encefalo, il surrene, il fegato e lo scheletro. La PET con FDG presenta un'elevata sensibilità e specificità nel rilevarle, mentre la scintigrafia ossea è molto sensibile nello studio dello scheletro. Nello studio del surrene e del fegato TC ed RM sono sensibili ma non specifiche, richiedendo quindi spesso a completamento diagnostico la biopsia dell'organo sospetto. La RM è utilizzabile per lo studio dell'encefalo[16].

Malattie dei vasi sanguigni polmonari

Nell'edema polmonare cardiogeno si ha ristagno di liquido a livello dei polmoni, che radiologicamente si evidenzia come ingrandimento in diametro dei vasi venosi polmonari (specie a livello dei lobi superiori, dove possono raggiungere anche i 13 mm di diametro) associato a strie di Kerley di tipo B in sede basale, versamento pleurico bilaterale e ristagno alveolare che col tempo si evidenzia come consolidazioni a chiazze con broncogramma aereo. È anche spesso presente incremento del volume cardiaco[17].



Edema polmonare acuto, scansione coronale. Si noti l'ingrandimento del cuore e l'ingrandimento dei vasi venosi polmonari

Nell'edema polmonare non cardiogeno (ARDS) il quadro è simile al precedente, ma senza ingrandimento in diametro dei vasi venosi polmonari e del cuore e con possibile esordio monolaterale[18].

L'ipertensione arteriosa polmonare, di qualunque origine sia, può evidenziarsi radiologicamente come ingrandimento in diametro dei vasi arteriosi polmonari[18].



Angio-TC in un caso di tromboembolia polmonare. I trombi nei vasi arteriosi polmonari appaiono all'interno del lume come aree non opacizzate dal mezzo di contrasto

La diagnosi di embolia polmonare è quasi di certezza se effettuata usando la TC spirale con mezzo di contrasto iniettato per via endovenosa; che permette di evidenziare eventuali trombi all'interno dei vasi arteriosi polmonari se presenti come aree di non opacizzazione all'interno del loro lume. La TC consente inoltre di distinguere le embolie acute da quelle croniche; in queste ultime i trombi sono in sede murale, il difetto di riempimento è periferico e sono presenti incremento in diametro sia delle arterie polmonari sia dei bronchi coinvolti. Sono inoltre evidenti molto spesso eventuali segni di scompenso cardiaco studiando i diametri di quest'organo[18].

Le malformazioni artero-venose (MAV) radiologicamente appaiono come masse ben definite che incrementano di densità dopo somministrazione di mezzo di contrasto, solitamente localizzate a livello dei lobi inferiori[19].

Fibrosi polmonare idiopatica



Fibrosi polmonare idiopatica in stadio avanzato

Radiologicamente esordisce con fibrosi settale, parasettale e successivamente sub-pleurica a livello dei lobi inferiori. Alla TC polmonare ad alta risoluzione (HRCT) le aree attive di malattia presentano aspetto "a vetro smerigliato", che poi evolve in "reticolo-nodulare", fino all'honeycombing. Distingurere le aree attive dalle altre è utile in quanto solo queste possono essere trattate con successo utilizzando corticosteroidi o altri farmaci[20].

Sarcoidosi

La malattia è stadiabile utilizzando la TC. Gli stadi sono i seguenti:

Stadio	Descrizione
0	Quadro TC normale
I	Adenopatie simmetriche in sede ilare, paratracheale e tracheo-bronchiale
II	Adenopatie + opacità reticolo-nodulari o confluenti
III	Opacità polmonari in assenza di adenopatie in sede ilare
IV	Fibrosi polmonare

Altri segni rilevabili con la TC sono il versamento pleurico, lo pneumotorace e le calcificazioni "a guscio" dei linfonodi (possono a volte poi essere coinvolte solo le stazioni linfonodali ilari di un solo lato). A livello polmonare le opacità possono essere molto varie (noduli linfangitici, "a vetro smerigliato", consolidamenti, inspessimenti pleurici o lineari) e spesso sono associate bronchiettasie. La PET con FDG può aiutare nei casi dubbi, tuttavia questa malattia può essere diagnosticata con certezza solo tramite biopsia di una zona coinvolta per via broncoscopica[21].



Sarcoidosi polmonare. La freccia indica un'adenopatia ilare

Collagenopatie

Queste malattie da auto-anticorpi sono caratterizzate dapprima da una flogosi interstiziale che porta alla formazione di granulomi e successivamente da vasculite, che colpisce preferibilmente i lobi polmonari inferiori (in quanto maggiormente vascolarizzati) per poi estendersi ai vasi di calibro maggiore dando ipertensione polmonare ed insufficienza respiratoria. La diagnostica radiologica si avvale in prima istanza della radiografia del torace e successivamente della HRTC, preferibilmente eseguita sia in posizione supina sia prona[22].

L'artrite reumatoide (AR) a livello polmonare si manifesta con noduli necrobiotici che cambiano rapidamente il loro volume (anche scomparendo) e versamento pleurico bilaterale. Nella sindrome di Caplan questi aspetti tipici dell'AR si associano a quelli della pneumoconiosi. Radiologicamente si possono osservare opacità a carico di entrambe le basi polmonari di tipo alveolare o reticolo-nodulare. Nella fase finale la malattia porta a fibrosi polmonare diffusa (honeycombing)[23].

I pazienti affetti da Lupus eritematoso sistemico (LES) tipicamente presentano a livello polmonare versamento pleurico ricorrente; oppure la polmonite acuta lupoide, caratterizzata da opacità di tipo alveolare che evolvono verso l'ARDS. In rari casi è possibile anche osservare alveolite fibrosante[23].

La spondilite anchilosante a livello polmonare si manifesta con fibrosi tipica a carico dei lobi superiori (regioni dove lo stress meccanico dato dai movimenti respiratori è maggiore)[23].

La granulomatosi di Wegener si manifesta invece a livello polmonare come nodularità multiple (che spesso vanno incontro a cavitazione) e come opacità reticolo-nodulari a livello delle basi. È possibile anche osservare atelectasie secondarie alla stenosi bronchiale data dalla malattia, emorragie, infezioni ricorrenti, masse date da confluenza di più noduli[24].

Malattie da inalazione

La pneumoconiosi è causata da inalazioni di polveri inorganiche. Di questa malattia sono note sia forme *benigne*, non fibrosanti e che danno minimi segni radiologici, causate da inalazioni di polveri di stagno, ferro e bario; sia forme *maligne*, altamente fibrosanti e bene indagabili utilizzando l'HRCT, causate da diossido di silicio (silicosi), amianto (asbestosi) e polvere di carbone[25].

La silicosi di norma colpisce i lobi superiori, evidenziandosi dapprima come noduli di 2-3 mm, che poi aggregandosi formano masse.

La silicosi sub-acuta (da 5 a 15 anni dopo l'esposizione alle polveri di diossido di silicio) si manifesta radiologicamente come nodi in sede medio-basale, spesso associati ad altre malattie polmonari come la TBC o le collagenopatie.

Silicosi

La silicosi acuta si manifesta invece dopo meno di 3 anni dall'esposizione alle polveri ed ha decorso fulminante, evidenziandosi alla HRTC con multiple aree "a vetro smerigliato" e di consolidamento alveolare[25].

L'asbestosi, dovuta all'inalazione prolungata di polvere di amianto, si manifesta invece come placche pleuriche, in sede spesso bilaterale e postero-basale, associate a metaplasie calcifiche, inspessimento delle scissure interlobari e versamento pleurico benigno. Osservando il parenchima polmonare il segno tipico di asbestosi sono le strie di fibrosi subpleurica, che col tempo evolvono in quadri reticolari fino all'honeycombing. È possibile osservare anche un'opacità detta *atelectasia rotonda*, spesso associata ad ispessimento della pleura in sede postero-inferiore, più densa nella sua porzuione periferica e mai completamente circondata da polmone. Tale quadro si associa a retrazione e riduzione del volume polmonare[25].

Polmonite da ipersensibilità



Polmonite da ipersensibilità

È una malattia causata da depositi di immunocomplessi fra alcuni antigeni organici inalabili (spore fungigne o antigeni animali) e loro specifici anticorpi.

Radiologicamente è possibile osservare sia aspetti acuti della malattia (reversibili, come aree "a vetro smerigliato" da edema interstizio-alveolare e, più raramente, addensamenti a chiazze) sia segni di cronicizzazione (in cui si ha fibrosi progressiva, specie a livello dei lobi superiori)[24].

Patologie delle vie aeree

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) può presentarsi in 2 forme cliniche: i *Blue Bloaters* (soggetti giovani, cianotici, gonfi, con tosse grassa e dispnea durante le riacutizzazioni) ed i *Pink Puffers* (in cui prevale l'enfisema e la dispnea è ingravescente).

Nei *Blue Bloaters* il quadro HRTC è aspecifico: immagini tubulari radiopache che rappresentano i bronchi inspessiti, accentuazione della trama polmonare, (descritta anche come *"polmone sporco"*), fibrosi interstiziale, inspessimenti settali ed a volte intrappolamento di aria.

Nei *Pink Puffers* il quadro radiologico invece è uguale a quello di un enfisema polmonare parasettale[22].

L'enfisema polmonare all'HRTC può essere distinto nei suoi 3 sottotipi (pan-acinare, centroacinare e parasettale). Il centroacinare infatti si presenta a "piccole bolle", nel pan-acinare è possibile osservare le strutture vascolari e bronchiali al centro del lobo in modo molto definito, mentre nel parasettale sono soprattutto interessate le porzioni di parenchima periferiche e vicino alle scissure. Tale metodica è molto sensibile nelle fasi precoci di malattia e, tramite software dedicati, consente anche di quantificare il danno in previsione di un intervento chirurgico di riduzione polmonare[26].

Le bronchiectasie (congenite e non) possono essere diagnosticate con una sensibilità estremamente elevata anche a livello dei rami bronchiali più piccoli usando l'HRCT[27].



Enfisema polmonare

Brochiectasie bilaterali. A destra è visibile una sovrainfezione

Anche la patologia malformativa dell'albero bronchiale è ben diagnosticabile usando l'HRCT. È possibile rilevare quindi eventuali ipoplasie polmonari, ipoplasie vascolari, malposizioni di bronchi o vasi, bronchi accessori, mancanza o sovrannumero di scissure (tipica scissura sovrannumeraria è quella della vena azygos che può dividere in 2 l'apice polmonare destro ed è dovuta ad anomala formazione di questa struttura venosa), sequestri polmonari (zone di polmone irrorate dal circolo sistemico, atelettasiche), la sindrome del polmone ipoplasico (dovuta a drenaggio venoso di parte del parenchima nel circolo venoso sistemico e caratterizzata da un'immagine radiopaca curva che si dirige verso il diaframma denominata *"segno della scimitarra"*) e cisti bronchiali (caratterizzandone anche il contenuto e verificando che non sia presente un meccanismo "a valvola" di comunicazione con l'albero bronchiale, tipico delle cisti ipertese che dislocano il parenchima polmonare circostante)[28].

Patologie della pleura

Versamento pleurico a destra



Mesotelioma pleurico a destra evidente come netto inspessimento della pleura ed esteso versamento



Pneumotorace a destra

Sebbene la semplice radiografia del torace sia già in grado di rilevare versamenti pleuriuci, anche di modesta entità; la TC consente di individuare anche eventuali cause sottostanti a tale quadro clinico, caratterizzare il polmone e la pleura circostante (che può apparire inspessita o aumentare di densità dopo somministrazioone di mezzo di contrasto, come avviene in caso di empiema) e riconoscere bene i versamenti saccati. La presenza di un livello idro-aereo nell'ambito del versamento è indice di presenza di gas, che può essere causata da una fistola bronco-pleurica o dalla fermentazione secondaria alla presenza di germi patogeni[29].

Il mesotelioma (tumore maligno della pleura praticamente sempre associato all'esposizione all'amianto) radiologicamente si evidenzia come inspessimento della pleura stessa (con rare calcificazioni ed a volte retrazione dell'emitorace), versamento pleurico o le due cose assieme. La TC è la tecnica di scelta utilizzata sia nello studiare l'estensione locale della malattia sia nel rilevarne le metastasi polmonari. Anche la RM può essere utilizzata per studiare in modo dettagliato la parete toracica ed i tessuti molli circostanti[30].

Lo Pneumotorace radiologicamente si rileva come un'area di ipodensità, con scomparsa del disegno polmonare e permanenza di una stria radiopaca che rappresenta la pleura viscerale. La radiografia del torace (ove appare come un'area di radiotrasparenza) è spesso sufficiente a porre diagnosi (la TC è utilizzata nei casi di pneumotorace di modesta entità). Nel pneumotorace iperteso si osserva inoltre spostamento del mediastino e/o collasso del polmone[31].

Uso della TC nella radiologia interventistica e nella radioterapia

La TC del polmone è spesso utilizzata per guidare drenaggi di versamenti pleurici di varia natura o per effuare biopsie TC guidate di nodi polmonari o inspessimenti pleurici. Anche la radioterapia dei tumori polmonari non a piccole cellule si avvale della TC per effettuare la centratura del trattamento[32].

Note

1. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 387-391.
2. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 391.
3. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 391-392.
4. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 392.
5. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 392-393.
6. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 393.
7. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 393-394.
8. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 394.
9. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 395.
10. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 395-396.
11. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 397-398.
12. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 398-400.
13. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 400.
14. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 401-402.
15. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 402-403.
16. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 403.
17. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 403-404.
18. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 404.
19. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 404-405.
20. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 405.
21. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 405-406.
22. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 408.
23. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 406.
24. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 406-407.
25. Passariello e Simonetti, 2010, pp. 407.
26. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 408-409.
27. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 409.
28. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 409-410.
29. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 410-411.
30. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 411-412.
31. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 412.
32. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 412-415.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Studio_TC_del_polmone&oldid=124607654"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 19 dic 2021 alle 17:21.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiografia del torace

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

In radiologia, una **radiografia del torace** è una proiezione radiografica utilizzata per diagnosticare alcune patologie che colpiscono il torace, il suo contenuto e le strutture vicine. Le radiografie al torace sono le radiografie più frequenti utilizzate in medicina.

Come tutti i metodi di radiografici, la radiografia del torace impiega radiazioni ionizzanti in forma di raggi X al fine di ottenere le immagini. La dose media di radiazioni per un adulto è di circa 0,02 mSv per una proiezione frontale (PA o postero-anteriore) e 0,08 mSv per una proiezione laterale (LL o latero-laterale).[1]

La durata dell'esame è di qualche minuto, al paziente è richiesta l'immobilità solo per qualche secondo.[2]

Radiografia del torace

Procedura diagnostica



L'immagine A mostra una radiografia del torace in un paziente sano, la B in un caso di polmonite da febbre Q

Tipo	Esame radiologico
Anestesia	no
ICD-9-CM	87.3 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=87.3&Submit=Search&action=search) e 87.4 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=87.4&Submit=Search&action=search)

Note

1. ^ Fred A. Mettler, Walter Huda, Terry T. Yoshizumi, Mahadevappa Mahesh: "Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine: A Catalog" - Radiology 2008;248:254–263
2. ^ *Radiografia del Torace (RX Torace): esame, indicazioni, preparazione, esecuzione, durata, costo*, su *salut3.com*.

Voci correlate

- Studio TC del polmone

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **radiografia del torace (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:X-rays_of_the_chest?uselang=it)**

MeSH	D013902 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D013902)
MedlinePlus	003804 (https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003804.htm)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiografia_del_torace&oldid=124204866"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 nov 2021 alle 11:42.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Ecocardiografia da sforzo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**ecocardiografia da sforzo** definita anche come **ecocardiografia da stress** è un esame tipico della cardiologia, dove si effettua una ecocardiografia durante un qualche esercizio fisico o l'infusione di farmaci,[1] sotto costante controllo medico.

Un medico esegue un ecocardiogramma con un apparecchio portatile

Indice

- Caratteristiche
- Procedura
  - Ecocardiografia con stress fisico
  - Ecocardiografia con stress farmacologico
    - Controversie: ecostress con dipiridamolo o dobutamina?
- Utilità e indicazioni
- Note
- Bibliografia
- Voci correlate

Caratteristiche

L'ecocardiografia da sforzo si effettua con un costante monitoraggio dell'ecocardiogramma sia prima che durante e dopo uno stress fisico a cui la persona viene sottoposta.

Lo stress può essere di tipo fisico, come una corsa su un tappeto rotante, oppure un test da sforzo al cicloergometro (cyclette - il più comune) o salire e scendere degli scalini. Lo stress di tipo fisico viene utilizzato molto raramente. Ciò per la difficoltà ad acquisire le immagini al termine dell'esercizio ma anche per le informazioni talvolta più complete che si possono ottenere utilizzando altri tipi di stress.

L'ecocardiografia da sforzo dopo stress fisico richiede l'acquisizione delle immagini entro un minuto e mezzo dalla sospensione dello sforzo. Non è purtroppo possibile valutare progressivamente cosa accade al cuore durante l'incremento dello sforzo. Se la persona non è in grado di effettuare un esercizio fisico (ad esempio per problemi ortopedici) o se il medico lo ritiene si può ricorrere ad uno stress farmacologico.

I farmaci utilizzati a questo scopo sono differenti ed infusi per via endovenosa. Quando viene eseguito uno stimolo farmacologico il paziente si trova sdraiato sul lettino ed il medico ha il tempo necessario per acquisire con l'ecografo le immagini in modo preciso e confortevole. Lo stimolo farmacologico rende possibile l'acquisizione delle immagini ecocardiografiche ad ogni aumento del dosaggio e quindi consente una valutazione passo passo. I farmaci utilizzati sono il dipiridamolo, la dobutamina o l'adenosina.

Procedura

Ecocardiografia con stress fisico

Un ecocardiogramma basale permette l'acquisizione delle immagini del cuore prima che venga effettuato lo sforzo. Questa è la valutazione basale alla quale il medico fa riferimento. A questo punto il paziente inizia ad eseguire lo sforzo fisico (pedalando sulla cyclette oppure sul tappeto rotante) fino a raggiungere una intensità massima. All'apice dello sforzo il paziente interrompe e si deve sdraiare velocemente sul lettino dove il medico esegue una nuova ecografia ed acquisisce delle immagini, nelle proiezioni usuali, che vengono paragonate con quelle basali. Come si vede la procedura è piuttosto farraginosa. Per tale motivo, con fini semplificativi, in alcuni centri lo sforzo alla cyclette è modificato in modo tale che il paziente lo possa eseguire pedalando in posizione supina.

Ecocardiografia con stress farmacologico

Vista l'indaginosità dell'ecostress fisico in molti laboratori si è diffuso l'utilizzo dell'ecostress farmacologico. Al paziente viene chiesto di sdraiarsi, con il torace già scoperto, su un particolare lettino leggermente inclinato. Il paziente deve assumere la posizione laterale sinistra (sul fianco sinistro). È comunque richiesta la collaborazione del paziente durante l'esecuzione dell'esame. Il paziente su sollecitazione del medico deve infatti assumere una serie di posizioni che favoriscono la visualizzazione delle varie strutture cardiache. Anche in questo caso vengono innanzitutto acquisite immagini a riposo (ecocardiogramma basale). Successivamente si inizia l'infusione della sostanza scelta per lo stress farmacologico. Le sostanze più impiegate comprendono la dobutamina, probabilmente la sostanza più utilizzata, ma anche il dipiridamolo[2][3] e l'adenosina[4][5]. In caso di mancato incremento della frequenza cardiaca, spesso dovuto all'interferenza farmacologica della terapia in corso (come i beta-bloccanti), è prassi comune infondere dosi aggiuntive e scalari (ogni 60") di Atropina endovena da 0,25 a un massimo di 1 mg in 4 minuti. Tale pratica è più diffusa con il Dipiridamolo, che per le sue caratteristiche farmacologiche provoca un minor incremento in frequenza rispetto alla dobutamina e agli altri agenti simpaticomimetici.

Ad ogni aumento del dosaggio del farmaco infuso il medico valuta ecocardiograficamente le eventuali alterazioni della cinetica cardiaca (il movimento di atri, ventricoli e del setto interventricolare) indotte durante lo stimolo e le confronta con le immagini basali.

Alcuni parametri, come l'elettrocardiogramma e la pressione arteriosa, sono tenuti costantemente sotto controllo durante l'esecuzione dello stress, sia fisico che farmacologico.

Controversie: ecostress con dipiridamolo o dobutamina?

La American Heart Association/American College of Cardiology ha emanato delle linee guida che concludono affermando che "l'eco stress con dobutamina ha sostanzialmente una sensibilità maggiore rispetto all'eco stress eseguito con un vasodilatatore [dipiridamolo] nella individuazione di stenosi coronarica"[6]. Diversamente la Società Europea di Cardiologia l'Associazione Europea di Ecocardiografia ritengono che i due test hanno applicazioni molto simili[7]. Una metanalisi di Picano del 2008[8] concludeva che l'ecostress con dipiridamolo e dobutamina hanno "la stessa precisione, specificità e - soprattutto - sensibilità nel rilevare la malattia coronarica." Le raccomandazioni europee evidence-based concludono affermando che la "dobutamina ed i vasodilatatori (a dosi adeguatamente alte) sono fattori di stress ischemico altrettanto potenti per indurre alterazioni del movimento della parete in presenza di una stenosi critica delle arterie coronariche".

Utilità e indicazioni

Questo esame si dimostra molto utile per comprendere la provenienza del dolore toracico, un sintomo spesso evidenziato dai pazienti. Se le arterie coronarie sono stenotiche (occluse) il flusso di sangue, che in condizioni di riposo è sufficiente alle necessità del muscolo cardiaco, durante lo sforzo può divenire insufficiente e le zone del cuore non adeguatamente perfuse (vascolarizzate), si contraggono in misura minore, in modo asincrono rispetto alle strutture controlaterali, o addirittura si fermano. Le anomalie delle contrazione possono associarsi ad alterazioni dell'elettrocardiogramma, oppure a sintomatologia di dolore toracico tipico, ma possono anche risultare il primo e unico segno di sofferenza cardiaca. L'esame è indicato per lo studio di una sospetta malattia coronarica e permette di valutare l'estensione di muscolo cardiaco a rischio. Viene in genere eseguito in caso di non eseguibilità od interpretabilità del tradizionale elettrocardiogramma da sforzo, o quando questo risulti dubbio. Tale esame è utilizzato anche per valutare in generale la prognosi[9][10][11] e su persone dopo un evento di infarto per comprendere la condizione cardiaca[12][13][14][15]. L'esame è anche indicato per soggetti con deterioramento della funzione cardiaca a causa di una coronaropatia, per valutare l'opportunità di un intervento di rivascolarizzazione con bypass od angioplastica.

Indicazioni in sintesi:

1. **probabilità pretest di coronary atherosclerotic disease (CAD) bassa (rischio a 10 anni < 10%) con**
    1. angina o equivalenti anginosi + ECG non diagnostico o impossibilità ad eseguire sforzi fisici
    2. scompenso cardiaco di nuova insorgenza o disfunzione del ventricolo sinistro senza previsione di eseguire coronarografia
    3. aritmie stress indotta compresa la tachicardia ventricolare non sostenuta VT Outflow tract ventricular tachycardia (VT) e battiti ectopici ventricolari frequenti Premature Ventricular Contraction PVC (sovente abbreviate in **CVP** o Contrazione Ventricolare Prematura)
2. **probabilità pretest di coronary atherosclerotic disease (CAD) intermedia (rischio a 10 anni 10-20%), alto (rischio a 20 anni >20%) con**
    1. angina o equivalenti anginosi
    2. dolore toracico acuto + ECG non diagnostico/↑ degli indici di miocardiocitolisi
    3. fibrillazione atriale di nuova insorgenza
3. **precedenti test anormali**
    1. cateterismo anormale
    2. stress test con peggioramento dei sintomi durante terapia medica
    3. calcium score coronarico (AGATSTON) ≥ 400
    4. stenosi coronarica di significato non chiaro all'angiografia invasiva ed al CT Computerized Tomography

Note

1. ^ Sicari R, Nihoyannopoulos P, Evangelista A, Kasprzak J, Lancellotti P, Poldermans D, Voigt JU, Zamorano JL; European Association of Echocardiography. Stress Echocardiography Expert Consensus Statement--Executive Summary: European Association of Echocardiography (EAE) (a registered branch of the ESC). Eur Heart J. 2009 Feb;30(3):278-89. Epub 2008 Nov 11. Review. PMID 19001473

2. ^ Dawson D, Kaul S, Peters D, Rinkevich D, Schnell G, Belcik JT, Wei K. Prognostic value of dipyridamole stress myocardial contrast echocardiography: comparison with single photon emission computed tomography. J Am Soc Echocardiogr. 2009 Aug;22(8):954-60. Epub 2009 Jun 23. PMID 19553084
3. ^ Barletta G, Del Bene MR. Effects of dipyridamole on cardiac and systemic haemodynamics: real-time three-dimensional stress echo beyond regional wall motion. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2011 Jul;12(7):455-9. PMID 21228713
4. ^ Abdelmoneim SS, Bernier M, Dhoble A, Moir S, Hagen ME, Ness SA, Pellikka PA, Abdel-Kader SS, Mulvagh SL. Diagnostic accuracy of contrast echocardiography during adenosine stress for detection of abnormal myocardial perfusion: a prospective comparison with technetium-99 m sestamibi single-photon emission computed tomography. Heart Vessels. 2010 Mar;25(2):121-30. Epub 2010 Mar 26. PMID 20339973
5. ^ Arnold JR, Karamitsos TD, Pegg TJ, Francis JM, Olszewski R, Searle N, Senior R, Neubauer S, Becher H, Selvanayagam JB. Adenosine stress myocardial contrast echocardiography for the detection of coronary artery disease: a comparison with coronary angiography and cardiac magnetic resonance. JACC Cardiovasc Imaging. 2010 Sep;3(9):934-43. PMID 20846628
6. ^ Mieres JH, Shaw LJ, Arai A, Budoff MJ, Flamm SD, Hundley WG, Marwick TH, Mosca L, Patel AR, Quinones MA, Redberg RF, Taubert KA, Taylor AJ, Thomas GS, Wenger NK; Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, and the Cardiovascular Imaging and Intervention Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, American Heart Association. Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected coronary artery disease: Consensus statement from the Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, and the Cardiovascular Imaging and Intervention Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, American Heart Association. Circulation. 2005 Feb 8;111(5):682-96. Epub 2005 Feb 1. PMID 15687114
7. ^ Fox K, Garcia MA, Ardissino D, Buszman P, Camici PG, Crea F, Daly C, De Backer G, Hjemdahl P, Lopez-Sendon J, Marco J, Morais J, Pepper J, Sechtem U, Simoons M, Thygesen K, Priori SG, Blanc JJ, Budaj A, Camm J, Dean V, Deckers J, Dickstein K, Lekakis J, McGregor K, Metra M, Morais J, Osterspey A, Tamargo J, Zamorano JL; Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: The Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2006 Jun;27(11):1341-81. Epub 2006 May 30. PMID 16735367
8. ^ Picano E, Molinaro S, Pasanisi E. The diagnostic accuracy of pharmacological stress echocardiography for the assessment of coronary artery disease: a meta-analysis. Cardiovasc Ultrasound. 2008 Jun 19;6:30. PMID 18565214
9. ^ Marwick T.H., Case C., Sawada S., Rimmerman C., Brenneman P., Kovacs R., Short L., Lauer M., *Previsione di mortalità con dobutamina ecocardiografia*, J Am Coll Cardiol. mar 2001 1, 37 (3) :754-60. PMID 11693748
10. ^ Marwick TH, Case C, Vasey C, Allen S, Short L, Thomas JD. Prediction of mortality by exercise echocardiography: a strategy for combination with the duke treadmill score. Circulation. 2001 May 29;103(21):2566-71. PMID 11382725
11. ^ Biagini E, Elhendy A, Schinkel AF, Rizzello V, Bax JJ, Sozzi FB, Kertai MD, van Domburg RT, Krenning BJ, Branzi A, Rapezzi C, Simoons ML, Poldermans D. Long-term prediction of mortality in elderly persons by dobutamine stress echocardiography. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005 Oct;60(10):1333-8. PMID 16282570
12. ^ Carlos ME, Smart SC, Wynsen JC, Sagar KB. Dobutamine stress echocardiography for risk stratification after myocardial infarction. Circulation. 1997 Mar 18;95(6):1402-10. PMID 9118506

13. ^ Smart SC, Knickelbine T, Stoiber TR, Carlos M, Wynsen JC, Sagar KB. Safety and accuracy of dobutamine-atropine stress echocardiography for the detection of residual stenosis of the infarct-related artery and multivessel disease during the first week after acute myocardial infarction. Circulation. 1997 Mar 18;95(6):1394-401. PMID 9118505
14. ^ De Felice F, Gostoli E, Russo M, Recanzone P, Moretti C, Pinneri F, Borello G. Early dobutamine echocardiography for the assessment of coronary stenosis after first Q-wave myocardial infarction. Int J Cardiol. 2001 Aug;80(1):47-53. PMID 11532546
15. ^ Lancellotti P, Benoit T, Rigo P, Pierard LA. Dobutamine stress echocardiography versus quantitative technetium-99m sestamibi SPECT for detecting residual stenosis and multivessel disease after myocardial infarction. Heart. 2001 Nov;86(5):510-5.

Bibliografia

- Joseph C. Segen, *Concise Dictionary of Modern Medicine*, New York, McGraw-Hill, 2006, ISBN 978-88-386-3917-3.
- Eugene Braunwald, *Malattie del cuore (7ª edizione)*, Milano, Elsevier Masson, 2007, ISBN 978-88-214-2987-3.

Voci correlate

- Cardiologia
- Ecocardiografia
- Test da sforzo
- scintigrafia miocardica
- Risonanza Magnetica Cardiaca
- Tac delle coronarie
- coronarografia

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecocardiografia_da_sforzo&oldid=118670830"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 15 feb 2021 alle 04:32.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Tomografia computerizzata cardiaca

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **tomografia computerizzata cardiaca** o **TC cardiaca** o **TC coronarografica** è una tecnica di imaging biomedico utilizzata per valutare l'entità di un'eventuale occlusione nelle arterie coronarie, solitamente al fine di diagnosticare la malattia coronarica. Al paziente viene iniettato con un mezzo di contrasto (solitamente a base di iodio) per via endovenosa e quindi il suo cuore viene visualizzato tramte un'apparecchiatura per tomografia computerizzata ad alta velocità, permettendo ai radiologi di valutare la perfusione di sangue al muscolo cardiaco.

Tomografia computerizzata cardiaca

Procedura diagnostica



Immagine ottenuta tramite tomografia computerizzata cardiaca con mezzo di contrasto di una arteria coronaria dove possono vedersi delle ostruzioni

Tipo	Imaging biomedico
ICD-9-CM	87.41 (http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=procs&srchtext=87.41&Submit=Search&action=search)
eMedicine	1603072 (http://emedicine.medscape.com/article/1603072)

Indice

Metodica
- Radiazioni ionizzanti
- Mezzo di contrasto
- Scanner

Utilizzo

Note

Voci correlate

Altri progetti

Metodica

Costituiscono parte essenziale della metodica:

- le radiazioni ionizzanti (raggi X)
- il mezzo di contrasto iodato
- lo scanner
- la stazione di *post processing*

Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono della stessa natura di quelle utilizzate per la coronarografia tradizionale e vengono erogate da una sorgente che ruota intorno al paziente.

Le radiazioni attraversano il corpo e vengono rilevate da detettori capaci infine di trasformarle in immagini, attraverso un'elaborazione computerizzata. I raggi usati sono modulati in modo da limitare al massimo l'esposizione: attualmente ci sono tecniche che consento di ottenere immagini delle coronarie con gli stessi raggi usati ad esempio per una radiografia della colonna vertebrale. È pertanto del tutto falso il concetto che con la Tomografia Computerizzata delle coronarie si espone il paziente ad una dose enorme di radiazioni. Con le apparecchiature attuali, che emettono raggi solo durante il rilievo dell'immagine, la dose radiogena scende a 1-3 milli Sievert (si consideri che le apparecchiature iniziali esponevano ad una dose di 20-30 milli Sievert). Il dato è irrilevante se si considera che per una radiografia della colonna lombare (esame frequentissimo ed innocuo) si ha un'esposizione simile. Infine, va ricordato che con la TC delle coronarie si esegue esposizione mirata ad una regione molto definita (centro del torace) con raggi collimati, ovvero mirati a quell'area, e senza esporre inutilmente altre parti del corpo. Si consideri infine che con la scintigrafia cardiaca si inietta un farmaco che arriva invece in tutto il corpo, con esposizione di 25 milli Sievert.

Mezzo di contrasto

Il mezzo di contrasto iodato viene iniettato attraverso una vena periferica e raggiunge in alcuni secondi l'albero coronarico rendendolo così maggiormente rilevabile ai raggi X. I mezzi di contrasto attualmente impiegati sono estremamente sicuri, non interferiscono con il metabolismo del corpo umano, sono estremamente rare le reazioni allergiche e vengono rapidamente eliminati dal corpo umano attraverso i reni. Importante notare che con le prime apparecchiature i tempi di acquisizione dei dati erano lunghi (15-20 secondi) e pertanto occorreva una quantità di liquido consistente (fino a 150 ml), oggi, con tempi di acquisizione più rapidi, di 1-3 secondi, la quantità di liquido di contrasto necessaria si riduce di conseguenza, a circa 40-50 ml, riducendo contestualmente i rischi correlati.

Scanner

Le immagini che vengono a formarsi sono rappresentate in sezioni o *slices* il cui spessore è di mezzo millimetro circa. L'evoluzione delle apparecchiature si contrassegna per il numero di sezioni che possono essere formate per ogni giro del tubo di raggi X. Le prime apparecchiature erano in grado di formare 4 sezioni per ogni giro. Oggi si dispone di scanner capaci di formare fino a 128 sezioni con riduzione dei tempi di acquisizione delle immagini a circa 3 secondi o fino a 250 msec., in un unico battito cardiaco. Va anche considerato che la capacità di vedere le arterie coronarie (strutture vascolari molto piccole) è influenzata dalla risoluzione della apparecchiatura utilizzata. Oggi si arriva ad un minimo di 0,3 mm, impiegando apparecchiature di ultima generazione da 128 strati, che sono quelle che stanno fornendo i migliori risultati sul piano diagnostico[1]

Utilizzo

La TC delle coronarie può essere utile nel campo sia della prevenzione primaria sia della diagnostica avanzata della cardiopatia ischemica.

In particolare essa può fornire informazioni accurate della condizione delle coronarie sia in soggetti con dolore anginoso sia nel follow up di pazienti già sottoposti a procedure di rivascolarizzazione miocardica (angioplastica con stent e bypass aorto-coronarico).

Note

1. ^ Paolo Pavone, Massimo Fioranelli, David Dowe: CT evaluation of Coronary Artery Disease, Springer, Berlin, 2009.

Voci correlate

- Arterie coronarie
- Tomografia computerizzata

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file sulla **Tomografia computerizzata cardiaca (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Computed_tomography_images_of_the_heart?uselang=it)**

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomografia_computerizzata_cardiaca&oldid=124204880"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 nov 2021 alle 11:42.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Risonanza magnetica cardiaca

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **risonanza magnetica cardiaca** è l'applicazione dell'imaging a risonanza magnetica nello studio del cuore. Grazie alla sua elevata risoluzione spaziale e di contrasto associata al non utilizzo di radiazioni ionizzanti è l'indagine di prima scelta per lo studio della morfologia, della struttura e della motilità/funzionalità cardiaca sia sotto sforzo che a riposo; oltre che rappresentare un'ottima e molto meno invasiva alternativa alla PET cardiaca nello studio della vitalità miocardica (è l'esame più accurato nel valutare l'estensione della fibrosi successiva ad un infarto del miocardio e nel rilevare piccole cicatrici ischemiche subendocardiche non visibili alla PET a causa delle loro ridotte dimensioni).



Imaging cardio RM di un infarto inferiore pregresso. Oltre al fenomeno del *late enhancement* evidente a tutto spessore a livello della parete inferiore (che appare iperintensa in questa sequenza T1 pesata) è possibile osservare acinesia dell'apice cardiaco e rigurgito a livello della valvola mitrale

Indice

Studio RM della perfusione cardiaca

Studio RM della vitalità miocardica

Bibliografia

Voci correlate

Studio RM della perfusione cardiaca

Lo studio della perfusione cardiaca viene eseguito somministrando un mezzo di contrasto a base di gadolinio (come ad esempio il Gd-DTPA, analogo del ^{99m}Tc-DTPA utilizzato in passato per effettuare la scintigrafia miocardica). Durante la procedura il paziente viene sottoposto ad un test da stress farmacologico tramite somministrazione controllata di adenosina endovena e nel contempo vengono acquisite le immagini. L'incremento regionale del segnale RM durante l'acquisizione correla con la perfusione locale del miocardio in modo analogo all'uptake dei traccianti PET e scintigrafici di perfusione.

Studio RM della vitalità miocardica

La rilevazione delle aree infartuate può essere effettuata mediante l'imaging a risonanza magnetica cardiaco, anche a seguito di studio perfusionale, somministrando il mezzo di contrasto ed andando a cercare il fenomeno del *late enhancement*, che consiste nell'aumento del segnale nelle sequenze T1 pesate a livello delle regioni fibrotiche osservato dopo 10-15 minuti dalla somministrazione del mezzo di contrasto stesso. Una minor rilevazione di aree che mostrano il *late enhancement* correla con una minor estensione della fibrosi miocardica e quindi con una maggiore capacità di recupero in seguito a procedure di rivascolarizzazione, anche se le aree colpite appaiono assottigliate acinetiche o ipocinetiche. Anche aree

con spessore di parete inferiore ai 5 mm, classificate come non vitali dalle altre metodiche morfologiche, se non presentano *late enhancement* possono andare incontro a recupero funzionale se trattate tempestivamente.

Il fenomeno del *late enhancement* localizzato a partire dal subendocardio è molto specifico per l'infarto del miocardio in quanto altri tipi di fibrosi cardiaca (es. da miocardite) danno una fibrosi disomogeneamente distribuita lungo tutto lo spessore della parete.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- test da sforzo
- ecocardiografia da sforzo
- tomografia computerizzata cardiaca
- scintigrafia miocardica
- PET cardiaca
- coronarografia

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risonanza_magnetica_cardiaca&oldid=122383837"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 9 ago 2021 alle 19:44.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Coronarografia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **coronarografia** (o **angiografia coronarica**) è una procedura di tipo invasivo che consente di visualizzare direttamente le arterie coronarie che distribuiscono sangue al muscolo cardiaco. La metodica è un'indagine interventistica transcatetere, cioè si esegue per mezzo del cateterismo cardiaco; ha finalità sia diagnostiche sia terapeutiche. Le immagini radioscopiche fornite dalla coronarografia vengono registrate su supporto informatico e archiviate. La loro interpretazione viene effettuata visualmente dal Cardiologo emodinamista.



Schema dell'anatomia della coronaria destra e sinistra

Indice

Descrizione

Storia

Modalità di esecuzione della coronarografia

Tecnica di Seldinger

Attività interventistica

Procedura pre-operatoria

Complicanze

Tecniche alternative

Note

Voci correlate

Altri progetti

Descrizione

Lo scopo della coronarografia è di mettere in evidenza la presenza di occlusioni, stenosi (restringimenti), restenosi, trombosi, aneurismi (dilatazioni) del lume delle arterie coronarie: il mezzo di contrasto iniettato fornisce un'immagine a stampo dei vasi, mentre la struttura delle pareti deve essere studiata con altre tecniche associate come l'ecografia intracoronarica (*Intravascular ultrasound* o IVUS).

Alla cateterizzazione delle coronarie, se indicata, viene a volte associata l'angiografia delle camere del cuore e la misurazione delle pressioni endocavitarie: in questo modo possono ottenersi informazioni sulle dimensioni degli atri, ventricoli e grandi vasi, sulla funzione globale e segmentaria dei ventricoli, sulla presenza di malattie dei lembi valvolari (stenosi o insufficienza), sul valore delle pressioni intravascolari che non potrebbero essere misurate direttamente in maniera non invasiva.

È possibile anche lo studio funzionale delle placche aterosclerotiche coronariche per mezzo del calcolo della riserva di flusso frazionale (*Fractional flow reserve* o FFR). Il FFR confronta la pressione a valle della stenosi con quella a monte e dà una stima quantitativa del grado di restringimento del vaso, confermando o meno il dato della visualizzazione soggettiva dell'operatore. Ciò ha permesso di limitare le procedure di trattamento delle stenosi solo ai casi in cui sono emodinamicamente significative[1].

La coronarografia è quindi una metodica invasiva (se pur minimamente), con impiego di mezzo di contrasto iodato e esposizione ai raggi X. L'uso principale è la diagnostica e il trattamento diretto dell'aterosclerosi delle arterie del cuore.

Storia

La tecnica angiografica fu sviluppata inizialmente dal medico portoghese Egas Moniz[2] all'Università di Lisbona per visualizzare la circolazione del cervello per mezzo dei raggi X e con l'aiuto di mezzo di contrasto introdotto con un catetere (angiografia cerebrale).

La cateterizzazione del cuore fu eseguita per la prima volta dal medico tedesco Werner Forssmann, che inserì un tubicino di plastica per urologia nella propria vena del braccio e lo guidò verso le cavità destre del cuore: per conservare una prova della sua sfida pionieristica, realizzò un'immagine radiografica e la pubblicò il 5 novembre 1929 col titolo *"Über die Sondierung des rechten Herzens"* (Sul cateterismo del ventricolo destro).

Il premio Nobel Werner Forssmann

Nei primi anni '40, Andrè Cournand, in collaborazione con Dickinson Richards, eseguì delle misurazioni più sistematiche dell'emodinamica del cuore. Per la loro realizzazione del cateterismo cardiaco e per gli studi emodinamici, Cournand, Forssmann e Richards condivisero il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1956[3].

Nel 1953 il radiologo Sven Ivar Seldinger scoprì una tecnica semplice e sicura per introdurre un catetere in un vaso in modo cosiddetto "percutaneo", cioè senza incisione chirurgica della cute, ma solo con la puntura diretta del vaso attraverso la cute[4].

Nel 1960 F. Mason Sones[5], un cardiologo pediatra alla Cleveland Clinic, accidentalmente iniettò il mezzo di contrasto radiologico in un'arteria coronarica anziché nel ventricolo sinistro. Sebbene il paziente, un ventisettenne affetto da malattia reumatica, ebbe un arresto cardiaco reversibile, Sones e colleghi svilupparono ulteriormente la procedura. A loro è stata accreditata la scoperta della coronarografia[6]. Nel 1966 Sones pubblicò una serie di 1000 pazienti studiati con la coronarografia[7]. Mason sviluppò anche le tecniche radioscopiche per registrare la procedura, le tecniche di amplificazione ottica dell'immagine e la chimica dei mezzi di contrasto intravascolari.

Fin dagli inizi degli anni '70, in seguito al lavoro pionieristico del 1964 di Charles Dotter[8][9] e di Melvin P. Judkins[10][11] e soprattutto per merito di Andreas Roland Grüntzig[12][13] nel 1977, il cateterismo delle arterie coronarie è stato esteso anche all'uso terapeutico, oltre che diagnostico: il trattamento fisico con angioplastica con palloncino dell'angina pectoris (meno invasivo di quello cardiochirurgico), il trattamento dell'infarto cardiaco in fase acuta prima del completamento del danno del miocardio, la ricerca per la migliore comprensione della malattia delle arterie coronariche e dell'aterosclerosi.

Il primo stent coronario fu impiantato dal cardiologo francese Jacques Puel a Toulouse, in Francia, il 28 marzo 1986. Nel suo report[14] lo indicava col nome di *endo-prothèses coronariennes auto-expansives*.

Modalità di esecuzione della coronarografia

Laboratorio di cateterismo



Immagine radiologica del catetere introdotto per via arteriosa femorale destra

Tecnica di Seldinger



puntura dell'arteria



introduzione della guida metallica



rimozione dell'ago



dilatatore



inserimento del catetere sulla guida



catetere a tre vie in posizione, dopo rimozione della guida

La coronarografia si svolge in un ambiente apposito, denominato "laboratorio di emodinamica", in condizioni di sterilità. Questo laboratorio è caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di una strumentazione radiologica dedicata allo studio del cuore in movimento (studio *dinamico* del cuore) e di tutte le attrezzature necessarie ad affrontare le eventuali complicanze che possono insorgere durante la procedura.

L'esame, eseguito in anestesia locale, non comporta dolore e si svolge grazie all'introduzione di un catetere attraverso un accesso creato o a livello inguinale nell'arteria femorale o a livello del braccio nell'arteria radiale. Dopo un breve viaggio il catetere verrà posizionato in prossimità della valvola aortica dove hanno sede le due arterie coronarie principali: l'arteria coronaria sinistra e quella di destra.

Successivamente, attraverso apposite punte, verrà introdotto all'interno delle coronarie un liquido radio-opaco (mezzo di contrasto) in modo da poterle visualizzare su uno schermo attraverso una radiografia dinamica. Nel momento di iniezione del mezzo di contrasto, il paziente può avvertire un senso di calore, che non ha alcun significato avverso e che di solito cessa dopo pochi secondi. La durata dell'esame è di circa 30 minuti, e al termine viene applicata sulla sede di inserzione del catetere una *medicazione compressiva* che serve ad evitare la formazione di un ematoma e che deve essere mantenuta in sede per circa 24 ore, per permettere la perfetta chiusura del punto di inserzione del catetere.

Il cardiologo emodinamista potrà vedere in diretta lo stato dell'albero coronarico, valutandone l'eventuale compromissione dovuta a stenosi o a occlusioni e decidendo in quel momento la terapia più adatta. Durante l'esame è anche possibile valutare la presenza di disfunzioni valvolari e di alterazioni della contrattilità del ventricolo sinistro.

Riproduci file multimediale

Immagine dell'angiografia della coronaria sinistra

Riproduci file multimediale

Immagine dell'angiografia della coronaria destra

Attività interventistica

Se si rileva una stenosi meritevole di intervento, l'équipe emodinamica opera sul vaso malato una angioplastica seguita solitamente dall'impianto di uno stent (protesi metallica preposta a mantenere la pervietà del vaso).

Procedura pre-operatoria

Oltre a scopi curativi la coronarografia è anche utilizzata come procedura pre-operatoria per definire il grado di malattia coronarica e quindi per preparare in anticipo l'intervento di by-pass.



Immagini coronarografiche di stenosi della coronaria destra e sinistra (a sinistra): immagini delle stesse coronarie alla TAC coronarica multistrato (al centro) e ricostruzione tridimensionale (a destra)

Complicanze

Come tutti i cateterismi cardiaci e vascolari (cioè come tutte le metodiche che prevedono l'inserimento di sonde all'interno dei vasi e del cuore), la coronarografia non è priva di rischi. In teoria le sonde possono apportare lesioni alle strutture attraversate, con conseguenti perforazioni, emorragie, trombosi o embolie. Nel caso specifico inoltre, poiché sono incannulate le arterie coronariche, si possono favorire fenomeni occlusivi coronarici con conseguenti ischemie. In pratica, tuttavia, queste complicanze si verificano

rarissimamente e ormai la metodica viene eseguita di routine: come in qualsiasi procedura interventistica è prevista la firma di un documento di consenso.

La complicanza più comune è la comparsa di un ematoma nella sede di puntura, di solito in regione inguinale con l'accesso femorale o radiale se l'accesso fosse dal braccio: in genere è privo di problematiche severe e si riassorbe nel giro di pochi giorni.

Il liquido di contrasto, che viene naturalmente eliminato dai reni, può avere potenziali effetti tossici sul tessuto dell'organo emuntore, specie con l'avanzare dell'età del paziente. Per rimuovere tale problema si inizia un'idratazione parenterale prima dell'esame e la si prosegue nelle due-tre ore successive, accelerando così l'eliminazione del contrasto, e controllando la funzionalità renale.[15]



Immagine della struttura della parete vasale fornita dalla ecografia intracoronarica. Il giallo indica il lume della coronaria, il celeste la lamina elastica esterna, il verde la placca aterosclerotica

Tecniche alternative

La TAC coronarica è una tecnica meno invasiva della coronarografia, poiché evita l'inserimento di cateteri endocavitari, ma espone il paziente ugualmente alla somministrazione di mezzo di contrasto radiologico e alla esposizione ad una dose non trascurabile di raggi X. Essa permette la visualizzazione delle arterie epicardiche e la ricostruzione tridimensionale dell'albero arterioso coronarico, la stima della quantità di calcio coronarico, la valutazione delle dimensioni e funzione del ventricolo sinistro. La tecnica ha la notevole limitazione di essere solo diagnostica, perché l'operatore non può eseguire nessun trattamento, come l'angioplastica e l'inserimento di stent[16].

Note

1. ^ IY. Elgendy, C. Choi; AA. Bavry, *The Impact of Fractional Flow Reserve on Revascularization.*, in *Cardiol Ther*, Sep 2015, DOI:10.1007/s40119-015-0051-1, PMID 26424728.
2. ^ António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (29 novembre 1874 – 13 dicembre 1955) è stato uno psichiatra, politico, letterato e neurochirurgo portoghese, premio Nobel per la medicina nel 1949 per la tecnica neurochirurgica della leucotomia prefrontale
3. ^ *Premi Nobel per la fisiologia 1956*, su *nobelprize.org*. URL consultato il 31 ottobre 2015.
4. ^ S.I. Seldinger, *Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography; a new technique.*, in *Acta radiol*, vol. 39, n. 5, May 1953, pp. 368-76, DOI:10.3109/00016925309136722, PMID 13057644.
5. ^ F. Mason Sones, Jr. (28 ottobre 1918 - 28 agosto 1985) è stato un medico statunitense pioniere del cateterismo cardiaco, direttore prima della *Pediatric Cardiology* e poi dal 1966 al 1975 del *Cleveland Clinic Department of Cardiovascular Disease*
6. ^ JE. Connolly, JE. Connolly, *The development of coronary artery surgery: personal recollections.*, in *Tex Heart Inst J*, vol. 29, n. 1, 2002, pp. 10-4, PMID 11995842.
7. ^ WL. Proudfit, EK. Shirey; FM. Sones, *Selective cine coronary arteriography. Correlation with clinical findings in 1,000 patients.*, in *Circulation*, vol. 33, n. 6, Jun 1966, pp. 901-10, PMID 5942973.

8. ^ Charles Theodore Dotter (1920–1985) è stato un radiologo vascolare statunitense; gli viene attribuita la paternità della radiologia interventistica. Nel 1964, insieme a Melvin P. Judkins, descrisse l'angioplastica delle arterie femorali. Nella pubblicazione auspicava la creazione di un dispositivo espandibile da impiantare nelle coronarie, pur non chiamandolo ancora "stent". Ebbe per 33 anni l'incarico di Direttore dello *School of Medicine Department of Diagnostic Radiology* presso la *Oregon Health Sciences University*
9. ^ Dotter C, Judkins M, *Transluminal treatment of arteriosclerotic obstruction. Description of a new technic and a preliminary report of its applications* (PDF), in *Circulation*, vol. 30, n. 5, 1º novembre 1964, pp. 654–70, DOI:10.1161/01.CIR.30.5.654, PMID 14226164.
10. ^ Melvin P. Judkins(3 maggio 1922 - 28 gennaio 1985) è stato un medico statunitense, cardiologo e radiologo, ideò i cateteri per coronarografia selettiva destra e sinistra con una curvatura preformata e l'uso di guide di teflon, che sono tuttora utilizzate
11. ^ MJ. Cowley, MP. Judkins, *Tribute to a legend in invasive/interventional cardiology Melvin P. Judkins, M.D. (1922-85).*, in *Catheter Cardiovasc Interv*, vol. 64, n. 2, Feb 2005, pp. 259-61, DOI:10.1002/ccd.20279, PMID 15678465.
12. ^ Andreas Roland Grüntzig (25 giugno 1939 – 27 ottobre 1985) è stato un cardiologo tedesco; per primo sviluppò con successo la tecnica dell'angioplastica coronaria con palloncino.
13. ^ SB. King, A. Gruentzig, *The development of interventional cardiology.*, in *J Am Coll Cardiol*, vol. 31, 4 Suppl B, Mar 1998, pp. 64B-88B, PMID 9530288.
14. ^ J. Puel, F. Joffre; H. Rousseau; JL. Guermonprez; B. Lancelin; MC. Morice; B. Valeix; C. Imbert; JP. Bounhoure, *[Self-expanding coronary endoprosthesis in the prevention of restenosis following transluminal angioplasty. Preliminary clinical study].*, in *Arch Mal Coeur Vaiss*, vol. 80, n. 8, Jul 1987, pp. 1311-2, PMID 2961318.
15. ^ Budhiraja P, Chen Z, Popovtzer M, *Sodium bicarbonate versus normal saline for protection against contrast nephropathy.*, in *Renal failure*, vol. 31, n. 2, luglio 2009, pp. 118-123, PMID 19212908.
16. ^ B. Szilveszter, C. Celeng; P. Maurovich-Horvat, *Plaque assessment by coronary CT.*, in *Int J Cardiovasc Imaging*, Aug 2015, DOI:10.1007/s10554-015-0741-8, PMID 26280890.

Voci correlate

- Tomografia computerizzata
- Angiografia
- Emodinamica
- Angioplastica coronarica
- UTIC

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**coronorografia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **coronorografia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coronary_angiography?uselang=it)**

Controllo di autorità	LCCN (EN) sh85032866 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032866) · GND (DE) 4165331-2 (https://d-nb.info/gnd/4165331-2)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronarografia&oldid=126281736"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 15 mar 2022 alle 20:28.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia del fegato

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia del fegato** impiega l'ecografia (indagine di primo livello, per via del fatto che è veloce, poco costosa e non espone il paziente a radiazioni ionizzanti), la tomografia computerizzata (indagine di secondo livello) e l'imaging a risonanza magnetica (indagine di terzo livello, utilizzata di solito nei casi dubbi). Le immagini radiologiche così ottenute possono poi essere utilizzate anche durante procedure di radiologia interventistica su questo organo (biopsie, drenaggi di cisti e ascessi, trattamenti iniettivi o con radiofrequenze, risoluzione di casi di ittero ostruttivo, trattamento dell'ipertensione portale)[1].

Indice

Indicazioni
- Ecografia
- Tomografia computerizzata
- Risonanza magnetica

Patologie del fegato
- Patologie diffuse
- Patologie focali benigne
- Patologie focali maligne
- Patologie vascolari

Trapianto epatico

Note

Bibliografia

Voci correlate

Indicazioni

Ecografia



Ecografia con mezzo di contrasto in un paziente con epatocarcinoma. La lesione appare iperecogena in fase arteriosa (foto a sinistra).

Come già detto, l'ecografia è la prima indagine radiologica utilizzata nello studio del parenchima epatico, in quanto presenta una buona risoluzione spaziale e consente anche di caratterizzare eventuali lesioni epatiche (anche avvalendosi delle metodica ecocolordoppler o dei nuovi mezzi di contrasto ecografici).

I principali limiti dell'ecografia, oltre a quello di essere operatore-dipendente, risiedono nella a volte scarsa capacità di visualizzare il fegato nei soggetti obesi o con molto meteorismo. L'indagine è

effettuata usando sonde da 3,5-5 MHz, in decubito supino o obliquo anteriore destro, e mediante scansioni per via sottocostale o intercostale destra.

La valutazione del volume epatico è un'indagine complessa, che di norma viene effettuata osservando i margini anteriori e inferiori dei lobi destro e sinistro (se l'organo è ingrandito questi appaiono arrotondati e nelle scansioni sottocostali il margine inferiore del lobo destro deborda oltre il polo renale inferiore).

L'ecostruttura normale del fegato è omogenea, con echi di piccole dimensioni (che la fanno assomigliare a quella del rene). I legamenti si presentano invece iperecogeni (cioè in grado di riflettere notevolmente le onde ultrasonografiche), mentre i vasi si possono ben indagare con la metodica Doppler (in particolare tale studio è importante per valutare il flusso di sangue a livello della vena porta).

L'utilizzo dei recenti mezzi di contrasto ecografici consente inoltre di differenziare le lesioni benigne da quelle maligne, valutando le curve di arrivo e di eliminazione di questi preparati[2]

Tomografia computerizzata

La tomografia computerizzata (TC) è utilizzata come indagine di secondo livello in caso di ecografia dubbia, come pure nel caso si abbia a che fare con lesioni neoplastiche (precisa localizzazione, stadiazione, *follow up*, visualizzazione delle afferenze vascolari impiegando il mezzo di contrasto).



TC con mezzo di contrasto in un paziente affetto da epatocarcinoma. La foto a sinistra è relativa alla fase arteriosa, a destra invece la fase portale.

Il fegato sano ha aspetto TC omogeneo, con densità compresa fra le 55 e le 65 unità Hounsfield. I vasi rispetto al parenchima di norma appaiono ipodensi, ma opacizzabili dal mezzo di contrasto. Lo studio in condizioni basali permette una localizzazione più precisa rispetto all'ecografia delle lesioni sospette e la valutazione della forma globale del fegato, mentre lo studio con mezzo di contrasto permette di distinguere di norma 3 fasi:

- la prima fase è detta *arteriosa*: viene acquisita 30 secondi dopo l'infusione, e consente di vedere lesioni ipervascolarizzate da rami dell'arteria epatica (epatocarcinoma, metastasi ipervascolari, iperplasia nodulare focale, adenomi, malformazioni artero-venose);
- la seconda fase è detta *portale*: viene acquisita dopo 60-80 secondi dall'infusione e valuta quali lesioni sono vascolarizzate da rami della vena porta;
- la terza fase è detta *tardiva* (o *wash-out*) e valuta invece come il mezzo di contrasto viene dismesso.

Le lesioni con elevata neoangiogenesi di norma presentano un rapido *wash-in in* fase arteriosa (ove risultano iperdense) seguito da un altrettanto rapido wash-out del mezzo di contrasto (con ipodensità nelle altre due fasi). Questo aspetto è tipico dell'epatocarcinoma. Nell'angioma cavernoso si ha invece un progressivo riempimento a partenza dalla periferia verso il centro della lesione.

Un'acquisizione in fase estremamente precoce può essere inoltre effettuata per studiare in dettaglio i vasi arteriosi.

I più recenti studi stanno cercando di aumentare la specificità nello studio delle lesioni epatiche misurando parametri semi-quantitativi a livello delle lesioni sospette[3].

Risonanza magnetica



Risonanza magnetica con mezzo di contrasto epato-specifico in un paziente affetto da iperplasia nodulare focale (teste di freccia) e da adenoma epatocellulare (freccia).

La risonanza magnetica (RM) è utilizzata nello studio delle lesioni epatiche sospette ove ecografia e TC non siano state dirimenti. In alcuni casi è anche in grado di confermare in modo certo la benignità di alcuni tipi di lesioni (consentendo di non somministrare radiazioni ionizzanti al paziente per eseguire una TC). L'assenza di radiazioni ionizzanti la rende anche adatta a studi di *follow-up* su pazienti pediatrici o allergici al mezzo di contrasto della TC. Lo studio del fegato viene di norma eseguito usando macchine con elevato campo magnetico (almeno 1,5 tesla), bobine di superficie dedicate e sequenze *Gradient-Echo* (GRE) anche con saturazione del grasso. L'acquisizione deve essere inoltre effettuata in apnea respiratoria (o mediante gating respiratorio, cioè sincronizzata con la respirazione) e con strato sottile (4–8 mm).

Le sequenze T1 pesate *Gradient-Echo* consentono di indagare in modo accurato la forma del fegato e volendo anche di rilevare componenti adipose usando la tecnica di saturazione del grasso; le sequenze T2 pesate *Fast Spin Echo* (FSE) o *Turbo Spin Echo* (TSE) invece sono utilizzate, assieme alle T1 pesate, per studiare la struttura dell'organo e rilevarne eventuali lesioni (anche a queste sequenze è possibile applicare la soppressione del grasso).

I mezzi di contrasto per RM utilizzabili nello studio del fegato sono di tre tipi, tutti da somministrare endovena:

- I mezzi di contrasto a distribuzione intravascolare/interstiziale (chelati di gadolinio) sono utilizzati sia per rilevare sia per caratterizzare lesioni sospette, mediante acquisizioni dinamiche, con sequenze T1 pesate, a partire dal momento dell'iniezione. Il significato delle tre fasi rilevabili (arteriosa, portale e venosa) è identico a quello già illustrato per la TC nel paragrafo precedente.
- I mezzi di contrasto *epato-specifici* sono anch'essi chelati di gadolinio, ma sono anche molecole idrofobe e per tale ragione sono escrete dall'epatocita nella bile, presentando quindi un'aggiuntiva fase di uptake derivante da questo meccanismo, che si verifica di norma dopo 20-30 minuti e che viene quindi studiata dopo questo intervallo di tempo dall'iniezione con un'ulteriore acquisizione T1 pesata. L'assenza di accumulo di questo tipo di mezzo di contrasto in questa fase tardiva è indice di indifferenziazione del tessuto di cui è fatto la lesione sospetta.
- I mezzi di contrasto specifici per il sistema reticoloendoteliale sono invece microparticelle di ossido di ferro che una volta iniettate vengono fagocitate dai macrofagi residenti nel fegato (le cellule di Kupffer). Questo fenomeno avviene dopo circa mezzora dall'iniezione e viene studiato quindi trascorso questo intervallo di tempo usando un'acquisizione aggiuntiva eseguita mediante sequenze T2 pesate. In presenza di un normale attività macrofagica si ha quindi riduzione del segnale a livello delle lesioni studiate.

Di norma, senza somministrare mezzi di contrasto, il parenchima epatico presenta segnale RM omogeneo, lievemente ipointenso in T1 se rapportato alla milza e ancor più ipointenso in T2. L'apparato biliare e i vasi presentano invece segnale iperintenso in T2.

È attualmente in studio l'utilizzo di ulteriori sequenze (diffusione (DWI), studi di perfusione) che consentiranno anche di effettuare studi funzionali del parenchima epatico, oltre che morfologici[4].

Patologie del fegato

Patologie diffuse

Le patologie diffuse del fegato (cioè quelle che coinvolgono tutto l'organo) non sono facilmente studiabili con le tecniche radiologiche, in quanto difficilmente le immagini correlano con il quadro clinico del paziente.

Nelle epatiti (indipendentemente dalla loro causa) è possibile (anche se non sempre) osservare l'ingrandimento dell'organo, oltre che linfonodi ingranditi in sede ilare epatica e celiaca. L'ecografia è poi spesso utile per escludere la presenza di calcoli occludenti l'albero biliare. Nell'epatite cronica l'ecografia spesso mostra anche disomogeneità del parenchima, con presenza di fibrosi (fino al quadro di cirrosi epatica). TC e RM non sono indicate nelle epatiti acute, con l'eccezione delle forme fulminanti che devono essere sottoposte a trapianto epatico o per escludere complicanze della patologia. La steatosi epatica può dare al fegato aspetto omogeeo o disomogeneo, con iperecogenicità, ipodensità alla TC e segnale RM del parenchima alterati dalla presenza dei lipidi nel suo contesto (aumento del segnale nelle sequenze T1 pesate in fase, diminuzione in quelle T1 pesate in opposizione di fase; la differenza fra queste due sequenze è indice del grado di steatosi). Le forme focali di steatosi possono andare in diagnosi differenziale con la patologia oncologica ed è tipico osservare risparmio del parenchima in sede periportale e pericoledocistica[5].

Nell'emocromatosi (malattia che porta ad accumulo di ferro in sede epatica) la RM mostra calo del segnale utilizzando tutte le sequenze (le sequenze T2* pesate sono anche utilizzate per quantificare l'accumulo di ferro). La TC consente di evidenziare il ferro in eccesso solo se questo è in grandi quantità (perché il ferro ha un alto numero atomico rispetto al parenchima circostante), ma, come l'ecografia, è importante nel rilevare eventuali complicanze della malattia (epatocarcinoma e cirrosi epatica)[6].

Nodulo di cirrosi epatica in un bambino rilevato mediante ecografia

Nello studio della cirrosi epatica l'esame radiologico di primo livello, utilizzata anche nel follow-up dei pazienti, è l'ecografia. Tipicamente si osserva ipotrofia del lobo destro associata a ipertrofia compensatoria del sinistro e del caudato. Il parenchima appare disomogeneo, con aspetto micro o macronodulare. Usando la metodica Doppler è possibile anche rilevare l'eventuale presenza di ipertensione portale e di circoli *epatofughi*. È anche importante verificare se è presente splenomegalia o ascite. Le lesioni nodulari più grandi di un centimetro devono essere studiate utilizzando un mezzo di contrasto e se è evidente un aumento della vascolarizzazione arteriosa a scapito di quella portale è bene procedere a una TC (che consente di studiare meglio la totalità dell'organo, anche nelle regioni difficilmente esplorabili con l'ecografia e di caratterizzare le lesioni sospette). In RM il fegato è dismogeneo con tutte le sequenze: i noduli rigenerativi si presentano iperintensi in T1 e iso-ipointensi in T2. Utilizzando il mezzo di contrasto i noduli di cirrosi non presentano aumento di densità in TC o segnale RM nella fase arteriosa (cosa che invece avviene nei nodi di epatocarcinoma). L'utilizzo dei mezzi di contrasto epato-specifici o per il sistema reticolo-endoteliale mostra nei noduli di cirrosi segnale normale[7].

Patologie focali benigne

Lo studio radiologico in queste condizioni cliniche è di importanza fondamentale, in quanto la diagnosi differenziale fra benignità e malignità nello studio delle lesioni epatiche è talmente accurata che spesso non è nemmeno necessario ricorrere a un prelievo bioptico.

Cisti da echinococco



MRI con mezzo di contrasto epato-specifico in un paziente affetto sia da iperplasia nodulare focale (teste di freccia) sia da adenoma epatocellulare (freccia). Entrambe le lesioni sono lievemente iperintense in T2 (A), iso o poco ipointense al mapping ADC (derivato da sequenze di diffusione) (B), iso o poco ipointense in T1 (C). Dopo iniezione del mezzo di contrasto si osserva per entrambe le lesioni segnale iperintenso nella fase arteriosa (D) e isointensità in quella venosa (E). Nella fase epato-biliare (F) l'iperplasia nodulare focale appare iperintensa rispetto al parenchima circostante, l'adenoma lievemente ipointenso rispetto al parenchima.

Le cisti sono a contenuto liquido, che all'ecografia appare anecogeno, con rinforzo a livello della parete posteriore; mentre in TC appaiono come lesioni ipodense. In RM appaiono iperintense nelle sequenze T2 pesate e ipointense in quelle T1 pesate. Le cisti non accumulano mezzo di contrasto e possono presentarsi multiple, fino a coinvolgere tutto il parenchima, nelle policistosi[8].

Le cisti da echinococco mostrano al loro interno il distacco della membrana proligena e la presenza di cisti figlie, caratteristiche visibili con tutte le tecniche radiologiche. In questi casi è comunque indispensabile effettuare una TC come pianificazione all'intervento chirurgico[9].

L'angioma è l'alterazione epatica focale più frequente dopo la cisti (con prevalenza maggiore nel sesso femminile e pari al 5-20% della popolazione generale). L'angioma cavernoso è di maggiori dimensioni, con lacune piene di sangue, trombosi interna e calcificazioni nel suo contesto. All'ecografia un angioma è definito *tipico* se è iperecogeno in modo omogeneo e con margini ben definiti; mentre è definito *atipico* se è iso-ipoecogeno rispetto al restante parenchima, presenta abbondante fibrosi o si sviluppa in un'area di steatosi (rispetto alla quale appare ipoecogeno). La metodica Doppler non consente di caratterizzare il flusso ematico negli angiomi perché questo è molto lento. Di solito gli angiomi nei soggetti sani non portano a problemi interpretativi, tuttavia in caso di patologie epatiche concomitanti è bene eseguire uno studio con mezzo di contrasto per escludere un'eventuale patologia maligna. Tipicamente l'angioma mostra enhancement che a partenza dalla periferia raggiunge il centro della lesione nelle fasi tardive (ove permane in quanto le lacune ematiche si svuotano molto lentamente). Lesioni piccole possono mostrare enhancement

Cisti epatica osservata all'ecografia



Angioma epatico osservato mediante RM. La lesione appare iperintensa nella sequenza T2 pesata (A), ipointensa in quella T1 pesata (B). Dopo somministrazione di mezzo di contrasto si osserva incremento del segnale a livello del bordo della lesione in fase arteriosa (C). In fase venosa tardiva tutta la lesione appare iperintensa (D).

Grosso ascesso epatico rilevato mediante TC

precoce (piccolo angioma ad alto flusso) con persistenza di questo nelle fasi tardive (cosa che non avviene nelle lesioni maligne). In caso di dubbio è possibile utilizzare la RM con contrasto che, oltre a fornire gli stessi dati, in condizioni basali mostra gli angiomi iperintensi nelle sequenze T2 pesate[10].

L'Iperplasia Nodulare Focale (FNH, abbreviazione dall'inglese di *Focal Nodular Hyperplasia*) è tipica delle donne giovani ed è costituita da epatociti riforniti da rami dell'arteria epatica disposti a travate, contenenti tessuto connettivo lasso che al centro della lesione costituisce una cicatrice (*scar*) segno tipico di questa lesione. In ecografia tale lesione è poco distinguibile dal parenchima circostante, tuttavia la metodica Doppler può mostrare aumento del flusso sanguigno in diastole. La TC evidenzia bene la cicatrice centrale come un'area ipodensa e mostra in molti casi un comportamento caratteristico dopo somministrazione di mezzo di contrasto (enhancement precoce in fase arteriosa a livello della componente parenchimale con associato lento wash-out nelle fasi tardive, che pone in evidenza la cicatrice centrale). Dato che questo comportamento non è sempre presente di solito con questo sospetto clinico si esegue direttamente una RM dopo l'ecografia, che mostra la componente parenchimale della lesione iso-ipointensa nelle sequenze T1 pesate e iso-iperintensa in quelle T2 pesate; la cicatrice centrale appare invece ipointensa in T1 e iperintensa in T2. L'utilizzo di mezzi di contrasto epato-specifici mostra in RM dati nelle prime tre fasi simili a quelli ottenibili dalla TC, mentre in fase epato-biliare si osserva netto accumulo del mezzo di contrasto a livello della lesione, maggiore che nel restante parenchima[11].

L'*adenoma* è un tumore benigno costituito da epatociti, più frequente nel sesso femminile, in chi fa uso di estroprogestinici e androgeni e nella seconda-terza decade di vita. Tipicamente è una lesione singola, sottocapsulare, asintomatica se non da compressione su strutture vicine o non si rompe (con conseguente emorragia). L'*adenomatosi* è una patologia caratterizzata da adenomi multipli che insorgono su fegato sano, senza storia di utilizzo di steroidi. Anche nei pazienti affetti da glicogenosi di tipo I è tipico il riscontro di adenomi epatici multipli.

L'adenoma in ecografia appare disomogeneo (per la presenza di aree emorragiche e di grasso nel suo contesto), iso-ipoecogeno, con evidenza di vascolarizzazione periferica alla metodica Doppler. Anche in TC questa lesione appare disomogenea, con aree ipodense ove è presente grasso, iperdense ove sono presenti emorragie o calcificazioni). Dopo somministrazione di mezzo di contrasto si osserva disomogeneo enhancement in fase arteriosa, con rilievo di iso-ipodensità in fase portale (per la presenza di shunt artero-venosi). Anche in RM l'adenoma appare disomogeneo e dopo somministrazione di mezzo di contrasto appare ben evidente la capsula della lesione in fase arteriosa. L'utilizzo di mezzi di contrasto epato-specifici mostra accumulo in fase epato-biliare, ma meno intenso che nell'FNH. Usando mezzi di contrasto per il sistema reticoloendoteliale si osserva incremento del segnale per l'assenza di cellule di Kupffer nel contesto della lesione[12].

Gli *ascessi* sono raccolte di materiale purulento o necrotico su base infettiva (batterica o amebica). Di solito l'infezione del fegato si propaga a partire da una diverticolosi, da infezioni delle vie biliari o da infezioni a livello di aree necrotiche. Ecograficamente l'ascesso si presenta disomogeneo e tendenzialmente ipoecogeno, con margini mal definiti. In tali casi è necessario un approfondimento mediante una TC per rilevare l'eventuale presenza di aree colliquate o occupate da gas (prodotto da batteri anaerobi). La somministrazione del mezzo di contrasto evidenzia uptake a carico della parete dell'ascesso. La TC consente inoltre di valutare in modo accurato l'estensione della malattia e la presenza di complicanze[13].

Patologie focali maligne

I tumori maligni primitivi del fegato sono costituiti principalmente dall'epatocarcinoma e dal colangiocarcinoma periferico. Altro tipo di lesione maligna di frequente riscontro sono le metastasi epatiche da tumori originati in altri distretti corporei ed il linfoma.



TC con mezzo di contrasto in un paziente affetto da epatocarcinoma. La foto a sinistra è relativa alla fase arteriosa, a destra invece la fase portale



Grosse ed ipodense localizzazioni di linfoma a grandi cellule B a livello del fegato e della milza rilevate mediante TC

L'epatocarcinoma (HCC) appare spesso come lesioni multiple (ma anche come lesione singola) che possono presentare una capsula o essere infiltranti. Di solito si origina nel contesto di una cirrosi epatica. L'ecografia è l'indagine che viene più spesso utilizzata nel follow-up dei pazienti cirrotici e mostra i nodi di HCC come lesioni ipo-iperecogene e disomogenee.
Somministrando un mezzo di contrasto questi nodi, vascolarizzati da rami dell'arteria epatica in seguito a fenomeni di neoangiogenesi indotti dal tumore, presentano un rapido wash-in in fase arteriosa seguito da un rapido wash-out nelle fasi successive. Questo quadro radiologico permette di porre diagnosi praticamente certa di HCC. A diagnosi fatta è comunque necessario ricorrere a TC ed RM per quantificare il coinvolgimento a carico dell'intero organo. La TC com mezzo di contrasto permette di osservare lo stesso quadro visibile all'ecografia, oltre ad accertare l'eventuale presenza di una capsula o di invasione di tessuti adiacenti e/o vasi, caratteristiche importanti ai fini della stadiazione. La TC consente anche di descrivere la vascolarizzazione arteriosa delle lesioni, utile per eventuali trattamenti chirurgici, di radiologia interventistica o di radioembolizzazione (TARE). In RM l'epatocarcinoma appare disomogeneo all'acquisizione basale in tutte le sequenze (tendenzialmente ipointenso nelle sequenze T1 pesate, iperintenso in quelle T2 pesate). Se l'HCC insorge sui un nodulo displasico è possibile osservare anche un "nodulo nel nodulo", evidente come un focus centrale iperintenso nel contesto di un nodo ipointenso in T2. Lo studio trifasico con mezzo di contrasto in RM dà gli stessi dati forniti dalla TC, mostrando in aggiunta la capsula (se presente) come ipointensa in condizioni basali, ma che diventa iperintensa nelle fasi tardive. L'utilizzo di mezzi di contrasto epato-specifici porterà ad osservare la lesione ipointensa (tanto maggiore quanto la lesione è sdifferenziata), mentre l'utilizzo di mezzi di contrasto per il sistema reticoloendoteliale porterà ad evidenziare la lesione come iperintensa (in quanto nel suo contesto sono presenti poche cellule di Kupffer) su uno sfondo ipointenso. Dopo il trattamento i pazienti affetti vanno poi monitorati con uno stretto follow-up, in quanto l'HCC tende a recidivare ed a dare metastasi, anche intraepatiche[14].



TC con mezzo di contrasto in un paziente affetto da colangiocarcinoma. La foto a sinistra è relativa alla fase arteriosa, a destra invece la fase portale



metastasi multiple da tumore solido al fegato rilevate mediante TC

Il colangiocarcinoma periferico origina dall'epitelio dei dotti biliari successivi alla seconda biforcazione del dotto epatico. In ecografia si rileva come una lesione spesso ipoecogena, con margini lobulati e disomogenea. Una volta posto il sospetto clinico è quindi necessario eseguire un approfondimento TC o RM. Alla TC con mezzo di contrasto la lesione si mostra retraente, si associa a dilatazione delle vie biliari e l'enhancement si presenta maggiormente a livello della periferia della lesione (la zona con maggiore cellularità) mentre la porzione centrale (costituita da fibrosi) capta alle acquisizioni tardive. La RM in condizioni basali mostra iperintensità della periferia della lesione nelle sequenze T2 pesate e ipointensità nella porzione centrale. Le sequenze T1 pesate mostrano invece ipointensità a carico di tutta la lesione, specie al centro (se sono presenti zone emorragiche al centro della lesione è possibile rilevare alcune

porzioni di questa iperintense in T1). Le scansioni trifasiche con mezzo di contrasto mostrano gli stessi dati ottenibili con la TC, l'utilizzo di mezzi di contrasto epato-specifici porta a rilevare ipointensità della lesione nella fase metabolica (in quanto questo tumore non è costituito da epatociti)[15].

Il linfoma che più spesso si manifesta con localizzazioni epatiche è quello diffuso a grandi cellule B, tipicamente negli immunodepressi. L'ecografia evidenzia in tali casi una massa ipoecogena e omogenea. Alla TC con mezzo di contrasto l'aspetto è simile in condizioni basali e la lesione capta poco il mezzo di contrasto in tutte le fasi. La RM in comdizioni basali mostra segnale omogeneo e ipointenso nelle sequenze T1 pesate, poco disomogeneo e iperintenso in quelle T2 pesate. Il mezzo di contrasto anche in RM viene captato poco e l'utilizzo di mezzi di contrasto epato-specifici mostra uptake di questi assente nella loro fase metabolica[16].

Le metastasi da tumori originatosi in altri distretti sono il tipo di lesione maligna più comune a livello epatico. Il loro aspetto all'imaging è molto vario e spesso aspecifico, ma a volte riflette l'istotipo di origine (In TC è possibile avere un aspetto " a bersaglio", con impregnazione di mezzi di contrasto nella porzione periferica vitale e ipodensità nel core centrale necrotico per la mammella e i tumori dell'apparato digerente, ipervascolare per il tumore renale, tiroideo e per i tumori neuroendocrini, cistico per i tumori cistici). L'ecografia è molto accuurata nel rilevare le metastasi epatiche che anche con questa tecnica possono avere aspetto molto vario. L'utilizzo del mezzo di contrasto in ecografia migliora ulteriormente l'accuratezza della metodica. La TC è spesso utilizzata in questi pazienti per fini stadiativi, ristadiativi e di follow-up, mentre la RM è utile nel caso sia necessario fare diagnosi differenziale con le lesioni benigne del fegato illustrate nei paragrafi precedenti[17].

Patologie vascolari



Flusso epatofugo osservato a livello della vena porta in un paziente affetto da cirrosi epatica

Nell'ipertensione portale l'ecografia evidenzia un aumento del calibro della vena porta. Utilizzando la metodica Doppler è possibile inoltre evidenziare la riduzione della velocità del flusso ematico, che si riduce sempre di più e perde le tipiche variazioni correlate al respiro col progredire della malattia, fino a che il flusso non si inverte (assume quindi direzione *epatofuga* visibile al Doppler come un *ribaltamento* del profilo spettrale). L'ecografia è inoltre utile nel rilevare eventuali trombosi (che spesso accompagnano questa patologia) o la presenza di una *rete mirabile periportale* (*cavernoma*). TC e RM invece sono gli esami di scelta per rilevare la presenza di circoli collaterali[18].

TC ottenuta in un paziente con sindrome di Budd-Chiari di origine neoplastica. Sono ben evidenti sia le metastasi epatiche (es. punta di freccia vuota) sia il trombo a livello della vena cava inferiore (punta di freccia piena).

Nella sindrome di Budd-Chiari all'ecografia il fegato si presenta di dimensioni incrementate e disomogeneo. Spesso si ha inoltre riduzione del calibro (o anche scomparsa) delle vene sovraepatiche o della vena cava inferiore, spesso con evidenza di trombosi a carico di questi vasi. La metodica Doppler con questo sospetto clinico è importante per studiare il flusso ematico e l'eventuale presenza di circoli collaterali che bypassano

l'ostruzione venosa. L'angio TC spesso in questa patologia è comunque l'esame di scelta perché consente sia uno studio dettagliato dei vasi del fegato sia di quantificare il danno d'organo utilizzando il mezzo di contrasto (che ha distribuzione differente nelle aree in sofferenza o necrotiche)[19].

Trapianto epatico

Le immagini radiologiche sono molto importanti fin dalla fase preparatoria al trapianto in cui si valuta mediante TC la vascolarizzazione epatica del ricevente e anche del donatore, se questo è vivente. Lo studio dell'albero biliare viene effettuato mediante colangio-RM. L'assenza di metastasi extraepatiche o di eccessivo coinvolgimento d'organo è un'altra fondamentale condizione per procedere al trapianto nei pazienti oncologici.

Dopo il trapianto l'imaging invece riveste fondamentale importanza sia nel rilevare patologie vascolari sia eventuali riprese di malattia sul nuovo organo nei pazienti oncologici. In questo l'ecografia è molto affidabile, tuttavia utilizzando TC o RM con mezzo di contrasto è possibile caratterizzare con accuratezza la presenza di aree ischemiche, come anche di raccolte fluide, ematomi o leak biliari[20].

Note

1. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 562-563.
2. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 563-565.
3. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 565-567.
4. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 567-569.
5. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 570-571.
6. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 571.
7. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 572-573.
8. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 573-574.
9. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 574.
10. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 574-575.
11. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 575-576.
12. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 576-577.
13. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 577.
14. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 577-579.
15. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 579-580.
16. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 580.
17. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 580-581.
18. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 581-582.
19. ^ Passariello e Simonetti, 2010, pp. 582-583.
20. ^ Passariello e Simonetti, 2010, p. 583.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 978-88-7947-515-0.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_del_fegato&oldid=122769417"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 31 ago 2021 alle 10:15.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dei surreni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dei surreni** utilizza principalmente la tomografia computerizzata e l'imaging a risonanza magnetica. A tali metodiche si associano quelle proprie della medicina nucleare (scintigrafia medullo-surrenalica, scintigrafia corticosurrenalica e tomografia a emissione di positroni con FDG e altri radiofarmaci). La radiologia tradizionale non ha un ruolo specifico nello studio di questi organi, mentre le metodiche proprie della radiologia interventistica attualmente sono utilizzate solo per eseguire biopsie TC-guidate di lesioni sospette (le vecchie metodiche di dosaggio endovascolare delle catecolamine ed angiografiche non sono oggi più utilizzate). Anche l'ecografia è poco utilizzata per lo studio dei surrenti, in quanto tali organi sono di piccole dimensioni ed in una posizione difficilmente indagabile con questa metodica, in cui spesso i gas intestinali interferiscono con gli ultrasuoni (unica eccezione sono le lesioni di grandi dimensioni nei bambini).

Molte lesioni surrenaliche vengono evidenziate durante approfondimenti diagnostici effettuati per motivi terzi, indipendenti dalla ricerca di una patologia del surrene[1].

L'esame TC è di norma l'imaging di prima linea da utilizzare sia per indagare le lesioni sospette (ed anche nel rilevare eventuali loro secondarietà) sia per studiare i surreni nell'ambito di una patologia di competenza endocrinologica, in quanto il parenchima surrenalico presenza densità ben differente dal tessuto adiposo intorno. L'utilizzo del mezzo di contrasto è inoltre fondamentale per studiare la vascolarizzazione delle lesioni sospette, permettendone quindi la definizione diagnostica, anche se, talvolta, l'eventuale malignità della massa resta dubbia anche dopo l'esame TC o la risonanza magnetica (RM) a causa di caratteristiche intrinseche alla massa o causa delle dimensioni della stessa[2].

Lesioni surrenaliche con diametro maggiore di 3–4 cm sono spesso di natura maligna e devono pertanto essere asportate chirurgicamente. Formazioni che alle acquisizioni basali presentano una densità minore di 10 unità Hounsfield (HU) sono spesso invece di natura benigna a contenuto lipidico; tuttavia alcuni adenomi benigni possono non avere densità lipidica. Anche l'entità del wash-out del mezzo di contrasto a livello delle lesioni sospette correla con la malignità (una rapida dismissione è tipica di lesioni benigne) A tal fine si utilizzano scansioni a 70 secondi seguite da ulteriori tardive a 10-15 minuti e sono definiti di solito come cut-off un wash-out *assoluto* del 60% (riferito all'acquisizione basale) o *relativo* (con un cut-off pari al 40%).

L'esame RM rappresenta un'ottima alternativa a quello TC in quanto può caratterizzare le lesioni anche senza utilizzare il mezzo di contrasto e radiazioni ionizzanti, pur di contro richiedendo tempi più lunghi di esecuzione. Le principali sequenze utilizzate per caratterizzare le lesioni surrenaliche sospette, valutandone il contenuto in acqua e lipidi, includono quelle con soppressione del grasso (T2 STIR) e quelle che utilizzano la tecnica del *chemical shift* (CS). Il mezzo di contrasto paramagnetico può essere inoltre impiegato con lo stesso significato diagnostico di quello utilizzabile in TC. L'utilizzo di apparecchiature RM con un campo magnetico di elevata intensità consente inoltre di studiare la composizione chimica delle lesioni in dettaglio mediante l'analisi spettrale (rapporti fra le concentrazioni di colina e creatina maggiori di 1,2 e fra colina e lipidi maggiori di 0,38 permettono di caratterizzare una lesioni come maligna in un'alta percentuale di casi. I rapporti lipidi/creatina e ppm/creatina consentono anche di distinguere lesioni maligne di differente istologia)[3].

Indice

Patologia endocrinologica e lesioni iperfunzionanti
- Sindrome di Cushing
- Sindrome di Conn
- Sindrome adreno-genitale
- Feocromocitoma
- Insufficienza corticosurrenalica

Lesioni non funzionanti
- Cisti
- Lipoma
- Angiomiolipoma
- Adenoma non funzionante
- Metastasi
- Carcinoma surrenalico
- Neuroblastoma

Note

Bibliografia

Voci correlate

Patologia endocrinologica e lesioni iperfunzionanti

In queste patologie la diagnostica di laboratorio ha il compito di differenziare fra loro le varie forme cliniche, mentre all'imaging è demandato il compito di ricercare eventuali cause organiche.

Sindrome di Cushing

La sindrome di Cushing è causata da un eccesso di produzione di glucocorticoidi da parte dei surreni o per assunzione iatrogena eccessiva di tali ormoni. Nell'80% dei casi non da assunzione esogena la causa dell'iperproduzione è un'iperplasia di entrambe le ghiandole conseguenza da un eccessivo rilascio dell'ormone ACTH (spesso causata da adenomi ipofisari, oppure da alcuni istotipi tumorali come il tumore del polmone a piccole cellule). In tali casi le ghiandole appaiono ingrossate, ma con morfologia conservata o a volte con un aspetto nodulare che può essere confuso con un'adenomatosi multipla. Il segnale RM in tali casi è identico a quello delle ghiandole normali (isointensità nelle sequente T1 e T2 pesate rispetto al fegato). Nel restante 20% dei casi di Cushing invece tale patologia è sostenuta da adenomi surrenalici iperfunzionanti, che all'imaging appaiono come lesioni nodulari che presentano le caratteristiche di benignità descritte nel paragrafo introduttivo. In tali casi il parenchima ghiandolare sano può apparire ipotrofico. In caso di adenomi multipli bilaterali la diagnosi differenziale con le forme iperplastiche già descritte potrebbe essere difficoltosa. In RM gli adenomi appaiono iso-ipointensi rispetto al fegato nelle sequenze T1 e T2 pesate. Un'iperintensità nelle sequenze T2 pesate è invece un indice di malignità (anche se può apparire anche per lesioni benigne), così come la disomogenea impregnazione dei mezzi di contrasto (questo vale anche per le metastasi surrenaliche dovute ad altri istotipi tumorali)[4]..

Sindrome di Conn

La sindrome di Conn è causata dall'eccessiva produzione dell'ormone aldosterone; sostenuta nell'80% dei casi da adenomi surrenalici iperfunzionanti (*adenomi di Conn*) e nel 20% dei casi da un'iperplasia dei surreni bilaterale. Gli adenomi di Conn sono spesso di dimensioni inferiori al centimetro, ma sono di più facile identificazione rispetto ad altre lesioni in quanto la sindrome porta ad un aumento del tessuto adiposo retroperitoneale che rende in TC più evidente l'adenoma rispetto al fondo dell'immagine. In RM gli adenomi di Conn presentano caratteristiche di segnale simili a quelli già descritti nel paragrafo precedente, ma sono meno facilmente identificabili per via delle ridotte dimensioni (la RM presenta una minore risoluzione spaziale rispetto alla TC ed è influenzata dagli artefatti da movimento dovuti alla respirazione)[5]..

Sindrome adreno-genitale

Con il termine "sindrome adreno-genitale" si descrive un quadro clinico causato da diverse malattie genetiche in cui è presente un deficit di un enzima coinvolto nella sintesi del cortisolo. Tali cause genetiche portano ad accumulo del precursore a monte dell'enzima coinvolto ed a ridotta produzione di glucocorticoidi, associati ad incremento compensatorio dell'ACTH oltre che della concentrazione di mineralcorticoidi ed androgeni (che vengono sintetizzati a partire dal precursore in eccesso seguendo le rispettive vie di sintesi). Le indagini radiologiche in tali patologie evidenziano un'ipertrofia di entrambe le ghiandole con prevalenza della corticale[6]..

Feocromocitoma



Feocromocitoma a carico del surrene sinistro rilevato mediante TC (asterisco)

Il feocromocitoma è un tumore raro (tuttavia è il più frequente che origina dalla midollare surrenalica), solitario nella maggior parte dei casi (nel 20% dei pazienti è bilaterale e nel 10% origina in sede extrasurrenalica). Nel 5-10% dei casi presenta comportamento maligno (spesso in pazienti affetti da neoplasia endocrina multipla o MEN). Alla TC il feomcromocitoma appare come una massa rotondeggiante di dimensioni fra 1 e 10 cm, con valori di densità simili a quelli del tessuto muscolare striato, spesso disomogenea nelle lesioni più grandi che spesso presentano necrosi o calcificazioni nel loro contesto. La sensibilità della TC nel rilevare feocromocitomi in sede surrenalica è circa del 95% e funziona molto bene anche per le localizzazioni lungo i gangli nervosi, l'aorta e la vena cava. Dopo la somministrazione di mezzo di contrasto si osserva intenso enhancement associato a lento wash-out. Le metodiche radiologiche non riescono a distinguere i feocromocitomi benigni da quelli maligni se non per la presenza di metastasi a distanza. In RM i feocromocitomi appaiono ipointensi nelle sequenze T1 pesate ed iperintensi in quelle T2 pesate, oltre a presentare lo stesso comportamento dopo iniezione di mezzo di contrasto già visto con la TC[7].

Insufficienza corticosurrenalica

La gestione diagnostica della forma acuta dell'insufficienza corticosurrenalica non è di pertinenza radiologica, mentre nelle forme croniche (malattia di Addison) è possibile osservare alla TC atrofia o completa scomparsa del parenchima surrenalico. In alcuni casi di tubercolosi surrenalica è possibile invece trovare ipertrofia ghiandolare, che può simulare una forma neoplastica. In caso di tubercolosi o istoplasmosi surrenalica è inoltre possibile osservare calcificazioni all'esame radiografico diretto dell'addome[8]..

Lesioni non funzionanti

Cisti

A livello surrenalico tali lesioni sono rare e di solito piccole (possono tuttavia raggiungere anche i 30 cm di diametro). Possono avere origine epiteliale, endoteliale o derivare da esiti di emorragie o infezioni (echinococcosi). La parete può essere fibrosa o calcifica mentre il contenuto può essere liquido o ematico. Queste caratteristiche permettono di differenziarle molto bene dalle lesioni solide con tutte le metodiche radiologiche utilizzabili. Di solito sono asintomatiche, ma possono a volta manifestarsi clinicamente in seguito a compressione degli organi adiacenti. Di solito le cisti sono ipodense in TC, ipointense nelle sequenze RM T1 pesate ed iperintense in quelle T2 pesate; tuttavia un eventuale contenuto ematico può manifestarsi anche come minor ipodensità in TC e lieve iperintensità in T1 all'indagine RM per la presenza di metaemoglobina[9]..

Lipoma

Questo tumore benigno del tessuto adiposo può manifestarsi anche in sede surrenalica, ove è ben riconoscibile sia mediante la TC sia mediante l'RM in quanto presenta densità e segnale RM tipici. Spesso è di piccole dimensioni e colpisce entrambe le ghiandole[10]..

Angiomiolipoma

angiomiolipoma a carico del surrene di sinistra visto alla TC

È un tumore benigno composto da tessuto adiposo frammisto ad elementi attivi del midollo osseo, spesso rinvenuto come incidentaloma. All'ecografia appare con margini ben definiti e fortemente iperecogeno per la presenza del grasso. In TC presenta densità compatibile con il tessuto adiposo frammistra a densità compatibile con il tessuto solido, mentre in RM il segnale è anch'esso indicativo del medesimo contenuto. La contemporanea presenza di elementi stromali si evidenzia ulteriormente dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Queste caratteristiche semiologiche consentono la diagnosi differenziale con il lipoma e gli adenomi surrenalici. In RM le sequenze con soppressione del grasso (STIR) mostrano queste lesioni come ipointense, mentre non si osserva in tali casi ipointensità nelle sequenze in *chemical shift* ed opposizione di fase[11]..

adenoma surrenalico rilevato mediante TC (freccia)

Adenoma non funzionante

Si evidenziano con le stesse caratteristiche degli adenomi funzionanti descritti nel precedente paragrafo. Le metodiche radiologiche non consentono di differenziare un adenoma funzionante da un più frequente adenoma non funzionante, che spesso viene rilevato come incidentaloma[12]..

Metastasi

I tumori solidi che più frequentemente danno metastasi ai surreni sono quello del polmone e quello della mammella. Le dimensioni possono essere varie, spesso si rilevano a carico di entrambe le ghiandole e quelle di maggiori dimensioni sono spesso disomogenee per la presenza di necrosi nel loro contesto. Tali lesioni presentano maggior enhancement dopo somministrazione di mezzo di contrasto nella porzione periferica (la porzione centrale è spesso necrotica), con aspetto comunque disomogeneo. Rispetto agli adenomi in RM le lesioni metastatiche appaiono iperintense nelle sequenze T2 pesate (le metastasi di alcuni istotipi, come il melanoma possono apparire iperintense anche nelle sequenze T1 pesate per via del loro contenuto di sostanze paramagnetiche). Di solito il segnale in chemical shift ed opposizione di fase non presenza riduzione. La PET con fluorodesossiglucosio presenta elevata sensibilità nel rilevare questo tipo di lesioni[13]..

Carcinoma surrenalico

Carcinoma corticosurrenalico (freccia) evidente alla TC come una massa lobulata disomogenea a livello del surrene destro

È un tumore raro ed estremamente aggressivo, che spesso si manifesta alla diagnosi già esteso localmente e con localizzazioni linfonodali ed a livello del fegato. In circa la metà dei casi può anche essere ormono-producente e dare una sindrome di Cushing. Alla TC tali lesioni appaiono molto grandi e disomogenee per la massiccia presenza di necrosi, emorragia e calcificazioni nel loro contesto. L'uso del mezzo di contrasto è molto utile per evidenziare l'infiltrazione delle strutture vicine (specie la vena cava e la vena renale). In RM tale istotipo si presenta ipointenso nelle sequenze T1 pesate ed isointenso in quelle T2 pesate. La aree necrotiche presentano aumento del segnale dopo somministrione del mezzo di contrasto paramagnetico, mentre le aree emorragiche sono ben evidenti nelle sequenze T1 pesate. L'angio-RM è molto utile per evidenziare l'interessamento delle strutture vascolari. Le forme funzionanti possono presentare nel loro contesto piccole aree di perdita di segnale alle acquisizioni in chemical shift (dovute alla presenza di lipidi). Tale tumore è difficilmente studiabile mediante ecografia nonostante le grosse dimensioni e si presenta avidamente captante all'indagine PET con fluorodesossiglucosio[14].

Neuroblastoma

È il tumore più comune dell'età infantile. Origina dalle cellule della cresta neurale. Nella metà dei casi la lesione primitiva è localizzata a livello dei surreni, mentre negli altri casi di solito a livello del retroperitoneo. È importante la diagnosi tempestiva in quanto la prognosi peggiora oltre il primo anno di vita (da benigno diventa maligno). Di solito le metastasi colpiscono i linfonodi, il fegato e lo scheletro. A livello locale spesso coinvolge i grossi vasi addominali ed i forami intervertebrali. All'ecografia questo tumore si presenta a margini mal definiti e disomogeneo per la presenza di aree di necrosi e calcifiche (l'ecografia in tali casi è l'esame di primo livello in quanto non utilizza radiazioni ionizzanti sui pazienti che di solito sono molto piccoli). La TC è eseguita di solito in sedazione successivamente all'esame ecografico e consente di valutare in modo più accurato l'estensione locale della malattia. L'RM è

neuroblastoma

l'esame più indicato per valutare l'infiltrazione del canale spinale. La scintigrafia con ^{123}I-MIBG, eseguita in un reparto di medicina nucleare, è utile invece nella ricerca di metastasi a distanza e nella programmazione di un eventuale terapia radiometabolica con ^{131}I-MIBG (approccio *teranostico*)[15].

Note

1. ^ Barbara Lucatello, Alfredo Muni e Marco Gallo, *Utilizzo della 18F-FDG-PET nella stratificazione del rischio delle masse surrenaliche*, in *L'Endocrinologo*, 14 maggio 2021, DOI:10.1007/s40619-021-00879-4. URL consultato l'8 giugno 2021.
2. ^ Barbara Lucatello, Alfredo Muni e Marco Gallo, *Utilizzo della 18F-FDG-PET nella stratificazione del rischio delle masse surrenaliche*, in *L'Endocrinologo*, 14 maggio 2021, DOI:10.1007/s40619-021-00879-4. URL consultato l'8 giugno 2021.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 650-653.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 654-655.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 655.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 655-656.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 656-657.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 657.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 658.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 659.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 659-660.
12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 660-661.
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 661-662.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 662-663.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 663-664.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dei_surreni&oldid=126483566"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 mar 2022 alle 10:24.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia del pancreas

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia del pancreas** si avvale dell'ecografia, della tomografia computerizzata (TC) e dell'imaging a risonanza magnetica (RM), oltre che di metodiche di radiologia interventistica ed endoscopia come l'angiografia e la Colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) che sono spesso utilizzate per fini terapeutici. L'ERCP e la Risonanza magnetica colangiopancreatografica sono utilizzate per lo studio di tutto l'albero biliare (anche intrapancreatico) e sono trattate separatamente nelle rispettive voci.

La tomografia ad emissione di positroni, eseguita nei reparti di medicina nucleare ha indicazioni importanti per quanto riguarda la patologia oncologica pancreatica.

Indice

Metodiche radiologiche

Patologia pancreatica
- Varianti anatomiche
- Lesioni cistiche
- Fibrosi cistica
- Pancreatite acuta
- Pancreatite cronica
- Pancreatite autoimmune
- Infezioni
- Traumi
- Adenocarcinoma del pancreas
- Tumori neuroendocrini
- Metastasi pancreatiche da tumori solidi di diversa origine
- Linfoma
- Carcinoma pleiomorfo
- Tumore periampollare

Note

Bibliografia

Voci correlate

Metodiche radiologiche

L'ecografia è l'indagine radiologica di primo livello per la valutazione della patologia pancreatica, tuttavia la sua esecuzione non è spesso agevole dato che il pancreas è situato profondamente nell'addome ed è quindi circondato da anse intestinali piene di gas che ostacolo gli ultrasuoni (per tale motivo in molti casi si ricorre fin dal principio ad indagini di secondo livello come TC, RM o ERCP). Le finestre acustiche utilizzabili

sono localizzate a livello del lobo epatico sinistro, dell'adipe presente fra stomaco e colon trasverso e della milza. L'indagine va eseguita in inspirazione forzata, in posizione seduta e dopo aver fatto bere dell'acqua per allontanare dalla sonda i gas presenti nello stomaco. L'aspetto del pancreas normale varia con l'età dei pazienti (in adolescenti e giovani adulti è voluminoso e presenta ecogenicità minore del fegato, mentre in età più avanzate l'organo diventa più piccolo ed iperecogeno rispetto al fegato). Se il dotto pancreatico principale presenta diametro maggiore di 2 mm a livello del corpo dell'organo è di solito ben visibile all'esame ecografico. Un pancreas iperecogeno in un giovane o in un adolescente è suggestivo di un processo infiammatorio cronico in atto, mentre un aspetto ipoecogeno nell'anziano è suggestivo di pancreatite acuta. La presenza di aria nei visceri cavi circostanti così come di linfonodo ingrossati può portare ad errori di valutazione (possono essere scambiati per lesioni pancreatiche)[1].

La tomografia computerizzata permette di identificare lesioni e zone patologiche a livello del pancreas tramite la differente impregnazione del mezzo di contrasto fra zone sane e malate. Migliori risultati con questa metodica si possono ottenere distendendo lo stomaco ed il duodeno dando da bere mezzo di contrasto diluito in acqua e somministrando un farmaco per ridurre il tono intestinale. Di norma viene eseguita dapprima un'acquisizione senza mezzo di contrasto (utile per rilevare eventuali calcoli e calcificazioni) poi, dopo sua somministrazione, si acquisiscono la fase arteriosa dopo circa 35-40 secondi e quella venosa-portale dopo 65-70 (i tempi sono stabiliti automaticamente dalla macchina che rileva le differenze di densità a livello dell'aorta addominale dovute al passaggio del mezzo di contrasto a tale livello[2].

La RM se eseguita con macchine ad alto campo magnetico (>1,5 Tesla) e mediante bobine e sequenze dedicate consente di ottenere anch'essa immagini dopo somministrazione di mezzo di contrasto con minimi artefatti da movimento dovuti alla respirazione, oltre a consentire acquisizioni colangio-RM. Di norma nelle sequenze T1 pesate il pancreas si presenta iperintenso rispetto ai tessuti circostanti per la presenza di sostanze paramagnetiche nel succo pancreatico (enzimi, ioni magnesio, sostanze contenute nel reticolo endoplasmatico delle cellule secernenti), mentre in quelle T2 pesate l'organo appare di norma ipointenso, permettendo di evidenziare bene l'albero biliare che appare invece iperintenso per la presenza di liquido fermo[3].

L'angiografia ormai è di norma usata solo per fini terapeutici o per valutare in casi dubbi le lesioni ipervascolari come l'insulinoma[4].

Patologia pancreatica

Varianti anatomiche

La variante anatomica più comune è il *pancreas divisum* ed è caratterizzata dalla presenza di 2 sistemi duttali all'interno dell'organo anziché di uno solo. Tale anomalia è da attribuire alla mancata fusione dei dotti pancreatici dorsale e ventale che di norma avviene durante il secondo mese di vita intrauterina. In tali casi un dotto accessorio (di *Santorini*) drena in duodeno il succo pancreatico prodotto a livello della porzione anteriore della testa e di tutto il complesso corpo-coda, mentre la porzione posteriore della testa ed il processo uncinato sono drenati dal dotto ventrale che si unisce alla via biliare principale a livello della papilla di Vater. I pazienti che presentano questa variante anatomica presentano un rischio di pancreatite incrementato del 50%[5].

Molto più raro è il *pancreas anulare* (3 casi su 150000 autopsie) che si origina se durante l'embriogenesi dell'organo la porzione ventrale non ruota nel modo corretto e rimane quindi a circondare il duodeno a livello della sua seconda porzione. Tale quadro clinico può portare a stenosi se non ostruzione del duodeno già in età neonatale, tuttavia è possibile rinvenire questa variante anche nell'adulto in esami eseguiti per altri motivi[5].

Un'ultima variante anatomica è l'agenesia della porzione dorsale del pancreas, che è spesso associata a diabete, dato che è in questa regione che di norma si trova il maggior numero di cellule secernenti insulina[5].

Lesioni cistiche

Le principali lesioni cistiche, di frequente riscontro clinico, anche occasionale, sono:

- la *pseudocisti* (esiti di pregresse pancreatiti)
- il cistoadenoma sieroso (benigno)
- il cistoadenoma mucinoso (benigno, ma può diventare maligno e deve quindi essere asportato chirurgicamente)
- il Tumore Intraduttale Papillare Mucino-Secernente (TIPM. Questo tumore deve sempre essere asportato chirurgicamente in quanto maligno)

La colangio-RM è di norma utilizzata per studiare i rapporti fra queste lesioni ed i dotti pancreatici, tuttavia l'imaging radiologico non sempre è in grado di determinare se una lesione è benigna o maligna; in tali casi si ricorre quindi all'agoaspirato del contenuto della cisti sotto guida ecografica.



Pseudocisti pancreatica

La *pseudocisti* è costituita da una raccolta di sangue ed essudato infiammatorio circondata da una capsula di tessuto fibroso e localizzata a livello dell'adipe attorno al pancreas. Tale formazione entra in diagnosi differenziale con gli pseudoaneurismi dei vasi arteriosi tributari e le altre lesioni cistiche. All'indagine ecografica la pseudocisti appare capsulata ed a contenuto anecogeno con fini spot iperecogeni. In TC appare sempre solitaria ed uniloculata e può essere omogenea o disomogenea. Dopo somministrazione del mezzo di contrasto si osserva impregnazione di questo solo a livello della capsula. Nel 70% dei casi la pseudocisti comunica con il dotto pancreatico, mentre la presenza di aria al suo interno è indice di infezione[6].

Il *cistoadenoma sieroso* tipicamente si sviluppa a livello della testa, è capsulato e presenta una struttura *"a nido d'ape"* con a volte una cicatrice al centro che può anche andare incontro a calcificazione. Dopo iniezione di mezzo di contrasto si osserva lieve enhancement a livello della capsula. È un tumore benigno ma è anche spesso associato alla sindrome di von Hippel-Lindau[7].



Cistoadenoma sieroso della testa del pancreas



Cistoadenoma mucinoso

Il *cistoadenoma mucinoso* si rileva più spesso a livello della coda ed è caratterizzato da un aspetto macrocistico; può essere multiloculato. Dopo somministrazione del mezzo di contrasto la capsula ed i setti interni diventano più evidenti. In RM presenta segnale nelle sequenze T1 pesate molto variabile, correlato alla concentrazione di mucina al suo interno[7].

Il Tumore Intraduttale Papillare Mucino-Secernente (TIPM) è più spesso rilevato a livello della testa e del processo uncinato, ove spesso si manifesta clinicamente tramite l'ostruzione del dotto pancreatico senza stenosi dello stesso. Le lesioni piccole di questo tipo sono difficilmente distinguibili dalla pancreatite cronica, mentre in quelle di maggiori dimensioni è possibile osservare nel loro contesto la presenza di papille endoluminali che diventano più evidenti dopo la somministrazione del mezzo di contrasto. Sono di più facile diagnosi i TIPM localizzati a livello delle diramazioni del dotto pancreatico. La migliore tecnica per il loro studio è la colangio-RM (che consente di evidenziare come queste lesioni comunicano con i dotti pancreatici)[8].



Tumore Intraduttale Mucino-Secernente localizzato mediante RM. La lesione appare iperintensa nelle sequenze T2 pesate per la presenza al suo interno di liquido fermo (colangio-RM)

Le cisti pancreatiche vere sono molto rare e sono spesso associate alla malattia policistica o alla sindrome di von Hippel-Lindau. Se una lesione di questo aspetto viene rilevata in un paziente non affetto dalle suddette patologie pertanto è più probabile una delle altre diagnosi già elencate in questo paragrafo[9].

La PET con fluorodesossiglucosio presenta accuratezza elevata nella caratterizzazione delle lesioni cistiche pancreatiche (permettendo quindi la diagnosi differenziale fra lesioni benigne e maligne nei casi dubbi).

Fibrosi cistica

Nei pazienti affetti da questa malattia il tessuto parenchimale del pancreas è sostituito da tessuto adiposo (l'insufficienza pancreatica è tipica di questa patologia) e l'organo aumenta o si riduce di dimensioni. La RM è l'indagine più accurata per identificare gli effetti della malattia sul pancreas, ma anche TC ed ecografia sono adatti allo scopo. Raramente è possibile osservare cisti nel contesto dell'organo (probabilmente dovute ad accumulo di proteine nei dotti pancreatici dilatati)[10].

Pancreatite acuta

La pancreatite acuta è una grave malattia (può portare all'exitus del paziente) dovuta ad un processo infiammatorio che distrugge il parenchima pancreatico liberando gli enzimi digestivi contenuti in esso (cosa che porta ad un ulteriore danno a catena). La TC è l'esame fondamentale per definire la gravità di questa patologia (utilizzando i criteri APACHE II o la scala Ranson) in quanto può evidenziare molto bene sia le aree di necrosi sia le alterazioni nella forma dell'organo causate dal processo morboso. La formazione di raccolte liquide è la principale complicanza della pancreatite acuta; di solito si formano dopo 2 giorni dall'evento acuto e regrediscono completamente nella metà dei casi. Di solito le raccolte di liquido si localizzano a livello della loggia pancreatica (spazio pararenale anteriore) o nelle riflessioni posteriori del peritoneo (borsa omentale, a livello del mesocolon trasverso e della radice del mesentere). Se le raccolte persistono nel tempo possono diventare pseudocisti, ascessi, aree emorragiche oppure estendere ulteriormente la necrosi tissutale o danneggiare i vasi arteriosi circostanti portando alla formazione di pseudoaneurismi.

Si distinguono radiologicamente due forme di pancreatite acuta: *edematosa* (la meno severa) e *necrotico-emorragica*.

L'esame radiografico diretto dell'addome può evidenziare solo segni indiretti della patologia in atto (segni dell'*ansa sentinella* dovuta a distensione di una porzione del digiuno e del *taglio del colon* in cui il colon è disteso fino alla flessura splenica). L'ecografia non è adatta a studiare la pancreatite acuta in quanto la

distensione di queste anse intestinali, piene di aria, di solito rende difficilmente visualizzabile il parenchima pancreatico; tuttavia l'esame ecografico può identificare eventuali calcoli e sabbia biliare, che spesso sono la causa della malattia.

La pancreatite edematosa è evidente in ecografia come ingrandimento dell'organo associato a diminuzione della sua ecogenicità, che diventa minore di quella del fegato. In presenza di steatosi epatica, malattia in cui il fegato risulta più ipoecogeno del normale, è possibile diagnosticare in modo errato una pancreatite edematosa (*pseudopancreatite*). L'infiammazione che interessa i tessuti circostanti al pancreas è visibile come strie ipo-anecogene e raccolte fluide. Nella forma necrotico-emorragica si osservano invece aree ipoecogene (necrosi) associate a zone iperecogene (emorragie) e raccolte fluide. L'ecografia doppler consente inoltre di identificare eventuali trombosi a carico della vena porta e della vena splenica, che spesso complicano questa patologia, così come gli pseudoaneurismi.



Pancreatite acuta. Il pancreas è circondato da raccolte fluide

L'esame ecografico non consente di studiare la gravità della malattia, cosa invece fattibile con la TC (che rappresenta la metodica di elezione per lo studio dei pazienti affetti da questa patologia). Nelle forme edematose lievi di solito non si osservano modifiche nella densità dell'organo, che invece inizia ad apparire nelle forme più gravi in associazione alla scomparsa della trama lobulare dell'organo ed all'inspessimento della fascia renale anteriore. Nelle forme necrotico-emorragiche l'uso del mezzo di contrasto consente di visualizzare le aree necrotiche come fortemente ipodense rispetto al parenchima sano, così come le raccolte fluide, di cui è possibile studiare estensioni e rapporti in vista di un eventuale intervento chirurgico di drenaggio. La presenza di bolle di gas nel contesto di una raccolta fluida è patognomonica di un'infezione della stessa (ascesso). Il flemmone invece è evidente come una massa solida con densità elevata che interessa estesamente i tessuti circostanti il pancreas.

In RM la pancreatite edematosa mostra segni simili a quelli visibili con la TC. Le strie peripancreatiche appaiono ipointense nelle sequenze T1 pesate ed iperintense in quelle T2 pesate. Nelle forme necrotico-emorragiche l'utilizzo del mezzo di contrasto consente le medesime analisi fattibili con la TC. RM e TC nello studio della pancreatite sono da considerare quindi equivalenti, tuttavia le metodiche di risonanza magnetica permettono anche il contemporaneo studio dei dotti intrapancreatici; di contro il limite più importante è il tempo di acquisizione e la conseguente difficoltà nel mantenere immobili a lungo pazienti clinicamente debilitati[11].

Pancreatite cronica



Pancreatite cronica.

In questa malattia si rileva la trasformazione del parenchima ghiandolare in tessuto connettivo fibroso. La pancreatite cronica non è una conseguenza della pancreatite acuta (è spesso conseguente ad un forte consumo di alcool) e la degenerazione fibrosa è irreversibile. Tipicamente agli esami colangiografici si osservano calcificazioni all'interno dei dotti associate a loro dilatazione, che sono disposte a livello del dotto del Wirsung con un aspetto "a corona di rosario" (cosa che permette di distinguere questa condizione clinica dal carcinoma pancreatico, anche se tale diagnosi differenziale non è sempre agevole). All'ecografia il pancreas in questi casi appare iperecogeno (quadro clinico che può

essere confuso con la fisiologica iperecogenicità che si osserva in età avanzata), di dimensioni ridotte e lobulato; sono inoltre visibili le calcificazioni. La TC è anch'essa molto sensibile sia nel rilevare le calcificazioni sia le alterazioni nella forma dell'organo. In RM la fibrosi è evidente come un'iperintensità diffusa nelle sequenze T2 pesate ed una ridotta intensità in quelle T1 pesate. Dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico si osserva lieve incremento diffuso del segnale RM. Anche il segnale nelle sequenze al tensore di diffusione appare ridotto. Le complicanze più frequenti di questa patologia sono le trombosi delle vene porta e splenica, oltre alle fistole pleuro-pancreatica e bronco-pancreatica[12].

Pancreatite autoimmune

Questa forma di pancreatite cronica risponde molto bene alla terapia con corticosteroidi ed è spesso associata ad altre patologie autoimmuni, come la Sindrome di Sjögren, il lupus eritematoso sistemico, la colangite sclerosante primitiva e la rettocolite ulcerosa. Alla TC di norma l'organo si presenta aumentato di volume e con un aspetto *"a salsiccia"* e la flogosi è confinata nello spazio pararenale anteriore, tuttavia alcune forme possono essere localizzate alla sola testa o processo uncinato e quindi essere difficilmente distinguibili da un carcinoma pancreatico. Dopo somministrazione del mezzo di contrasto si osserva potenziamento a carico di tutta la ghiandola sia in TC sia in RM, con associato sottile contorno ipodenso in TC ed iperintenso in RM. Di norma non sono coinvolti i vasi ed è possibile osservare ingrandimento dei linfonodi locoregionali. Il dotto pancreatico di norma presenta diametro irregolare lungo il suo decorso, caratterizzato da stenosi e dilatazioni (ben evidenti con le metodiche colangiografiche)[13].

Infezioni

Le infezioni pancreatiche sono tipiche del paziente immunodepresso e sono causate nella maggioranza dei casi da: citomegalovirus, micobatterio tubercolare e pneumocystis carinii. L'infezione da P. carinii di solito è evidente in TC come calcificazioni millimetriche distribuite in tutto il parenchima, mentre negli altri casi il quadro radiologico non è dissimile da quello di una pancreatite acuta[14].

Traumi

La contusione pancreatica è un evento relativamente raro dopo un trauma addominale (prevalenza del 12%) ed è provocata dalla compressione dell'organo contro i corpi vertebrali retrostanti. È possibile in tali casi rilevare ematomi, lacerazioni o anche spandimenti di succo pancreatico (che portano ad un quadro radiologico sovrapponibile a quello della pancreatite acuta); in tale contesto una lesione del dotto pancreatico principale rappresenta quindi un evento in grado di peggiorare la prognosi del paziente. La rottura dell'organo, se presente, è evidente in TC come una linea ipodensa, mentre in RM questa presenta elevato segnale nelle sequenze T2 pesate e segnale ridotto in quelle T1 pesate. È possibile inoltre rilevare incremento del volume del pancreas stesso. Gli esami colangiografici in tali quadri clinici sono i più indicati nel verificare l'integrità anatomica dei dotti pancreatici[15].

Adenocarcinoma del pancreas

Costituisce il 90% dei tumori maligni del pancreas esocrino. Di solito è localizzato a livello della testa (65% dei casi) ove si manifesta clinicamente per occlusione del dotto pancreatico, con conseguente atrofia del parenchima a monte dell'ostruzione. L'obbiettivo delle metodiche di imaging è rilevare l'eventuale presenza di metastasi ed il grado di invasione locale.

All'esame ecografico questo tumore appare ipoecogeno o con ecogenicità disomogenea e presenta margini irregolari. L'uso del color-doppler mette in evidenza un'intensa vascolarizzazione.

TC con mezzo di contrasto in un paziente affetto da adenocarcinoma del pancreas. La lesione appare ipodensa in fase veno-portale.

L'uso della TC con mezzo di contrasto è fondamentale nella stadiazione dell'adenocarcinoma pancreatico, in quanto il tumore pancreatico presenta ridotta densità dopo la somministrazione rispetto al parenchima sano. È inoltre indispensabile verificare il grado di interessamento dei grossi vasi addominali e mesenterici, così come del tripode celiaco, dei vasi epatici e splenici. Se più del 50% della circonferenza di uno di questi vasi è interessato dal tumore questo non è aggredibile chirurgicamente.

In RM l'adenocarcinoma pancreatico si presenta ipointenso nelle sequenze T1 pesate; mentre è possibile rilevare lieve iperintensità nelle sequenze T2 pesate. Anche in questo caso il tumore non si potenzia dopo somministrazione di mezzo di contrasto.

È possibile rilevare un tumore pancreatico anche tramite segni indiretti della sua presenza, come la dilatazione del dotto pancreatico (specie se questa interessa il dotto nella sua interezza), l'atrofia di parte del parenchima, la dilatazione delle vene pancreatiche e la presenza di linfonodi ingranditi. Anche la spettroscopia RM e l'imaging al tensore di diffusione sono utili a tal fine.

La PET con fluorodesossiglucosio presenta un'elevata accuratezza sia nel caratterizzare le lesioni pancreatiche dubbie sia nel rilevare metastasi a distanza della malattia (specie quelle epatiche). Non è invece una metodica adatta per lo studio dell'invasione locale o delle metastasi linfonodali[16].

Tumori neuroendocrini

Tumore neuroendocrino del pancreas associato a feocromocitoma del surrene destro. La lesione pancreatica (I) presenta densità aumentata dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Il feocromocitoma è la lesione iperdensa con core necrotico contrassegnata con la lettera P. Medialmente al tumore neuroendocrino sono visibili anche due cisti pancreatiche semplici

Sono neoplasie rare e spesso maligne che originano dalle cellule di Langerhans. Sono definiti diversi istotipi in funzione del tipo di cellula secernente (somatostaminoma, gastrinoma, VIPoma ed insulinoma). Tali neoplasie possono secernere ormoni oppure no; in quest'ultimo caso spesso si manifestano clinicamente tramite le metastasi o per compressione di organi adiacenti. Questi tumori hanno di solito prognosi molto migliore dell'adenocarcinoma. Le metastasi epatiche da tumori neuroendocrine sono ipervascolari, mentre quelle da adenocarcinoma sono ipovascolarizzate.



PET con ^{68}Ga DOTATOC in paziente con tumore neuroendocrino. La TC da sola non ha rilevato alcuna lesione

In ecografia i tumori neuroendocrini sono difficilmente identificabili per via delle ridotte dimensioni e di solito si presentano come lesioni ipoecogene, com margini ben definiti ed associati a possibile dilatazione del dotto pancreatico.

In TC i tumori neuroendocrini diventano molto evidenti dopo somministrazione di mezzo di contrasto in tutte le fasi.

In RM questi tumori si presentano ipointensi nelle sequenze T1 pesate ed iperintensi in quelle T2 pesate. Dopo somministrazione di mezzo di contrasto si osserva anche qui potenziamento in tutte le fasi[17].

La medicina nucleare dispone sia di approcci diagnostici sia terapeutici utili alla gestione dei tumori neuroendocrini (approccio teranostico). La PET con analoghi della somatostatina (come anche il vecchio Octeroscan) e con ^{18}F-DOPA, la scintigrafia con ^{123}I-MIBG e la PET con fluorodesossiglucosio permettono infatti un'accurata valutazione di queste forme tumorali (anche superiore alle metodiche radiologiche) e nel contempo la positività delle lesioni ai radiofarmaci specifici per i recettori della somatostatina ed il metabolismo delle monoamine può anche essere sfruttata per effettuare un'efficace terapia radiometabolica.

Metastasi pancreatiche da tumori solidi di diversa origine

Le metastasi a livello del pancreas da parte di tumori solidi di diverso istotipo sono rare (3% di tutti i pazienti oncologici in stadio avanzato) e sono date principalmente dal carcinoma renale e dal tumore del polmone. In TC tali lesioni possono essere singole o interessare diffusamente tutto il parenchima, presentano margini netti e non superano il profilo della ghiandola; si distinguono dall'adenocarcinoma per la debole impregnazione del mezzo di contrasto; tuttavia la diagnosi differenziale con i tumori neuroendocrini non è semplice. In RM le metastasi appaiono ipointense nelle sequenze T1 pesate e debolmente iperintense in quelle T2 pesate[18].

Linfoma

Meno del 2% di tutti i linfomi di origine extra-nodale si sviluppa nel pancreas, tuttavia l'organo è coinvolto nel 30% dei pazienti affetti da linfoma non Hodgkin. Tali localizzazioni si possono presentare come solitarie e ben delimitate oppure come un interessamento diffuso di tutto il parenchima. Le lesioni solitarie hanno un aspetto pressoché sovrapponibile a quello dell'adenocarcinoma, tuttavia è più difficile osservare in questi casi la dilatazione del dotto pancreatico, mentre più spesso si osservano linfoadenopatie a livello dei linfocentri localizzati sotto i vasi renali. La forma diffusa è radiologicamente indistinguibile dalla pancreatite acuta edematosa[19].

Carcinoma pleiomorfo

È un tumore molto raro ma estremamente aggressivo (prognosi minore di 2 mesi), che presenta spesso alla diagnosi numerose localizzazioni linfonodali ed a distanza. Radiologicamente appare come una grossa massa con margini irregolari ed eterogeneo uptake di mezzo di contrasto[19].

Tumore periampollare

Si sviluppa entro 2 centimetri dalla papilla e radiologicamente è simile all'adenocarcinoma (spesso solo la biopsia è dirimente), ma clinicamente ha una prognosi più favorevole. La dilatazione dei dotti biliare e pancreatico in tali casi possono dare compressione della seconda porzione del duodeno[20].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 604.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 604-605.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 605-606.

4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 606-607.
5. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 607.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 607-608.
7. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 608.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 608-609.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 609.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 609-610.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 610-612.
12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 612.
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 612-613.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 613.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 613-614.
16. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 614-616.
17. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 616-617.
18. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 617-618.
19. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 618.
20. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 618-619.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_del_pancreas&oldid=123209585"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 set 2021 alle 23:28.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dell'apparato digerente

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dell'apparato digerente** include la radiologia tradizionale (radiografia dell'addome diretta e con contrasto), l'ecografia, la tomografia computerizzata, l'imaging a risonanza magnetica e metodiche endoscopiche come l'ecoendoscopia. In questa voce non sarà trattato lo studio della porzione del tubo digerente di competenza otorinlaringoiatrica come anche degli organi parenchimatosi associati al tubo digerente e delle vie biliari (trattati nelle seguenti voci: Radiologia del fegato, Radiologia del pancreas, Risonanza magnetica colangiopancreatografica e Colangio-pancreatografia endoscopica retrograda).

Indice

Metodiche radiologiche
- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Tomografia Computerizzata
- Imaging a Risonanza Magnetica
- Angiografia

Patologie dell'apparato digerente
- Esofago
- Stomaco
- Duodeno
- Intestino tenue
- Intestino crasso

Note

Bibliografia

Voci correlate

Metodiche radiologiche

Radiologia tradizionale

Le radiografie dell'addome eseguite senza l'utilizzo di mezzo di contrasto (dirette) sono utilizzate per rilevare eventuali calcificazioni, corpi estranei o la presenza di aria all'interno del tubo digerente o della cavità addominale. È possibile eseguire l'esame radiografico sia in ortostatismo che in posizione seduta, usando proiezioni antero-posteriori, postero-anteriori e latero-laterali.

L'uso del mezzo di contrasto somministrato per via orale consente di studiare in dettaglio i visceri cavi. Come mezzo di contrasto radiotrasparente è possibile utilizzare dell'acqua frizzante (che, liberando gas, distende i visceri da studiare) o aria mentre come mezzi di contrasto radiopachi sono disponibili il solfato di

bario in soluzione acquosa (da non utilizzare in caso di sospetta perforazione dei visceri cavi in quanto può provocare in tali casi una peritonite) o quelli organoiodati. I due tipi di mezzi di contrasto possono anche essere somministrati assieme per effettuare *studi con doppio contrasto*. L'uso dei mezzi di contrasto radiopachi consente di studiare la parete dei visceri cavi in quanto l'immagine generata rappresenta il contenuto interno dell'organo analizzato; in tali casi le aree radiotrasparenti sono da riferire a lesioni aggettanti il lume, mentre al contrario le ulcere appaiono come zone radiopache adiacenti al profilo dell'organo. Queste metodiche non sono molto sensibili, tuttavia possono essere utili nello studio del reflusso gastro-esofageo, delle stenosi ed ostruzioni esofagee e nella ricerca di motilità esofagea anomala. Lo studio con mezzo di contrasto radiopaco dell'intestino tenue viene di norma eseguito per verificarne la pervietà in previsione di un'endoscopia con videocapsula. La somministrazione per via rettale (clisma) di un mezzo di contrasto radiopaco è invece attuata per lo studio dei pazienti affetti da colite acuta, ove si voglia ricercare un megacolon, un'invaginazione o un volvolo. Gli studi dell'intestino tenue vengono eseguiti iniettando i mezzi di contrasto (associati a idrossimetilcellulosa per migliorarne la progressione) tramite sondino naso-gastrico in modo da evitarne il reflusso. Prima di eseguire studi contrastografici dell'intestino è necessario svuotarlo il più possibile tramite l'uso di un lassativo.

Per studiare le anomalie funzionali della defecazione è possibile ricorrere alla defecografia, tecnica che si effettua riempiendo il retto del paziente con solfato di bario ed aria e poi studiando la defecazione così indotta con il tubo radiogeno.

Lo studio radiologico della deglutizione si effettua facendo ingerire al paziente del solfato di bario e quindi riprendendo tutte le fasi della deglutizione con il tubo radiogeno. Di norma l'esame viene eseguito utilizzando solfato di bario in soluzione (pasto liquido), associato a yogurt o budino (pasto semisolido) oppure come biscotti ricoperti di pasta baritata (pasto solido). L'esame è di solito eseguito assieme a quello fluoroscopico della laringe e delle corde vocali e spesso insieme alla manometria esofagea. In medicina nucleare è possibile studiare la deglutizione con modalità simili usando pasti tecneziati, con i vantaggi di somministrare una minore quantità di radiazioni ionizzanti e di poter quantificare la progressione del bolo in ogni singola fase (Scintigrafia per lo studio del transito esofago-gastro-duodenale)[1].

Ecografia

Le metodiche ecografiche (anche endoscopiche) consentono di studiare parete, peristalsi e strutture anatomiche adiacenti ai visceri cavi. Mediante le tecniche doppler è inoltre possibile lo studio della vascolarizzazione. Per tali ragioni l'ecografia è utilizzata per studiare sia la diffusione locale sia le eventuali metastasi linfonodali dei tumori dell'esofago, dello stomaco e del retto. Anche la valutazione della stenosi ipertrofica del piloro è un'indicazione all'ecografia. Altre patologie studiabili sono le malattie infiammatorie intestinali e la diverticolite; inoltre è l'indagine di primo livello nello studio dell'appendicite.

L'ecografia transvaginale è indicata nello studio delle patologie della pelvi femminile anteriore e media (es. prolassi), mentre quella endoanale è indicata per lo studio delle patologie dell'ano (traumi, tumori, ecc...).

I principali limiti dell'ecografia dell'apparato digerente sono il ridotto campo di vista e la presenza di gas a livello delle anse intestinali che ostacola la progressione delle onde sonore[2].

Tomografia Computerizzata

La TC ha come vantaggi la velocità di esecuzione e l'esteso campo di vista. Per studiare adeguatamente i visceri cavi con questa tecnica è necessario svuotarli il più possibile mediante una preparazione opportuna con lassativi e l'utilizzo di mezzi di contrasto o acqua per via orale (cosa che permette anche di valutare in modo accurato lo spessore delle pareti). Per tali ragioni la TC è molto utilizzata sia per lo studio delle patologie infettive/infiammatorie sia in campo oncologico per stadiare i pazienti ove consente di osservare

sia l'invasione locale sia le metastasi a distanza. Per lo studio dell'intestino tenue è possibile somministrare il mezzo di contrasto tramite sondino nano-enterico (enteroclisi-TC). La colonscopia virtuale viene effettuata per studiare il lume del colon dopo la sua distensione, ottenuta mediante insufflazione di aria[3].

Imaging a Risonanza Magnetica

La RM, può essere utilizzata come la TC per lo studio dei carcinomi di esofago, stomaco e retto. È inoltre possibile studiare l'intestino tenue come con la TC somministrando acqua o soluzione fisiologica mediante un sondino naso-enterico (Enterografia-RM). La RM consente anche di valutare la defecazione (cine-defecografia-RM), permettendo di analizzare con un solo esame tutti i compartimenti della pelvi[4].

Angiografia

È utilizzata nel trattamento delle emorragie digestive e nella loro diagnosi. Non è in grado di rilevare sanguinamenti di entità minore di 0,5 ml/min, cosa che invece consente di fare la scintigrafia per la ricerca di sanguinamenti occulti, eseguita nei reparti di medicina nucleare[4].

Patologie dell'apparato digerente

Esofago

studio radiografico della deglutizione in un paziente con acalasia esofagea prima e dopo intervento chirurgico

carcinoma esofageo rilevato alla TC

Le malformazioni più frequenti dell'esofago sono l'atresia, i diaframmi, i diverticoli, le stenosi, le fistole, le duplicazioni ed il brachiesofago (in quest'ultimo caso l'esofago è troppo corto e quindi lo stomaco oltrepassa il diaframma). L'esame radiografico diretto con mezzo di contrasto somministrato per via orale consente di rilevare tutte queste patologie, ad eccezione delle duplicazioni esofagee non comunicanti con il lume dell'organo (in tali casi vanno utilizzate la TC o l'RM). In caso di diverticolosi esofagee l'esame radiografico può anche rilevare eventuali ristagni di cibo o la degenerazione neoplastica dei diverticoli stessi. Nell'acalasia l'esame radiografico della deglutizione consente di fare diagnosi, rilevando visivamente il difetto di peristalsi.

Nei pazienti affetti da reflusso gastro-esofageo l'utilizzo delle metodiche radiografiche con doppio contrasto è molto efficace nel rilevare eventuali ulcere.

Dopo ingestione di agenti caustici o corrosivi l'uso del mezzo di contrasto somministrato per via orale consente di rilevare ulcere o perforazioni dell'organo.

Dopo radioterapia le metodiche radiografiche sono utili per dimostrare eventuali stenosi radioindotte.

Le varici dell'esofago, tipiche del paziente cirrotico si evidenziano all'esame radiografico con contrasto con un aspetto dell'esofago *"a legno tarlato"*. L'utilizzo del doppio contrasto e/o della manovra di Valsalva può rendere più evidenti le varici. A livello dello stomaco le varici possono essere osservate direttamente come

formazioni che possono simulare neoplasie.

Anche i tumori esofagei, sia benigni che maligni possono essere rilevati mediante le metodiche radiologiche tradizionali effettuate con mezzo di contrasto, ma TC ed RM consentono anche di caratterizzare le lesioni trovate (osservando la densità o il segnale RM) oltre a permettere di rilevare l'entità dell'invasione locale e la presenza di localizzazioni linfonodali o a distanza. Le lesioni benigne di solito appaiono all'esame radiografico come aggettanti nel lume, mentre quelle maligne possono avere aspetto escavato (*"early esophageal cancer"*). Le forme più avanzate appaiono come lesioni stenosanti; in tali casi è indispensabile eseguire una TC o una RM di stadiazione.

Eventuali lesioni comprimenti l'esofago dall'esterno possono essere rilevate come ombre o dislocazioni all'esame radiografico con contrasto e sono meglio caratterizzabili mediante TC ed RM.

Dopo gli interventi chirurgici di ricostruzione dell'esofago è sempre necessario eseguire un esame radiografico con contrasto per documentare la pervietà dell'organo prima di riprendere l'alimentazione[5].

Stomaco

Le malformazioni a carico dello stomaco possono essere studiate come quelle esofagee mediante l'esame radiografico con mezzo di contrasto. Nella stenosi ipertrofica del piloro la radiografia con mezzo di contrasto evidenzia il restringimento del lume pilorico associato a dilatazione a monte ed assenza o riduzione dell'aria a valle; l'ecografia consente in tali casi di misurare i diametri della muscolatura pilorica. Nell'atresia del piloro non si osserva aria a livello dell'intestino e non va usato il mezzo di contrasto.

La radiologia tradizionale è un importante presidio nella ricerca di corpi estranei ingeriti a livello dello stomaco. Se i corpi estranei ingeriti hanno oltrepassato lo sfintere pilorico non possono più essere rimossi per via endoscopica ed è pertanto necessario monitorare i pazienti fino alla loro espulsione con le feci. I corpi estranei radiopachi sono visibili al semplice esame radiografico diretto, mentre per rilevare quelli radiotrasparenti (bezoari) costituiti di solito da capelli o vegetali è necessario utilizzare il mezzo di contrasto.

Le ernie diaframmatiche possono evidenziarsi come un livello idro-aereo in sede sopradiaframmatica; l'utilizzo del mezzo di contrasto consente di rilevarle e caratterizzarle in maniera più accurata.

Le erosioni dovute a gastrite sono evidenti all'esame radiografico con contrasto come lesioni "a bersaglio" (centro più denso perché pieno di mezzo di contrasto e periferia più radiotrasparente per la presenza di edema). Nei pazienti affetti da malattia di Menetrier è possibile rilevare la caratteristica ipertrofia delle pliche.

L'ulcera gastrica, come anche quella duodenale, si rilevano come aree radiopache rotonde o lineari dovute ad accumulo del mezzo di contrasto nelle cavità neoformate. È possibile inoltre rilevare convergenza delle pliche verso le ulcere o lo spasmo della parete opposta. L'esame è di solito eseguito con tecnica a doppio contrasto e permette di localizzare anche eventuali complicanze come le perforazioni. Un'ulcera duodenale può poi portare a stenosi dell'organo, ben rilevabile dall'esame radiografico.

I tumori benigni della mucosa appaiono all'esame radiografico con contrasto come lesioni aggettanti nel lume dell'organo, mentre quelli della parete (leiomioma, fibroma, lipoma) come irrigidimento della stessa (spesso poco visibile all'endoscopia). L'adenocarcinoma gastrico può manifestarsi come lesioni ulcerative o aggettanti nel lume, come anche irrigidimento della parete colpita (*linite plastica*). Il linfoma gastrico è spesso visibile all'esame radiografico con contrasto come un inspessimento cerebroide delle pliche. La TC ha ovviamente soppiantato le tecniche radiografiche nello studio dei tumori gastrici ed è di solito effettuata distendendo lo stomaco facendo bere acqua o mezzo di contrasto.

Dopo gli interventi di chirurgia gastrica è importante eseguire controlli periodici di pervietà dell'organo mediante esami radiografici con contrasto. Controlli specifici vanno inoltre effettuati dopo gli interventi di chirurgia bariatrica[6].

Duodeno

lipoma duodenale visto in TC

Le malformazioni a carico del duodeno sono anch'esse ben rilevabili usando l'indagine radiologica tradizionale con mezzo di contrasto. Mediante l'ecografia è possibile identificare il *pancreas anulare* (anomalia congenita che a volte può dare stenosi o ostruzione duodenale).

Le lesioni benigne possono essere ben caratterizzate utilizzando la TC con mezzo di contrasto (la dinamica della sua distribuzione permette di caratterizzare queste lesioni) come pure quelle maligne (adenocarcinoma duodenale, gastrinoma e primitività di organi confinanti che possono invadere il duodeno come lo stomaco, il pancreas,il rene, il colon e la colecisti). Nel caratterizzare le lesioni dubbie e nella stadiazione sono utili anche ecografia ed RM[7].

Intestino tenue

dilatazione dell'intestino tenue per ostruzione a livello della valvola ileo-ciecale

Atresia e stenosi sono facilmente identificabili usando l'esame radiografico diretto dell'addome, che documenta in tali casi ristagno di gas e livelli idro-aerei a monte dell'ostruzione. Per studiare le malrotazioni intestinali invece è necessario somministrare il solo mezzo di contrasto per via orale.

ernia inguinale a destra rilevata mediante TC

Il diverticolo di Meckel può venir identificato mediante la TC, di solito a 30–60 cm dalla valvola ileo-ciecale. Nel caso l'esame radiologico non ne permetta l'identificazione è possibile eseguire in medicina nucleare una specifica metodica scintigrafica.

Nelle sindromi da malassorbimento l'esame radiografico con contrasto mostra segni aspecifici (ipotonia, segmentazioni marcate, valvole conniventi molto evidenti nell'ileo). Mediante l'enterografia TC o RM è possibile osservare l'inversione del rapporto plicare fra digiuno ed ileo, oltre alla *"digiunalizzazione"* dell'ileo (il numero di pleche ileali diventa maggiore di quelle presenti nel digiuno). In tali casi la RM è sempre più utilizzata, visto che i pazienti sono spesso giovani e tale metodica non usa radiazioni ionizzanti.

Nelle enteriti e nelle malattie infiammatorie intestinali l'esame radiografico del tenue dopo clisma di mezzo di contrasto permette di evidenziare lesioni molto piccole, anche a carico della sola mucosa dell'organo; mentre TC ed RM consentono di valutare la parete nella sua interezza.

Nei casi di occlusione intestinale l'esame radiografico diretto permette di identificare stasi di gas nell'ileo spastico molto precocemente. Nell'ileo paralitico, che spesso segue lo spastico, si evidenziano spesso le anse disposte *"a mosaico"* (una accanto all'altra, distese ed ipotoniche). In caso di ulteriore persistenza del quadro clinico o se questo è causato da un ileo meccanico è possibile rilevare i livelli idro-aerei (liquido e gas). Nell'ileo meccanico si ha dilatazione delle anse a monte dell'ostruzione e queste appaiono disposte verticalmente. L'ileo meccanico può essere semplice, scompensato o complicato; radiologicamente si osserva dapprima con aumento del disegno plicare (ileo meccanico semplice), poi comparsa di liquido fra le anse (scompensato) e quindi progressiva scomparsa del disegno plicare (complicato). Un ileo meccanico se lasciato progredire diventa paralitico; la gravità dell'ileo meccanico rilevata radiologicamente condiziona la scelta terapeutica e l'eventuale timing chirurgico.

Le ernie sono ben rilevabili all'esame TC anche senza contrasto. In caso di complicanze a loro carico sono evidenti anche i segni di ostruzione intestinale. L'uso del mezzo di contrasto endovena è utile per identificare fenomeni ischemici, evidenti anche come accumulo di liquido attorno al viscere.

Un'occlusione venosa a livello intestinale può essere identificata molto precocemente come inspessimento della parete del viscere dovuto all'edema, con scomparsa del lume ed edema a carco anche dei tessuti mesenteriali circostanti. Nell'infarto arterioso è possibile osservare assottigliamento della parete (*"a foglio di carta"*) solo se è ostruita all'origine l'arteria mesenterica superiore, negli altri casi i segni radiologici sono aspecifici.

L'ascaris è un parassita intestinale visibile come una banda radiotrasparente con un filo radiopaco centrale (il canale alimentare). La tenia è difficilmente rilevabile con le metodiche radiologiche.

I tumori benigni sono ben identificabili mediante la TC con clisma a doppio contrasto. Il carcinoide appare se presente come una lesione rotondeggiante,con margini regolari, tipico *"aspetto stellato"* e localizzato spesso a livello dell'ultima ansa ileale. Gli altri tumori maligni e quelli provenienti da altri distretti spesso appaoiono invasivi, ulcerati o stenosanti. In tali casi vanno impiegate anche TC po RM a fini stadiativi, sia locali che a distanza[8].

Intestino crasso



Ecografia: appendicite.

L'ecografia è l'indagine radiologica di prima istanza da eseguire in caso di sospetta appendicite acuta, in quanto può mostrare sia l'eventuale inspessimento della parete dell'organo sia gli ascessi se presenti. Ecografia e TC sono anche fondamentali nel sospetto di neoplasie appendicolari o di mucocele. In caso di appendicite acuta l'esame radiografico diretto dell'addome può mostrare livelli idro-aerei, mentre il clisma a doppio contrasto consente di rilevare coproliti. stenosi o diverticoli (pur non permettendo di diagnosticare un'eventuale infiammazione).

Megacolon tossico in un paziente con rettocolite ulcerosa

Le malformazioni dell'intestino crasso possono essere diagnosticate con le stesse metodiche utilizzate per il resto dell'apparato digerente. Nell'imperforazione anale è possibile eseguire una valutazione accurata tramite l'esame radiologico diretto dell'addome condotto mantenendo il

bambino a testa in giù (si evidenzia bene la sede dell'imperforazione e la sua lunghezza a valle). Nella malattia di Hirschsprung è utile eseguire l'esame radiografico con mezzo di contrasto idrosolubile, che ben evidenzia il tratto di megacolon.

Nello studio della diverticolosi e delle sue complicanze è molto utile l'esame radiografico con doppio contrasto. Ecografia ed RM sono invece molto utili per studiare la parete dei diverticoli in dettaglio e rilevare segni di flogosi a suo carico.

Coliti, morbo di crohn e rettocolite ulcerosa possono essere studiate con le stesse metodiche già descritte per l'intestino tenue. L'unico esame indicato nel megacolon tossico è quello radiografico diretto dell'addome.

La colonscopia virtuale è molto utilizzata nella ricerca di polipi e lesioni aggettanti il lume intestinale, che possono se non asportati evolvere in neoplasie maligne. Mediante lo studio della densità e l'utilizzo del mezzo di contrasto è anche possibile eseguire una caratterizzazione di queste lesioni. Nel carcinoma colorettale la colonscopia virtuale viene usata anche per fini stadiativi (in quanto permette di studiare con un unico esame anche il resto dell'addome). Lo studio TC è anche utile quando non è possibile completare l'esame colonscopico per la presenza di stenosi o occlusioni del lume del viscere, nella ricerca di neoplasie sincrone. Ecografia ed RM trans-rettali sono utilizzate nello studio delle neoplasie del retto, al fine di quantificare l'infiltrazione della parete dell'organo.

Il clisma con doppio contrasto (utilizzando mezzo di contrasto idrosolubile) è utile dopo gli interventi chirurgici sull'intestino crasso per la ricerca di eventuali complicanze post-operatorie. Dopo l'amputazione del retto è invece necessario eseguire una TC o una RM[9].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 537-538.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 538.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 538-539.
4. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 539.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 540-542.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 542-546.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 546-547.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 547-553.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 553-556.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dell%27apparato_digerente&oldid=125482712"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 5 feb 2022 alle 20:39.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dell'apparato urinario

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dell'apparato urinario** permette di studiare le anomalie morfologiche di questo sistema tramite l'ecografia, la radiologia tradizionale, (urografia), la tomografia computerizzata (fra cui l'*uro-TC*) e l'imaging a risonanza magnetica (fra cui la *pielo-RM*). La scintigrafia renale, eseguita nei reparti di medicina nucleare, permette invece lo studio della funzione separata dei due reni e del deflusso urinario lungo tutto l'apparato.

Indice

Metodiche radiologiche
- Ecografia
- Radiologia tradizionale
- Tomografia Computerizzata
- Risonanza Magnetica

Patologia di reni ed ureteri
- Classificazione di Bosniak per le cisti renali

Patologia della vescica

Note

Bibliografia

Voci correlate

Metodiche radiologiche

un rene visto in ecografia

Ecografia

È l'indagine radiologica di primo livello per lo studio dei reni e della vescica; mentre permette di osservare gli ureteri nella loro porzione prossimale solo se questi sono dilatati. A livello renale consente di studiare sia le lesioni solide sia quelle cistiche, oltre alla patologia traumatica ed alla calcolosi (i calcoli renali appaiono iperecogeni e con un cono d'ombra che diparte a loro posteriormente rispetto alla sonda). La parete vescicale può essere studiata solo se la vescica è piena. Lo studio di questo apparato viene di norma effettuato con sonde da 3,5-5 MHz[1].

Radiologia tradizionale

Immagine radiologica di una urografia

L'esame radiografico diretto (effettuato senza impiegare mezzo di contrasto) è utile per evidenziare calcoli o calcificazioni vascolari, mentre consente di valutare solo in modo approssimativo la forma, i rapporti anatomici e la dimensione dei reni. Prima della sua esecuzione è necessario che il paziente assuma un lassativo per eliminare il più possibile il contenuto intestinale (e quindi l'aria al suo interno)[2].

calcoli renali bilaterali osservati all'esame radiografico diretto dell'addome. In pelvi è possibile osservare dei fleboliti



calcolosi renale bilaterale multipla vista alla TC

L'urografia si effettua somministrando un mezzo di contrasto al paziente per via endovenosa ed acquisendo immagini radiografiche che permettono di osservarne l'eliminazione lungo tutto l'apparato urinario. È un'indagine utile per valutare la morfologia dei reni e di tutte le vie escretrici. È possibile riconoscere quindi durante l'esame una fase *nefrografica* (in cui il parenchima renale è radiopaco), una *calico-pielica* (in cui sono visibili i calici , la pelvi renale e gli ureteri) ed una *cistografica* (in cui è evidente la vescica). Ormai questa tecnica è stata quasi ovunque soppiantata dall'*Uro-TC* (indagine eseguita utilizzando gli stessi principi, ma ricorrendo ad aquisizioni TC invece che radiografiche, che consentono una migliore valutazione tridimensionale)[1].



le varie fasi di un'urografia

È possibile somministrare il mezzo di contrasto anche direttamente dentro le vie urinarie usando un catetere inserito dall'uretra oppure per via percutanea (iniettando il mezzo di contrasto nella pelvi renale attraverso la pelle con un ago); tale tecnica è denominata *pielografia*. Lo studio della vescica effettuato riempiendola di mezzo di contrasto attraverso l'uretra è detto *cistografia*[3].

Tomografia Computerizzata



Cisti renale a sinistra vista in RM (sequenza T2 pesata)

Lo studio TC senza mezzo di contrasto permette di studiare in modo accurato la forma, la dimensione ed i rapporti dei reni con le strutture circostanti. Utilizzando il mezzo di contrasto è possibile studiare le masse renali ed eventualmente effettuare biopsie transcutanee delle stesse. Il mezzo di contrasto utilizzato è lo stesso impiegato in urografia e pertanto, come già detto, è possibile studiare anche la morfologia ed i rapporti anatomici delle vie escretrici acquisendo immagini più tardive (*Uro-TC*)[4].

Uro-TC

Risonanza Magnetica

La RM è un'ottima alternativa alla TC nel caso questa sia controindicata (allergia al mezzo di contrasto, insufficienza renale moderata). La RM permette di distinguere molto bene la corticale dalla midollare renale e può essere utilizzata per caratterizzare le masse o le raccolte renali e perirenali, anche mediante controlli periodici in donne in età fertile o persone giovani (grazie al fatto che non utilizza radiazioni ionizzanti). Utilizzando sequenze T2 pesate è possibile far risaltare i liquidi nelle cavità renali e quindi visualizzare le alte vie escretrici (*pielo-RM*). È possibile inoltre effettuare studi utilizzando mezzi di contrasto a base di gadolinio ottenendo risultati sovrapponibili a quelli di un'*uro-TC*[5].

Patologia di reni ed ureteri

Rene a ferro di cavallo visto alla TC

La ricerca delle malformazioni renali in età pediatrica è di norma effettuata mediante l'ecografia; queste includono, l'aplasia (in tale quadro l'unico rene presente appare ipertrofico), la *fusione* dei 2 reni, l'*ectopia* renale, la *distopia* (rene localizzato dal lato opposto) ed il *rene a ferro di cavallo* (in quest'ultimo caso la TC con mezzo di contrasto consente di caratterizzare l'*istmo* che unisce i 2 reni a livello dei loro poli inferiori).A livello degli ureteri invece è possibile evidenziare *sdoppiamenti* (che drenano porzioni differenti di parenchima e con sbocco di entrambi in vescica o unione a valle), l'*ureterocele* (erniazione dell'uretere allo sbocco in vescica per stenosi del meato vescico-ureterale) ed il *megauretere* (che può essere congenito o secondario ad un'ostruzione). Mediante la cistografia (sia effettuata mediante radiografia con mezzo di contrasto sia utilizzando le metodiche medico-nucleari, descritte nella voce

Rene policistico bilaterale visto alla TC



Cisti renale semplice vista alla TC


Riproduci file multimediale
Immagini TC in un caso di tumore di Wilms


Ematoma renale in TC

scintigrafia renale) è possibile documentare un eventuale reflusso di urina dalla vescica agli ureteri (*reflusso vescico-ureterale*)[6].

Carcinoma renale studiato mediante TC con mezzo di contrasto

Nelle glomerulonefriti, nella sindrome nefrosica e nelle pielonefriti i segni radiologici sono aspecifici: in fase acuta di sindromi nefrosiche e glomerulonefriti si può osservare aumento delle dimensioni dei reni ed ipoecogenicità/ipodensità parenchimale, mentre nelle glomerulonefriti croniche gli organi appaiono ridotti di dimensioni per fibrosi. Nelle pielonefriti si ha impregazione parenchimale disomogenea del mezzo di contrasto solo nelle forme croniche, associata a dismorfia dei calici. La TC in tali casi è utile anche per pianificare una biopsia renale[7].

Angiomiolipomi renali multipli visti alla TC in un paziente con sclerosi tuberosa

La tubercolosi renale si manifesta alla TC mediante tipiche lesioni ipodense bilaterali orientate come le piramidi renali e con aspetto *"a trifoglio"* (dovute a distruzione del parenchima da parte del bacillo); tale quadro clinico evolve poi con distruzione del sistema collettore fino al quadro di *rene "a mastice"*. Sono spesso presenti calcificazioni. L'ecografia in questi casi è poco utile[8].

Infarto renale visto alla TC

Gli ascessi renali sono ben evidenti in ecografia come raccolte liquide con contenuto corpuscolato, margini non definiti e spesso setti interni. Mediante la TC queste caratteristiche sono meglio visibili ed è possibile inoltre rilevare anche la contemporanea presenza di aria. La perinefrite deriva dalla rottura di un ascesso renale nello spazio perirenale, appare come una raccolta fluida perirenale a margini non ben definiti, che disloca il rene. La RM è utile per valutare le complicanze delle infezioni renali e, come la TC può essere usata per pianificare un eventuale drenaggio[9].

I calcoli renali sono di solito radiopachi, tuttavia non sono sempre facilmente identificabili tramite l'esame radiografico diretto dell'addome, in quanto possono sovrapporsi ai gas intestinali o essere confusi con calcificazioni di altra natura. L'ecografia consente di localizzare calcoli fino a 1–2 mm in diametro se localizzati nelle alte vie urinarie o in vescica come formazioni fortemente iperecogene che proiettano



Stenosi dell'arteria renale vista in angiografia

posteriormente alla sonda un cono d'ombra. In presenza di calcolosi ureterale è spesso presente idronefrosi, anch'essa ben visibile all'ecografia. L'urografia consente di localizzare quasi sempre un calcolo localizzato in qualunque punto dell'apparato urinario. La TC senza mezzo di contrasto è un esame che con una dose non elevata di radiazioni somministrata al paziente consente di localizzare calcoli anche molto piccoli, oltre a consentirne la caratterizzazione mediante lo studio della loro densità[10].

Le cisti renali sierose alla TC appaiono come lesioni ipodense ed a margini ben definiti, che non accumulano mezzo di contrasto. In ecografia le stesse lesioni appaiono ipo-anecogene. L'ecografia è anche l'indagine di primo livello per lo studio del rene policistico. Le cisti molto grandi e dolorose possono essere drenate mediante agoaspirato TC o ecoguidato.[11].



Classificazione di Bosniak delle cisti renali. (A) Cisti Bosniak IIf vista alla TC 6 mesi prima della sua diagnosi come carcinoma renale a cellule chiare per evoluzione a Bosniak IV (B). Cisti Bosniak III (C) che presenta setti con marcato enhancement dopo somministrazione di mezzo di contrasto da riferire anch'essa a carcinoma renale, come anche la cisti Bosniak IV (D) che presenta numerosi setti nel suo contesto.

Classificazione di Bosniak per le cisti renali

Questa classificazione è utilizzata in ambito radiologico per la determinazione del rischio di malignità delle lesioni cistiche renali, in modo da indirizzare o meno verso un'eventuale asportazione chirurgica. Sebbene tale scala sia nata studiando tali lesioni mediante la TC è applicabile anche ad immagini ecografiche ed RM (queste ultime in alcuni casi sono in grado di mostrare dettagli non visibili alla TC). Vengono valutati lo spessore della parete delle cisti, la presenza di setti, calcificazioni o aggetti nel loro contesto così come il potenziamento dopo somministrazione del mezzo di contrasto[12].

Classificazione di Bosniak

Classe	Descrizione	Indicazioni
I	Contenuto liquido (densità fra -20 e 10 HU), no setti, calcificazioni, aggetti o potenziamento dopo mdc	Cisti benigna, follow up non indicato
II	Possibile presenza di qualche setto che non si potenzia dopo mdc, possibili fini calcificazioni dei suddetti setti o della parete. Cisti ad elevata densità di dimensioni minori a 30 mm, a margini netti e che non presentano potenziamento dopo mdc	Cisti benigna lievemente complicata, follow up non indicato
II F	Setti multipli, minimo enhancement dopo mdc di questi o della parete, calcificazioni grossolane, senza componenti solide o impregnazione di mdc a livello del lume. Cisti ad elevata densità, di dimensioni < 30 mm, a margini netti, prive di enhancement dopo mdc e completamente intrarenali	Cisti moderatamente complicata. Indicato follow up TC o esecuzione di imaging RM per migliore definizione diagnostica (la lettera F sta per "follow up"). Sono spesso esiti emorragici o infiammatori ma a volte possono sottendere lesioni maligne (5% dei casi). Follow up da fare anche ogni 6 mesi per 4-5 anni.
III	Pareti o setti spessi con enhancement dopo mdc misurabile (cisti emorragiche o infette di dimensioni minori di 30 mm, tumori cistici, nefroma cistico multiloculare)	Cisti maligna nel circa 50% dei casi. Indicata l'asportazione chirurgica.
IV	Come la classe III con in più presenza di aggetti solidi non legati ai setti o alla parete che mostrano enhancement dopo mdc	Cisti quasi sicuramente maligna, indicata l'asportazione chirurgica.

L'adenocarcinoma a cellule chiare è il principale tumore renale maligno dell'età adulta; di solito metastizza a livello dei polmoni, del cervello e dello scheletro, oltre a formare trombi neoplastici nella vene renale e cava inferiore. Di solito l'esame radiologico di primo livello nello studio di queste lesioni è l'ecografia, seguito dalla TC con mezzo di contrasto, che ha indicazioni diagnostiche, stadiative e di follow-up. In TC il carcinoma renale appare invasivo e presenta potenziamento dopo iniezione di mezzo di contrasto. In RM il carcinoma renale appare ipointenso nelle sequenze T1 pesate ed iperintenso in modo disomogeneo nelle sequenze T2 pesate; dopo somministrazione di mezzo di contrasto si osserva potenziamento del segnale. Le tecniche di radiologia interventistica consentono di effettuare biopsie TC od ecoguidate, trattare piccole lesioni mediante radiofrequenze o grosse lesioni mediante embolizzazioni dopo angiografia. La RM è usata come seconda scelta nel valutare il carcinoma a cellule renali quando non è possibile somministrare il mezzo di contrasto, ma rappresenta l'esame radiologico di primo livello nello studio del tumore di Wilms (il tumore maligno renale più frequente dell'età pediatrica) in quanto non utilizza radiazioni ionizzanti[13].

L'angiomiolipoma renale è uno dei più frequenti tumori benigni del rene; appare agli esami radiologici come una lesione rotonda ed a margini netti, iperecogena ed omogenea all'ecografia, con densità lipidica alla TC senza mezzo di contrasto (per tale ragione la TC permette in questo caso di fare diagnosi). Un adenoma renale non può essere differenziato con le metodiche radiologiche da un adenocarcinoma[14].

I traumi a carico dei reni possono portare a rotture del parenchima, danni ai sistemi colletori o ai vasi (con associati spandimenti di urina o sangue oppure ostruzioni vascolari). L'ecografia è l'indagine di norma di prima istanza, l'urografia permette di studiare in dettaglio il rene traumatizzato (studio della funzionalità parenchimale e di integrità delle vie escretrici), ma l'indagine di primo livello nel politraumatizzato è la TC con mezzo di contrasto. L'angiografia è utilizzata nel sospetto di occlusione vascolare post-traumatico[15].

L'infarto renale può essere visualizzato all'ecografia come un'area caratterizzata da assenza del segnale color-doppler, oppure mediante TC con mezzo di contrasto, ove si presenta come una zona di forma triangolare ipodensa.

La stenosi dell'arteria renale viene di norma valutata in prima istanza con l'ecografia doppler. L'esame di secondo livello in questa patologia è l'angio-TC, che consente anche di caratterizzare la stenosi stessa oltre a misurare il diametro del lume residuo, con accuratezza quasi del 100% in caso di stenosi emodinamicamente significative. La TC è anche utile nel follow-up dopo il trattamento di questi pazienti. LA RM viene in questi casi impiegata ove non sia possibile utilizzare il mezzo di contrasto organoiodato, tuttavia è meno efficiente della TC nel valutare le diramazioni più distali ed a volte sovrastima l'entità della stenosi; d'altro canto l'accurata capacità di valutare le porzioni prossimali dell'arteria renale la rende l'esame di prima scelta nella valutazione di persone a rischio di insufficienza renale, anziani, ipertesi e diabetici. L'uso dell'angiografia è di norma riservato ai casi ove è necessario un intervento terapeutico (posizionamento di stent, fibrinolisi di una trombosi dell'arteria renale).

La trombosi della vena renale si evidenzia all'ecografia come ingrandimento dell'organo e sua ipoecogenicità per edema, con associato assente segnale di flusso al color-doppler. La RM consente invece di descrivere in modo accurato l'estensione della trombosi e, mediante l'impiego del mezzo di contrasto, determinarne l'eventuale natura neoplastica (l'interessamento da parte di tessuto neoplastico del vaso si presenta come iperintensità dopo somministrazione di mezzo di contrasto)[16].

Patologia della vescica

Reflusso vescico-ureterale bilaterale visto in cistografia

La *stenosi del collo vescicale* può essere diagnosticata mediante l'uretrocistografia minzionale, sia radiografica che radioisotopica. Allo studio radiografico la vescica in tali casi assume una forma conica ed è spesso presente reflusso vescico-ureterale.



Diverticolo vescicale visto in ecografia

Le *valvole uretrali* (presenti solo nel maschio) alla cistografia radiografica appaiono come sottili difetti di riempimento lineari associati a dilatazione dell'uretra posteriore ed ipertrofia colonnare (*vescica da sforzo*).

Calcolo in vescica rilevato mediante ecografia

In alcuni casi l'uraco può non andare in involuzione durante la vita intrauterina; in tali casi può essere identificato dall'ecografia (mentre la cistografia lo evidenzia se comunica con il resto delle vie escretrici).

Inspessimento neoplastico della parete vescicale rilevato alla TC

Nell'*estrofia completa della vescica* (grave malformazione che coinvolge le pareti addominali e vescicali anteriori, oltre allo scheletro del pube) l'esame radiografico diretto e l'urografia permettono di descrivere al meglio le alterazioni. La forma incompleta invece riguarda solo la parete anteriore della vescica.

Idronefrosi bilaterale causata da un tumore vescicale ostruente gli ureteri a valle

La cistografia è utilizzata anche nella valutazione dell'ipospadia[17].

Le cistiti acute sono mute dal punto di vista radiologico, in quelle croniche la vescica appare all'ecografia di dimensioni ridotte ed irregolare. Nelle cistiti micotiche è possibile osservare materiale ipodenso nel lume dell'organo, mentre in quelle post-attiniche la parete apare inspessita e poco distensibile. Un'eventuale metaplasia squamosa se focale può simulare una forma tumorale. Nelle uretriti è possibile osservare inspessimento del collo vescicale[18].

I calcoli che sono discesi in vescica e non sono stati espulsi sono ben evidenti in ecografia e cambiano di posizione con il variare del decupito. L'ecografia transrettale permette uno studio accurato dell'uretra posteriore. In caso di ostruzione uretrale si può osservare un quadro di vescica da sforzo[19].

I traumi vescicali sono ben studiabili tramite l'uretrocistografia retrograda, che ben evidenzia eventuali raccolte di sangue e urina. La TC permette di fare la stessa cosa ed è la metodica di elezione nel paziente politraumatizzato. L'ecografia è poco utile nella diagnostica dei traumi vescicali (in quanto spesso la vescica del paziente in urgenza non è piena), tuttavia può aiutare nell'inserimento di cateteri di drenaggio[19].

L'ecografia è l'indagine di primo livello per lo studio del tumore della vescica assieme al citologico urinario in quanto permette di distinguere le forme *peduncolate* da quelle *sessili*, oltre ad evidenziare una rigidità locale della parete. La cistoscopia in questi casi è l'indagine di elezione. L'urografia può essere utile per rilevare eventuali lesioni sincrone nel restante apparato urinario. TC ed RM sono usate invece nella stadiazione locale ed a distanza, come pure nel follow-up. La RM con mezzo di contrasto o eseguita utilizzando sequenze al tensore di diffusione è più affidabile della TC nello studiare l'invasione locale da parte della malattia. Le sequenze di diffusione possono inoltre permettere di distinguere una linfoadenopatia metastatica da una che non lo è[20].

Note

1. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 666-667.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 667.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 667-668.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 668-669.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 669.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 669-671.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 671-672.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 672-673.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 673.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 673-674.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 674-675.
12. ^ https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2019/03/20190919CB_11_Barrassi.pdf
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 675-677.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 677-678.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 678.
16. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 678-681.
17. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 681-682.
18. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 682-683.

19. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 683.
20. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 683-685.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dell%27apparato_urinario&oldid=126483252"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 mar 2022 alle 10:00.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dell'apparato circolatorio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dell'apparato circolatorio** impiega l'ecografia (in particolare l'ecografia doppler), la tomografia computerizzata, l'imaging a risonanza magnetica e l'*angiografia a sottrazione digitale* (DSA) che ha ormai quasi solo ruoli terapeutici o di esame diagnostico di ultimo livello. La *venografia* o *flebografia* (esame radiografico effettuato dopo iniezione di un mezzo di contrasto endovena) era in passato molto utilizzata per lo studio del sistema venoso, ma è ora stata quasi del tutto soppiantata dalle altre metodiche, mentre l'esame radiografico diretto (senza usare un mezzo di contrasto) consente solo di rilevare eventuali calcificazioni a livello delle arterie.

Flebografia in un paziente con trombosi venosa profonda

In questa voce non saranno trattate le metodiche radiologiche per lo studio del cuore (già descritte in: ecocardiogramma, ecocardiografia da stress, Tomografia computerizzata cardiaca e risonanza magnetica cardiaca) e del circolo polmonare (già descritte in studio TC del polmone).

Indice

Arterie
- Metodiche radiologiche
- Patologia arteriosa

Vene
- Metodiche radiologiche
- Patologia venosa

Note

Bibliografia

Voci correlate

Arterie

Metodiche radiologiche

L'ecografia è l'esame radiologico di primo livello per studiare i vasi arteriosi del collo, le succlavie, le arterie degli arti inferiori e l'aorta addominale; oltre ai loro rami collaterali. Si usano a tal fine sonde da 7-10 MHz per i vasi superficiali e da 3,5-5 MHz per i vasi profondi e si effettuano di solito scansioni sui piani

longitudinali ed assiali rispetto all'asse maggiore del vaso in esame. Mediante le metodiche ecografiche è possibile studiare in dettaglio la parete dei vasi e gli eventuali trombi e placche se presenti. Le metodiche doppler consentono inoltre di studiare il flusso sanguigno nel lume vasale[1].

La Tomografia computerizzata (Angio-TC) è un esame di solito di secondo livello, spesso effettuata dopo un'ecografia. Consente uno studio rapido ed accurato, tramite l'utilizzo del mezzo di contrasto e di tomografi veloci, sia dell'anatomia vasale sia della parete dei vasi stessi, alla ricerca di trombi, calcificazioni e placche. La TC è anche utilizzata nel follow-up dei pazienti trattati per via chirurgica ed[2].

L'imaging a Risonanza Magnetica (Angio-RM) con mezzo di contrasto a base di gadolinio è utilizzabile come alternativa all'Angio-TC in caso di controindicazioni all'uso del mezzo di contrasto iodato. Gli esami di Angio-RM non vanno eseguiti fino a 6 settimane dal posizionamento di dispositivi intravascolari metallici per il rischio che cambino posizione (sebbene siano costituiti da materiali amagnetici deve comunque passare un po' di tempo per permettere la loro stabilizzazione). L'esame RM rispetto alla controparte TC è più costoso, richiede più tempo e non permette di rilevare le calcificazioni di parete; pertanto rispetto alla TC le metodiche RM rappresentano un'alternativa di seconda scelta[3].

Patologia arteriosa

Le varianti anatomiche, le anomalie congenite e le fistole artero-venose (FAV) sono ben rilevabili sia con l'angio-TC che con l'angio-RM. Conoscere le varianti anatomiche è importante in vista di eventuali interventi terapeutici, mentre le fistole artero-venose sono spesso trattate mediante embolizzazione per via endovascolare[4].

Nell'embolia periferica l'esame che viene di norma eseguito d'urgenza è l'ecodoppler, mentre l'angio-TC è utilizzata per indagare i vasi profondi o in caso di dubbi all'esame ecografico. Le metodiche di radiologia interventistica sono poi spesso utilizzate per risolvere il quadro clinico. Le stesse metodiche sono utili anche nelle trombosi[5].

In seguito a traumi l'esame impiegato più spesso in urgenza è l'ecodoppler, mentre la TC è utilizzata solo in pazienti emodinamicamente stabili. In caso di esame positivo per lesioni vascolari importanti il paziente deve essere trattato mediante chirurgia o metodiche di radiologia interventistica[6].

L'arterite di Horton può essere indagata mediante l'ecografia doppler, che permette di identificare sia le alterazioni della parete dei vasi colpiti sia la presenza al loro interno di trombi (dato praticamente costante)[7].

Anche l'arterite di Takayasu può essere indagata mediante le metodiche ecografiche eseguite a livello dei grossi vasi, tuttavia l'indagine di conferma in questi casi è l'Angio-TC (o in alternativa l'Angio-RM)[7].

Il fenomeno di Raynaud può essere monitorato radiologicamente mediante un monitoraccio continuo con metodiche doppler[7].

Nella tromboangioite obliterante i vasi arterosi di piccolo e medio calibro e quelli venosi colpiti non hanno mai calcificazioni (cosa che distingue questa malattia dall'aterosclerosi). Le metodiche ecodoppler in tale patologia rappresentano le metodiche di indagine di primo livello, mentre Angio-TC ed Angio-RM sono le metodiche di conferma, che permettono di analizzare anche le diramazioni più piccole a valle dell'arteria poplitea[8].

La *fibrodiplasia della tonaca media* colpisce prevalentemente le arterie renali (che presentano l'aspetto tipico *a corona di rosario*) in soggetti giovani. L'indagine di primo livello è l'ecodoppler, che di solito è seguito da Angio-TC o Angio-RM. Le metodiche di radiologia interventistica sono risolutive in più del



Arterite di Takayasu vista in RM dopo somministrazione di mezzo di contrasto. La parete del vaso appare inspessita ed iperintensa nelle sequenze T1 pesate

90% dei casi[9].

Nella *sindrome neurovascolare dell'arto superiore* o *dello Stretto Toracico* si ha occlusione dei vasi arteriosi e venosi associata a compressione del plesso brachiale che può essere causata da una costa sovrannumeraria, una megapofisi trasversa o da anomalie congenite della clavicola o della prima costa. Gli esami di primo livello sono la radiografia della colonna cervicale (per la ricerca delle anomalie ossee), l'ecodoppler e l'elettromiografia. L'angio-RM dinamica con arti superiori in adduzione ed abduzione consente di evidenziare sia le stenosi arteriose sia le occlusioni venose ed è indispensabile per pianificare l'intervento chirurgico correttivo[10].



Ricostruzione 3D da Angio-TC di un'aorta affetta da stenosi ed aneurismi aterosclerotici

Le stenosi aterosclerotiche dei tronchi sovraortici (TSA) intratoracici coinvolgono più frequentemente l'origine dell'arteria succlavia sinistra; tali stenosi sono spesso compensate da inversione del flusso a livello dell'arteria vertebrale sinistra, ben visibile all'ecodoppler (*"furto" della succlavia*). Angio-TC ed Angio-RM consentono poi di confermare la diagnosi. L'arteria carotide interna è il tronco sovraortico più frequentemente colpito dalla malattia aterosclerotica stenosante, che può anche portare alla completa occlusione del lume del vaso. L'ecodoppler è l'esame di primo livello per lo studio di questa patologia e secondo alcuni Autori andrebbe eseguito in tutti i soggetti con fattori di rischio predisponenti ed oltre 50 anni di età (in quanto è una patologia ad alta prevalenza nella popolazione). L'ecodoppler, oltre al grado di stenosi (considerata *critica* se interessa oltre il 70% del lume) consente anche di studiare il flusso ematico e le caratteristiche delle placche ateromasiche, comprese le sue eventuali ulcerazioni (tuttavia le calcificazioni se presenti a tale livello possono interferire col fascio ultrasonoro). L'angio-TC è l'esame da eseguire in previsione di un intervento terapeutico, va effettuato con un campo che includa tutta la testa fino all'arco aortico, e consente di evidenziare l'entità delle stenosi, la struttura delle placche e la presenza di eventuali lesioni ischemiche cerebrali. L'Angio-RM è usata come alternativa all'Angio-TC nei pazienti allergici ai mezzi di contrasto iodati e consente, tramite opportuni protocolli, la misurazione del flusso ematico prima e dopo i trattamenti terapeutici, che possono essere chirurgici o endovascolari[11].

Anche le stenosi a livello dell'aorta toracica ed addominale e dei loro rami sono spesso indagate mediante le metodiche ecodoppler in prima battuta (ove possibile) e quindi mediante Angio-TC o Angio-RM; analogamente agli altri distretti le metodiche di radiologia interventistica hanno un determinante ruolo nel loro trattamento. I distretti più frequentemente colpiti da stenosi aterosclerotiche a tale livello sono i vasi mesenterici (in tal caso si potrà avere ad esempio *claudicatio abdominis*) e le arterie renali (con conseguente danno renale ed ipertensione reattiva all'attivazione del sistema renina-angiotensina)[12].

I vasi iliaci e le arterie delle gambe sono i più colpiti dopo le carotidi dalle stenosi aterosclerotiche; anche in questi casi l'ecodoppler è la tecnica di indagine di primo livello, mentre Angio-TC ed Angio-RM hanno ruoli di conferma diagnostica. È possibile trattare per via endovascolare con ottimi risultati le stenosi di questo distretto non più lunghe di 5 cm; negli altri casi è necessario ricorrere alla chirurgia. Nel paziente diabetico affetto da vasculopatia diabetica sono di frequente riscontro le stenosi e le occlusioni delle arterie distali dell'arto inferiore; in tali casi le metodiche doppler rappresentano il principale approccio diagnostico,

mentre alla radiologia interventistica possono essere demandati molti interventi terapeutici d'urgenza volti alla ricanalizzazione dei vasi ostruiti, permettendo di evitare un'eventuale amputazione (*"salvataggio d'arto"*)[13].



Aneurisma dell' aorta toracica rotto visualizzato alla TC dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Il vaso appare iperdenso (freccia nera) mentre il sangue uscito dal vaso è evidente in mediastino (freccia bianca).



Dissecazione aortica con ischemia del rene destro dovuta ad esclusione dell'arteria renale destra da parte del falso lume (asterisco).

Più del 90% degli aneurismi sono di natura aterosclerotica (in meno casi sono di origine congenita, infettiva, infiammatoria o post-traumatica). L'Angio-TC e L'Angio-RM sono le metodiche più utilizzate per lo studio della patologia aneurismatica, tuttavia l'Angio-RM non è adatta a valutare i pazienti trattati con stent metallici per la presenza di artefatti nelle immagini. La sede più frequente degli aneurismi è l'aorta addominale sottorenale. Gli aneurismi dell'aorta addominale (AAA) con diametro maggiore di 5 cm e velocità di crescita > 1 cm/anno sono a rischio di rottura, mentre per l'aorta toracica questi limiti non sono universalmente definiti per via della maggiore variazione interindividuale (il rischio in tali casi aumenta oltre i 4 cm). L'ecografia è l'indagine di primo livello oltre che la più utilizzata per il follow-up degli AAA, mentre l'Angio-TC è utile sia nella gestione delle emergenze (rotture e dissecazioni) sia nella pianificazione terapeutica, spesso demandata alla radiologia interventistica. La complicanza più frequente dell'AAA trattato con stent e il suo rifornimento di sangue dal bordo della protesi (*endoleak*), rilevabile con tutte le metodiche (anche se di solito si effettuano controlli Angio-TC annuali)[14].

La dissecazione aortica è una condizione di emergenza che pone a rischio la vita del paziente. Le dissecazioni "alte" (tipo A secondo la classificazione di Stanford) sono a partenza dall'aorta ascendente, sono rilevabili anche con un ecocardiogramma e sono trattate per via cardiochirurgica, mentre le forme più distali (tipo B secondo Stanford) sono a partenza da un punto sotto l'arteria succlavia sinistra e possono essere trattate per via endovascolare. L'Angio-TC è la metodica di scelta per indagare questi pazienti, in quanto consente di descrivere il tragitto della dissecazione e di rilevare le sue complicanze (rotture ed ischemie per esclusione di rami collaterali)[15].

Vene

Metodiche radiologiche

All'ecografia è possibile distinguere le vene dalle arterie perché le prime sono comprimibili al contrario delle seconde. Le vene si presentano classicamente ipoecogene al centro e con la parete iperecogena; tale quadro è associato a caratteristici echi nei piani più profondi. Mediante la metodica doppler è anche possibile ottenere informazioni sul flusso sanguigno al loro interno. Alle immagini color-doppler (in cui le informazioni morfologiche dell'ecografia sono sovrapposte a quelle doppler usando un codice colore) il flusso in direzione della sonda appare rosso, quello in allontanamento blu e quello turbolento giallo[16].

La Tomografia Computerizzata dopo iniezione di un mezzo di contrasto può essere utilizzata per ottenere immagini del vasi del tutto simili a quelle descritte per le arterie (Veno-TC). A tal fine i mezzi di contrasto devono avere un'alta densità (almeno 370 mg/I) ed una velocità di infusione inferiore a quella di un'Angio-TC (di solito 2-3 ml/sec contro i 4-6 ml/sec). La scelta dell'algoritmo di ricostruzione delle immagini deve essere effettuata in base al distretto che si intende studiare[17].

Le metodiche di Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto a livello venoso sono più accurate rispetto allo studio delle arterie per via del flusso sanguigno più lento e delle maggiori dimensioni dei vasi venosi. È possibile inoltre utilizzare numerose tipologie di sequenze. Ad esempio con le tecniche di presaturazione utilizzate a monte o a valle della zona da studiare è possibile distinguere agevolmente un vaso arterioso da uno venoso. Le sequenze Spin-Echo (SE) mostrano i vasi venosi con flusso come senza segnale e sono utili per studiare le grosse vene anche senza utilizzare il mezzo di contrasto, come anche le Gradient-Echo, Phase Contrast e Time of Flight (TOF) (sono tuttavia poco utili per i piccoli vasi, per studiare anche questi è quindi necessario utilizzare il mezzo di contrasto). Il mezzo di contrasto può essere somministrato tramite un accesso venoso periferico (tecnica *indiretta*) oppure direttamente nella vena che si intende studiare (tecnica *diretta*)[18].

Patologia venosa



Trombosi di un ramo della vena femorale vista all'ecografia color doppler. Il trombo appare iperecogeno e non si evidenzia flusso a livello del vaso interessato. In rosso l'arteria femorale, il blu la vena femorale.

L'ecografia doppler è l'indagine di primo livello per la valutazione delle maggioranza dei distretti venosi e, come per il circolo arterioso, TC ed RM sono di solito indagini di secondo livello; mentre la radiologia interventistica è di solito utilizzata per scopi terapeutici[19].

Trombosi venosa della vena iliaca vista alla TC (freccia)

Nella patologia varicosa degli arti inferiori l'indagine strumentale di solito utilizzata è l'ecografia, mentre TC ed RM sono riservate a casi particolari[19].

Nella ricerca delle trombosi localizzate a livello degli arti inferiori e delle tromboflebiti (che costituiscono un rischio per la tromboembolia polmonare), l'ecografia è il più importante presidio diagnostico a disposizione del clinico. La Veno-TC è utilizzata invece per lo studio delle trombosi a livello delle vene profonde addominali[20].

Anche nella patologia traumatica o da compressione (dovuta ad esempio a masse occupanti spazio) l'ecografia rappresenta l'approccio di primo livello; TC ed RM sono utilizzate per lo studio del circolo venoso profondo in sede toracica ed addominale o per lo studio delle eventuali masse comprimenti i vasi.In alcuni casi i traumi esitano in fistole artero-venose, indagabili in primo approccio con l'ecografia, ma che successivamente vanno studiate con TC o RM in vista di un intervento terapeutico. La RM è l'indagine di primo livello nello studio della fibrosi retroperitoneale comprimente la vena cava (la fibrosi presenta basso segnale sia nelle sequenze T1 che in quelle T2 pesate). La RM nella trombosi venosa profonda consente di differenziare i vasi con trombosi croniche da quelli con malattia insorta recentemente, ove si evidenziano segni di flogosi[21].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 461.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 461-462.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 462.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 463.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 463-466.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 466.
7. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 467.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 467-468.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 468-469.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 469.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 471-472.
12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 472-474.
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 474-478.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 479-486.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 486-488.
16. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 490.
17. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 490-491.
18. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 491-492.
19. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 492-493.
20. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 493-495.
21. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 495-498.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dell%27apparato_circolatorio&oldid=125759220"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 17 feb 2022 alle 23:54.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dell'apparato genitale femminile e della gravidanza

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

> **Questa voce o sezione sull'argomento medicina non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti**.

La **radiologia dell'apparato genitale femminile e della gravidanza** impiega metodiche quali l'ecografia e l'imaging a risonanza magnetica (oltre alla ormai meno utilizzata isterosalpingografia). La tomografia computerizzata, per via del fatto che utilizza radiazioni ionizzanti, non può essere utilizzata per lo studio delle donne in gravidanza, ma rappresenta comunque un importante presidio per la valutazione di numerose patologie a carico dell'apparato genitale femminile.

Indice

Metodiche radiologiche

Patologia e anatomia radiologica normale ovarica
- Anatomia radiologica normale e lesioni cistiche funzionali
- Semeiotica radiologica delle lesioni neoplastiche e simil-neoplastiche
  - Score di Sassone
- Tumori dell'ovaio

Patologia tubarica

Patologia ed anatomia radiologica normale uterina
- Anatomia radiologica normale
- Patologia endometriale
- Patologia miometriale
- Patologia cervicale

La gravidanza
- Primo trimestre
- Secondo trimestre
- Terzo trimestre
- Patologie embrio-fetali e della gravidanza

Note

Bibliografia

Voci correlate

Metodiche radiologiche



Isterosalpingografia normale. L'utero e le tube di Falloppio piene di mezzo di contrasto sono evidenti in nero



Utero normale visto in ecografia transvaginale. E' stata iniettata soluzione fisiologica nel lume dell'organo. L'endometrio appare iperecogeno rispetto al miometrio

L'ecografia è la prima indagine radiologica di norma condotta nel sospetto di una patologia dell'apparato genitale femminile e nello studio del feto. Tale esame può essere eseguito poggiando la sonda sull'addome della paziente a vescica piena (via *transaddominale*) oppure mediante sonde specifiche posizionate in vagina (*ecografia transvaginale*) che consentono una migliore esplorazione di tutta la pelvi. Nell'approccio transaddominale si utilizzano sonde *broad band* a bassa frequenza (2-7 MHz) che permettono al fascio ultrasonoro di raggiungere una maggiore profondità ma portando di contro una minore risoluzione spaziale, mentre nell'approccio transvaginale si usano sonde *microconvex "end fire" "broad band"* con frequenze più elevate (5-9 MHz). Lo studio transvaginale permette anche di studiare la vascolarizzazione degli organi pelvici (mediante le metodiche doppler e colorDoppler) e la loro elasticità mediante l'*elastografia* (le lesioni più maligne sono di solito meno elastiche rispetto alle altre) È inoltre possibile ottenere immagini ecografiche tridimensionali mediante l'Ecografia 3D, particolarmente utili nello studio delle patologie fetali. L'esame transvaginale è relativamente invasivo (non si può usare nelle pazienti pediatriche, nelle donne vergini ed in chi presenta stenosi della vagina) e non permette di osservare in modo accurato le lesioni più distanti dalla parete vaginale; tali limitazioni sono sopperite dalla Tomografia Computerizzata (TC) e dalla Risonanza Magnetica (RM); questi ultimi esami sono per tali motivi fondamentali nello studio delle pazienti oncologiche. La RM può inoltre essere impiegata con maggiore sicurezza nelle donne in età fertile ed è utilizzabile anche negli ultimi 2 trimestri della gravidanza (al contrario della TC). Il primo trimestre non è valutabile in RM per i movimenti e delle ridotte dimensioni del feto, oltre che per il rischio di possibili effetti teratogeni del campo magnetico, il cui assorbimento da parte dal feto non dovrebbe superare i 3 Watt/Kg per quanto riguarda il parametro SAR. Il mezzo di contrasto inoltre oltrepassa la placenta, quindi in gravidanza non si può usare. La RM permette di caratterizzare bene i tessuti ed i liquidi ed è pertanto è molto utilizzata nello studio delle malformazioni uro-genitali.

L'isterosalpingografia, tecnica radiografica che utilizza mezzo di contrasto iniettato nella cavità uterina, attualmente è utilizzata solo per verificare la pervietà delle tube di Falloppio nella diagnosi di infertilità o come esame preparatorio ad un intervento di radiologia interventistica di disostruzione tubarica[1].

Patologia e anatomia radiologica normale ovarica

Anatomia radiologica normale e lesioni cistiche funzionali

Il volume delle ovaie viene calcolato empiricamente moltiplicando fra loro e per 0,5 i diametri latero-laterale, antero-posteriore e cranio-caudale. Tale diametro varia con l'età e con le fasi del ciclo mestruale; è maggiore nelle donne giovani e di norma si attesta attorno ai 9 ml; con la menopausa il volume può decrescere fino a 1-2 ml. I volumi delle 2 ovaie di norma non dovrebbero differire di più di 14 ml. In fase



Corpo luteo associato a tre piccoli follicoli visibili alla sinistra dell'immagine, visti in ecografia transvaginale



Ovaio policistico

estrogenica il volume è di norma minore ed i follicoli hanno di solito diametro inferiore ai 5 mm. Circa al 10º giorno del ciclo mestruale si può osservare il follicolo dominante, grande circa 2-2,5 cm in diametro o anche oltre. All'ecografia il follicolo dominante appare come una cisti a contenuto anecogeno, con una piccola porzione iperecogena (cumulo ooforo). In fase luteinica spesso si osserva modico versamento nell cavo del douglas ed il corpo luteo appare come un'area ipoecogena con bordi sfrangiati; il corpo luteo a volte può persistere come cisti emorragica luteinica che si riassorbe di norma nell'arco di 2 mestruazioni. In fase post-mestruale le ovaie possono anche non essere più rilevabili in ecografia, tuttavia è da considerare anomalo il reperto radiologico di un ovaio di dimensioni oltre che doppie dell'altro in questa fase.

Le cisti *funzionali* dell'ovaio all'ecografia presentano contenuto anecogeno, dimensioni di 2,5–3 cm, hanno pareti sottili e sono da riferire ala normale ovogenesi, tuttavia quando tali formazioni presentano echi interni o diametri eccedenti i 5 cm sono meritevoli di rivalutazione dopo 2 cicli mestruali. Di norma tali cisti non si indagano con la TC (ove appaiono ipodense ed omogenee) o la RM (ove si presentano ipointense nelle sequenze T1 pesate ed iperintense in quelle T2 pesate, anche eseguite con tecniche di soppressione del grasso). Mediante entrambi gli esami di secondo livello non si osserva impregnazione di mezzo di contrasto.

Le cisti *follicolari* si originano dalla persistenza dei follicoli dopo l'ovulazione e sono da considerare parte dell'anatomia normale dell'organo. Possono anche essere più di una e di solito hanno diametro intorno ai 2 cm, ma a volte anche maggiore.

La cisti *luteinica* (da persistenza del corpo luteo fuori dalla fase luteinica del ciclo mestruale e dalla gravidanza) presenta contenuto ecogeno (per via del sangue coagulato al suo interno), margini non definiti e vascolarizzazione periferica al color-doppler.

Il quadro radiologico della sindrome da iperstimolazione ovarica è caratterizzato da aumento di dimensioni di entrambe le ovaie per la presenza di numerosi follicoli nel loro contesto, di dimensioni anche maggiori di 2 cm. È possibile anche osservare ascite e versamento pleurico per trasudazione di liquido da tali strutture.

Nella sindrome dell'ovaio policistico si osservano multiple cisti bilaterali di diametro intorno a 0,5-1,5 cm e volume ovarico bilateralmente aumentato di circa il doppio[2].

Semeiotica radiologica delle lesioni neoplastiche e simil-neoplastiche

Le lesioni tumorali ovariche radiologicamente possono avere l'aspetto di **cisti complessa** o di **lesione solida**.

La cisti complessa è caratterizzata all'esame ecografico dalla presenza di setti, aggetti solidi, echi interni, pareti spesse ed irregolari e dal fatto di essere multiloculata. In genere la cisti complessa presenta la parete, i setti e gli aggetti solidi molto vascolarizzati al color-doppler. Oltre alle neoplasie anche gli ascessi,

Cisti complessa



Torsione dell'ovaio. L'immagine è simile a quella di una cisti complessa

l'idrosalpinge, la piosalpinge, la torsione ovarica e le cisti emorragiche funzionali ed endometroidi possono presentarsi radiologicamente come cisti complesse. La torsione ovarica simula le cisti per la presenza di necrosi centrale, spesso si presenta vascolarizzata al color doppler ed è spesso associata nell'adulto al teratoma maturo. La diagnosi differenziale della cisti complessa deve sempre includere le neoplasie, pertanto sono stati elaborati sia degli score morfologici specifici (ad esempio lo *score di Sassone*) sia misurazioni di parametri specifici doppler, come l'*indice di pulsatilità* (IP) e la *resistenza dei vasi* (RF). Le formule matematiche per ricavare questi indici sono le seguenti:



Indagine color-doppler su una neoplasia ovarica



Cisti endometrioide. Ecograficamente si presenta come cisti complessa

$$IP = \frac{Vsist - Vdiast}{Vmedia}$$

$$RF = \frac{Vsist - Vdiast}{Vsist}$$

Ove *Vsist* è la velocità massima durante la sistole, *Vdiast* è la velocità a fine diastole e Vmedia la velocità media lungo tutto il ciclo cardiaco. Questi indici appaiono incrementati in presenza di neoangiogenesi neoplastica, ove si osserva maggior flusso in diastole[3].

Score di Sassone

Se la lesione presenta uno punteggio (ottenuto sommando quello di tutti e quattro i parametri) maggiore di 5 è probabile che sia maligna. Le lesioni sospette all'ecografia transvaginale andrebbero studiate mediante RM, che oltre ai dati morfologici consente di caratterizzarne il contenuto (sangue nelle cisti emorragiche, lipidi nei teratomi, proteine nelle lesioni benigne, borderline e maligne derivanti dall'epitelio ovarico). Il sangue appare iperintenso nelle sequenze T2 pesate con soppressione del grasso (cosa che invece abbatte il segnale in presenza di lipidi). TC ed RM possono essere invece utilizzate indifferentemente a fini stadiativi[4].

Spessore della parete:

- sottile (<3 mm): 1

- spessa (>3 mm): 2
- lesione solida o prevalentemente solida: 3

Struttura interna della parete:

- liscia :1
- irregolare:2
- presenza di almeno 3 papille: 3
- lesione solida o prevalentemente solida: 4

Setti:

- non presenti: 1
- setti sottili (<3 mm): 2
- setti spessi (>3 mm): 3

Ecogenicità:

- anecogena: 1
- ipoecogena: 2
- ipoecogena con associata porzione centrale iperecogena: 3
- ecogenicità mista: 4
- iperecogena: 5

Tumori dell'ovaio



Teratoma dell'ovaio di sinistra visto in RM mediante una sequenza T1 pesata. La lesione appare delimitata e disomogenea



Lo stesso teratoma visto con una sequenza T2 pesata

Il *teratoma* si presenta all'ecografia transvaginale in modo molto vario, ma più spesso come cisti complessa con all'interno calcificazioni (che producono coni d'ombra) o materiale iperecogeno (sebaceo). Tipici segni ecografici del teratoma sono il *"tip of the iceberg"* (assorbimento del fascio ultrasonoro al centro della lesione a causa delle numerose interfacce date dalla sua struttura disomogenea) ed il *"dermoid plug"* (zona iperecogena di forma rotonda con un'area iperecogena interna localizzata al centro della lesione). In TC tali lesioni sono diagnosticabili perché piene di materiale adiposo (quindi con densità tipica) e contenenti calcificazioni ed inclusi dentari (tipici di questo tumore) mentre in RM il segnale alle sequenze di saturazione del grasso appare iperintenso. Il segnale nelle sequenze T2 pesate appare invece estremamente disomogeneo per via delle differenti componenti tissutali.

Il *cistoadenoma sieroso* appare in ecografia come una cisti uniloculata, senza aggetti o setti. La densità alla TC e quella dell'acqua ed in RM si presenta iperintenso nelle sequenze T2 pesate ed ipointenso in quelle T1 pesate (in modo simile all'urina in vescica).



Carcinoma ovarico visto in TC

Il *cistoadenoma mucinoso* si presenta anch'esso come cisti semplice, ma si visualizza con echi stipati all'ecografia, alla TC presenta densità "proteica" (60-70 HU), mentre in RM presenta segnale iperintenso tipico sia nelle sequenze T1 pesate che in quelle T2 pesate.

Teratoma dell'ovaio di destra visto alla TC. La lesione appare di densità adiposa e presenta numerose calcificazioni da riferire ad elementi dentari. E' visibile inoltre un grosso leiomioma in sede uterina.

La presenza di una lesione cistica complessa con le caratteristiche dei quadri di cistoadenoma deve far sospettare una lesione maligna (cistoadenocarcinoma sieroso o mucinoso). Tali lesioni sono spesso associate ad ascite e metastasi linfonodali e sistemiche.

Le ovaie interessante da metastasi da tumori originatosi in altri distretti corporei si presentano incrementate di volume e disomogenee. Il quadro clinico denominato *tumore di Krukemberg* origina più spesso da un *carcinoma ad anello con castone* dello stomaco, coinvolge entrambe le ovaie ed è spesso associato ad ascite.

TC ed RM, essendo indagini con campo più ampio dell'ecografia, sono indagini utilizzate nella stadiazione dei tumori ovarici. La TC è più economica e veloce ma è meno efficace nell'evidenziare l'invasività locale della neoplasia (differenziare gli stadi Ia, Ib ed Ic secondo FIGO). La RM è anche leggermente più accurata anche della TC nel caratterizzare le lesioni ovariche sospette, tuttavia non consente di rilevare le calcificazioni presenti in alcuni tipi di lesioni[5].

Patologia tubarica



Idrosalpinge rilevata in ecografia

Le tube di Falloppio sane di norma non sono evidenziabili con le metodiche radiologiche senza riempirne il lume con del mezzo di contrasto (isterosalpingografia). In ecografia la tuba sana può essere rilevata come una banda iperecogena spessa circa 0.5 mm.

Gravidanza ectopica localizzata in adiacenza dell'ovaio di sinistra

Nella malattia infiammatoria pelvica (PID) il lume tubarico appare occupato da pus (*piosalpinge*) o essudato (*idrosalpinge*). Una tuba ingrandita e piena di liquido è sempre da considerare patologica. Se la quantità di liquido è abbondante ed il decorso della tuba tortuoso è possibile scambiare per errore queste condizioni cliniche con le masse cistiche ovariche. È possibile inoltre rilevare ascessi ripieni di liquido e gas oltre che versamento nel cavo del Douglas. Il gas è rilevato molto bene dalla TC come bolle o livelli idro-aerei e se presente depone per un'infezione da germi anaerobi. Nelle pazienti gravide è bene controllare anche la cavità uterina per il rischio aumentato di gravidanza ectopica dato dalla PID.

Nella gravidanza extrauterina, oltre a non osservarsi l'embrione a livello dell'utero (è tuttavia possibile osservare una pseudo-camera gestazionale piena di liquido) è spesso evidente versamento nel cavo del Douglas (che può estendersi anche al resto dell'addome e presentare echi interni, se è presente emorragia). Ecograficamente è possibile osservare in sede tubarica 4 quadri distinti: embrione vivo, embrione morto/massa annessiale con dentro solo un sacco vitellino, il segno *tubar or adnexal ring* (anello iperecogeno costituito da trofoblasto attorno ad una raccolta liquida) o una massa solida complessa. In sede ovarica una gravidanza extrauterina può essere scambiata con un corpo luteo emorragico o una cisti complessa.

I tumori primitivi ovarici sono molto rari (di solito carcinomi endometriali), più spesso tali strutture sono invase da neoplasie ovariche o uterine[6].

Patologia ed anatomia radiologica normale uterina



Adenomiosi diffusa. Le lesioni endometriosiche appaiono iperintense in RM


Fibroma uterino visto in RM. La lesione appare ipointensa (al contrario delle lesioni endometriosiche)



Accumulo di liquido nel lume uterino in una donna in post-menopausa

Anatomia radiologica normale

Le dimensioni dell'utero variano sia in funzione dell'età sia della fase del ciclo mestruale in cui si trova la paziente, oltre ad essere influenzate da gravidanze pregresse o in atto. Durante l'età fertile sono di maggiori dimensioni il corpo ed il fondo dell'organo, mentre dopo la menopausa la cervice è prominente o uguale alle altre porzioni in dimensioni. Le dimensioni normali sono di solito pari a 7,7x2,9x4,7 cm nelle donne nullipare, mentre variano fino a 8,6 x 3,5 x 5 cm nelle primipare e possono raggiungere anche 9,4 x 4,2 x 5,8 cm nelle donne che hanno avuto 4 o 5 parti durante la loro vita. L'utero normale è *antiverso* ed *antiflesso* (cioè piegato in senso anteriore e verso l'alto), tuttavia è possibile osservare anche una *retroversione* o una maggiore *anteroversione* rispetto alla norma (la posizione dell'utero di solito è ben valutabile tramite un esame ecografico transaddominale a vescica piena, la vescica può essere anche fatta svuotare nel caso il suo riempimento modifichi la posizione dell'organo rendendone complicata la misurazione)

In ecografia l'endometrio appare come una banda iperecogena che include il lume ed i due strati epitaliali giustapposti. Lo spessore endometriale varia col ciclo mestruale dai 2–3 mm sino ai 15 o più (in tale computo va esclusa l'eventuale fisiologica presenza di una piccola falda liquida nel lume, normale nella donna in età fertile ma sempre patologica dopo la menopausa). La giunzione fra endometrio e miometrio appare in ecografia come una sottile banda ipoecogena; tale banda non è sempre rilevabile, ma se appare interrotta si deve sospettare un'adenomiosi oppure la presenza di leiomiomi o lesioni epitaliali invasive. Il

miometrio è di norma omogeneamente ipoecogeno rispetto all'endometrio. La RM è utilizzata come metodica di approfondimento nello studio dell'utero in caso l'ecografia sia dubbia[7].



Carcinoma della cervice uterina studiato in RM mediante una sequenza T2 pesata. Acquisizione sul piano sagittale. La RM consente di studiare in dettagli la struttura uterina e l'infiltrazione locale da parte del tumore

Patologia endometriale

Nella valutazione della patologia endometriale bisogna sempre ricercare inspessimenti focali o diffusi, come anche interruzioni della banda ipoecogena fra endometrio e miometrio. Come già detto la presenza di una falda fluida nel lume uterino nella donna in menopausa (spesso dovuta a neoplasie ostruenti il lume) o di immagini ipo/iper-ecogene è sempre da considerare patologica. La presenza di immagini iperecogene nel contesto dell'endometrio è spesso da riferire a raccolte purulente (*piometrio*).

L'endometriosi è rilevabile in ecografia come impianti solidi o cisti complesse localizzate in zone ove non dovrebbe essere presente endometrio. La RM eseguita mediante sequenze che permettono di evidenziare le aree emorragiche è ancora più accurata nello studio di questa patologia, mostrando le lesioni come iperintense sia nelle sequenze T1 pesate sia in quelle T2 pesate (queste ultime specie se eseguite mediante tecniche di soppressione del grasso).

Inspessimenti focali dell'endometrio (> 5 mm) devono far pensare ad una lesione polipoide o ad un carcinoma endometriale. L'ecografia transvaginale presenta un'alta sensibilità nel rilevare tali lesioni, che può essere ulteriormente incrementata iniettando un po' di soluzione fisiologica nel lume uterino. L'interruzione della giunzione endometrio/miometrio (meglio visibile mediante la RM) è indice di malignità[8].

Patologia miometriale

L'adenomiosi è rilevabile all'ecografia come interruzione della giunzione fra endometrio e miometrio, che appare occupata da piccole lesioni ipoecogene e di aspetto eterogeneo (*moth-eaten*); tale segno ecografico può essere associato raramente anche a una leiomatosi diffusa. La RM consente di distinguere i leiomiomi dall'adenomiosi per via del differente segnale RM dei leiomiomi, che appaiono ipointensi sia nelle sequenze T1 pesate che in quelle T2 pesate (al contrario dell'endometriosi, già descritta nel paragrafo precedente). L'adenomiosi inoltre spesso presenta liquido all'interno. La RM è utile anche per stimare le dimensioni e la posizione dei leiomiomi[9].

Patologia cervicale

Le cisti di Naboth si formano per ostruzione delle ghiandole cervicali da varie cause, hanno forma ovalare e dimensioni che variano da pochi millimetri fino a oltre 4 centimetri; dato il loro contenuto mucoso alla RM si presentano isointense nelle sequenze T1 pesate ed iperintense in quelle T2 pesate.

La RM è l'indagine fondamentale nello studio dell'invasività locale del carcinoma della cervice uterina[10].

La gravidanza

Embrione di 13 settimane. Misurazione della distanza vertice-sacro (CRL)

Feto di 20 settimane

Riproduci file multimediale

Ecografia 4D di un feto di 30 settimane

L'ecografia è la metodica fondamentale nello studio dell'embrione e del feto. Di norma vengono eseguiti 3 esami ecografici nel corso di una gravidanza normale (10-12 settimane di gestazione calcolate dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale, 19-21 settimane e 30-34 settimane), ma in caso di crescita fetale anomala è possibile effettuare controlli più ravvicinati. L'esame ecografico permette di valutare la sede di impianto (nel primo trimestre), le dimensioni di embrione e feto, varie caratteristiche dei suoi organi, oltre alla quantità di liquido amniotico e la sede di impianto della placenta). L'ecografia è anche molto utile nella ricerca di eventuali anomalie cromosomiche fetali, sospettabili mediante l'osservazione di malformazioni tipiche (in questo le tecniche ecografiche 3D risultano ancora più affidabili). Le metodiche doppler consentono inoltre lo studio del flusso vascolare placentare e fetale.

Misurazione della *translucenza nucale* in un embrione affetto da Sindrome di Down



Immagine RM di un feto affetto da *pentalogia di Cantrell*. È evidente la posizione anomala dell cuore (asterisco), l'eviscerazione di parte del fegato lungo la linea mediana (freccia) e la piccola cavità toracica (t)

L'ecografia è l'indagine di primo livello nello studio della gravidanza, tuttavia ha come limiti il piccolo campo di vista, lo scarso contrasto, l'attenuazione del fascio ultrasonoro elevata (specie nelle donne obese e nell'oligoidroamnios) ed inoltre non consente di valutare la fossa cranica posteriore oltre la 33ª settimana di gestazione a causa della calcificazione delle ossa del cranio che avviene in questo periodo. Tutti questi limiti possono essere superati ricorrendo alla RM (tenendo presente i precauzionali limiti di dose di campo magnetico già descritti in introduzione), che viene effettuata con sequenze super-veloci per evitare artefatti dovuti ai movimenti del feto: Spin Echo T2 pesate per la morfologia, Gradient Echo T1 pesate per la ricerca di emorragie.

Le principali malformazioni per cui è indicata la RM sono quelle a carico del sistema nervoso centrale (SNC), l'ernia diaframmatica congenita, i ritardi di crescita di singoli organi ed il sequestro polmonare. La ventricolomegalia è la più frequente anomalia osservata a livello del SNC, seguita da: agenesia del corpo calloso, anomalie della fossa cranica posteriore, anomalie della corteccia cerebrale, difetti di sepimentazione

Distacco di placenta evidente in ecografia come falda fluida fra la placenta e la parete uterina

mediana (*oloprosencefalia*), difetti del tubo neurale e dalle emorragie intracraniche[11].



Mola vescicolare vista in Ecografia transvaginale, con il tipico aspetto multicistico a *"tempesta di neve"*

Primo trimestre

La prima ecografia è eseguita per via transvaginale ed ha come obiettivi individuare la posizione dell'embrione/i, del sacco vitellino e misurare la distanza che intercorre fra il vertice e l'osso sacro, tale lunghezza è anche denominata *Crown-Rump Lenght* (CRL) ed è utilizzata per la stima delle settimane di gestazione (SDG) nei primi mesi di vita intrauterina, con un'approssimazione di 5-7 giorni. L'embrione è identificabile in ecografia dopo almeno 6 SDG. La frequenza cardiaca deve essere almeno pari a 100 battiti al minuto (bpm) a 6 SDG e pari a 140-160 bpm a 8 SDG. La prima ecografia è anche utile per valutare lo stato dell'intero apparato riproduttivo, in particolare è necessario monitorare eventuali leiomiomi che in gravidanza possono crescere per via dell'aumentato livello di estrogeni e quindi aumentare il rischio di aborto (specie se sottomucosi) o dare sanguinamenti se vicini alla placenta, anomala presentazione fetale o ostruzione del canale del parto. È inoltre normale osservare il corpo luteo in ovaio e lieve versamento nel cavo del Douglas nei primi 3 mesi[12].

Secondo trimestre

Durante il secondo esame ecografico vengono eseguite misurazioni sul feto e sulla placenta, stimata la quantità di liquido amniotico ed indagata la morfologia e la presentazione fetale. La frequenza cardiaca di norma in questa fase varia fra i 140 ed i 160 bpm. L'eccesso o la riduzione rispetto alla norma della quantità di liquido amniotico è associata ad incremento della morbidità e della mortalità fetale, di norma dovrebbero essere presenti intorno a 250 ml di liquido a 16 SDG, circa un litro a 34 SDG e quindi 800 ml a termine. L'oligoidramnioso (riduzione della quantità di liquido amniotico) è spesso dovuta a rottura precoce delle membrane, insufficienza utero-placentare o renale del feto, mentre il polidroamnioso (eccesso di liquido amniotico) è spesso dovuto a diabete mellito della madre, macrosomia del feto, anemia fetale (con conseguente aumento del flusso placentare), ridotta deglutizione fetale (ad esempio dovuta ad atresie di esofago o duodeno o ad un'ernia diaframmatica).

La placenta si evidenzia come un disco iperecogeno ed omogeneo ed è necessario in questa fase controllarne la localizzazione in ambito uterino ed il cordone ombelicale (studiando ove questo si inserisce ed il numero di vasi sanguigni contenuti).

Per stimare le SDG in questo trimestre si utilizzano il diametro biparietale, la circonferenza cranica ed addominale e le lunghezze di femore ed omero; tuttavia tali misure sono meno accurate di quelle eseguibili nel primo trimestre; tramite queste misure è possibile stimare anche la massa del feto.

Dopo le 18 settimane si valuta inoltre l'anatomia degli organi fetali, viene inoltre ricontrollato l'apparato riproduttivo della donna ed il cordone ombelicale (ove è anche stimato il flusso ematico mediante il metodo doppler)[13].

Terzo trimestre

La terza ecografia ha come obbiettivi valutare la crescita e la presentazione fetale. La stima della massa fetale è fattibile tramite la misurazione della circonferenza addominale (influenzata dalla quantità di grasso in addome e di glicogeno a livello del fegato). La placenta in questa fase si presenta normalmente disomogenea per la presenza di aree lacunari[14].

Patologie embrio-fetali e della gravidanza

La ricerca di patologie embrionarie e fetali in radiologia è effettuabile con metodiche non invasive o invasive (queste ultime prelievo di liquido amniotico ed esame dei villi coriali eseguiti sotto guida dell'imaging). Le metodiche non invasive ecografiche includono la *translucenza nucale*, che valuta lo spessore dell'area ipoecogena normalmente localizzata nella parte posteriore del collo mediante una scansione sagittale eseguita a 11-14 SDG; è da considerare anomalo un valore di questo parametro superiore a 0,3 mm. Anomalie di questo parametro sono correlate a varie aneuploidie (specie la sindrome di Down), anomalie cardiache, ernie diaframmatiche, difetti scheletrici e della parete addominale anche senza alterazioni del cariotipo.

L'ecografia consente inoltre di fare diagnosi di gravidanza extrauterina, anomalie a carico di organi fetali, placenta previa (dopo le 28 SDG) e morte fetale (in tale caso non si osserva il battito cardiaco).

Il distacco di placenta si identifica in ecografia come una falda liquido-ematica o un'area iperecogena dovuta ad un coagulo localizzata fra la placenta e la parete uterina.

Il riscontro di una camera gestazionale vuota deve sempre far sospettare una malattia del trofoblasto. La mola vescicolare può essere completa o parziale (in quest'ultimo caso è presente il prodotto del concepimento associato a porzioni di placenta normale) e si manifesta con utero ingrossato ed il tipico aspetto ecografico *"a tempesta di neve"* dovuto alla presenza di multiple aree cistiche distribuite in maniera omogenea associate a raccolte fluide. Tale lesione spesso infiltra l'utero e può diffondere a livello sistemico. Il coriocarcinoma è spesso presente nei pazienti affetti da mola, ma la sua identificazione è difficoltosa per via delle ridotte dimensioni di queste lesioni[15].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 703-705.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 705-706.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 706-707.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 708.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 707-711.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 711-712.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 713-714.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 714-716.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 716-717.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 717-718.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 718-719.

12. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 720.
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 720-721.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 721.
15. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 721-722.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dell%27apparato_genitale_femminile_e_della_gravidanza&oldid=124309135"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 30 nov 2021 alle 23:40.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia dell'apparato genitale maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dell'apparato genitale maschile** impiega l'ecografia, la tomografia computerizzata e l'imaging a risonanza magnetica. La radiologia interventistica è impiegata nel trattamento locale del carcinoma prostatico (*crioablazione*), dell'idrocele (aspirazione del liquido ed iniezione di sostanze sclerosanti), del varicocele e delle malformazioni artero-venose (tramite metodiche angiografiche di sclerotizzazione ed embolizzazione), oltre che dell'impotenza se causata da deficit del flusso ematico secondari a stenosi (rivascolarizzazione percutanea). La medicina nucleare è impiegata soprattutto nello studio della patologia oncologica tramite la scintigrafia ossea e la tomografia a emissione di positroni (PET) con colina per lo studio del carcinoma della prostata, mentre la PET con FDG è utilizzata nello studio del seminoma e del carcinoma del pene. Mediante un'opportuna metodica scintigrafica è possibile inoltre porre diagnosi di torsione del testicolo.

Indice

Prostata
Vie spermatiche e vescichette seminali
Testicolo
Pene
Note
Bibliografia
Voci correlate

Prostata

La prostata può essere interessata da patologie di tipo flogistico (prostatite), di tipo oncologico (carcinoma della prostata) e dall'iperplasia prostatica benigna (IPB).

L'ecografia prostatica può essere eseguita sia per via sovrapubica sia per via endorettale. L'ecografia sovrapubica va eseguita a vescica piena e permette di misurare i diametri della ghiandola, oltre a rilevare l'eventuale residuo post-minzionale e l'ipertrofia vescicale associata ad un'eventuale ostruzione urinaria. L'approccio transrettale (TRUS) è invece fondamentale per lo studio della porzione periferica della ghiandola, più spesso interessata dal carcinoma, oltre a permettere la visualizzazione della capsula, delle vie spermatiche e del collo vescicale.

In ecografia le aree interessate da flogosi sono spesso evidenti tramite i segni prodotti dalle calcificazioni ivi presenti, mentre nella prostata interessata da IPB è spesso visibile una *pseudocapsula* attorno all'adenoma centrale. Il parenchima sano è ecograficamente omogeneo e di norma i lobi ghiandolari sono simmetrici. Nelle prostatiti (ben indagabili tramite la TRUS) la ghiandola appare ingrandita, con parenchima disomogeneo e a vascolarizzazione incrementata in toto all'ecodoppler. Le formi focali di iperplasia presentano gli stessi segni in una sede singola e mediante la sola ecografia non sono differenziabili dai



Imaging RM multiparametrico. Sono mostrate immagini ottenute mediante una sequenza T2 pesata, una mappa ADC, una mappa ktrans ed infine il risultato di un algoritmo che determina ove è localizzata l'area di carcinoma in ambito prostatico (area iperintensa in basso a destra)

carcinomi, tuttavia nei pazienti a rischio (con PSA >2,5) è possibile eseguire biopsie sotto guida ecografica[1].

La TC non è utilizzabile per lo studio della prostata in quanto tale organo presenta basso contrasto con questa metodica, il suo uso è relegato solo alla stadiazione a distanza delle forme di carcinoma localmente avanzate. La risonanza Magnetica è invece molto utilizzata, con differenti tipologie di sequenze, per lo studio locale della ghiandola. A tal fine sono utilizzabili, oltre alle classiche sequenze T1 e T2 pesate, anche la spettroscopia RM, gli studi della vascolarizzazione eseguiti mediante il mezzo di contrasto e le sequenze al tensore di diffusione. Tale esame è di solito eseguito usando una bobina endorettale (inserita previa pulizia con clisma) e ha una sensibilità superiore al 90% per lesioni grandi almeno 5 mm.

Le immagini RM morfologiche ottenute mediante le sequenze T1 e T2 pesate consentono di discendere molto bene la porzione periferica della ghiandola (di norma iperintensa), la capsula e le vescichette seminali e sono utilizzate per localizzare le lesioni sospette. Di norma le lesioni di carcinoma appaiono con queste sequenze ipointense rispetto al parenchima sano. La RM permette anche lo studio morfologico dei linfonodi locoregionali e della loggia prostatica. Le zone sottoposte a biopsia si presentano invece iperintense per la presenza di emorragia al loro interno e quindi di emosiderina[2].

La spettroscopia RM è di norma utilizzata per valutare l'aggressività delle lesioni sospette. Questo è possibile mediante la misurazione delle quantità di alcuni metaboliti maggiormente rappresentati nelle lesioni tumorali rispetto al parenchima sano, come la colina (utilizzata per la sintesi delle componenti della membrana cellulare e tipica delle cellule a rapida replicazione) e le poliammine. Il citrato (prodotto dal ciclo di Krebs) è invece considerato specifico per il parenchima sano, mentre la creatina è tipicamente incrementata nei tessuti infiammati. Di norma è studiato anche il seguente rapporto:

$$R = \frac{(colina + creatina)}{citrato}$$

Un valore di tale parametro minore di 0,5 è associato al parenchima normale, fra 0,5 e 1 la lesione studiata è probabilmente neoplastica, mentre nel caso il valore sia maggiore di uno la probabilità di neoplasia è elevata[3].

Lo studio perfusionale eseguito mediante RM con mezzo di contrasto permette di caratterizzare le lesioni prostatiche sospette in quanto i carcinomi sono dotati di un apporto ematico maggiore del parenchima sano, effetto della neoangiogenesi indotta dalle cellule tumorali. Dopo iniezione del mdc è possibile ottenere delle curve intensità/tempo del segnale RM disegnando delle Regioni di Interesse (ROI) a livello della zona sospetta (ROI 1), della regione controlaterale (ROI 2) e di un muscolo della pelvi (ROI 3). Da queste curve è possibile ricavare i seguenti parametri:

- *Onset Time* (OT): tempo che impiega il segnale RM ad iniziare il suo incremento a partire dal momento di somministrazione del mezzo di contrasto (espresso in secondi). Tale tempo è ridotto nelle lesioni neoplastiche.
- *Time to Peak* (TTP): tempo che impiega il segnale RM a raggiungere il suo massimo a partire dal momento di somministrazione del mezzo di contrasto (espresso in secondi). Tale tempo è ridotto nelle lesioni neoplastiche.

- *Peak Enhancement* (PE): concentrazione massima raggiunta dal mezzo di contrasto nella zona di interesse (espressa in millimoli/Kg). Tale parametro appare incrementato nelle lesioni neoplastiche.
- *Wash Out*: tempo di eliminazione del mezzo di contrasto a partire dal picco (espresso in secondi); appare rapido nelle lesioni neoplastiche[4].

Le sequenze al tensore di diffusione consentono di creare delle mappe del *coefficiente di diffusione* (ADC) che mostrano quanto la diffusione delle molecole di acqua nei tessuti sia omogenea dal punto di vista direzionale. I tessuti neoplastici sono di solito *isotropi* in quanto costituiti da un gran numero di cellule che racchiudono le molecole di acqua limitandone la libertà di movimento in egual modo in tutte le direzioni, cosa che invece non avviene nel parenchima sano ove le molecole di acqua tendono ad avere una diffusione in una direzione precisa per via della microstruttura ordinata del tessuto sano (che è quindi *anisotropo*). Tali sequenze consentono sia di creare mappe del coefficiente ADC sia di visualizzare voxel per voxel un vettore che indica la direzione di movimento preferenziale delle molecole d'acqua localmente (quest'ultima metodica è detta *trattografia* o *fiber tracking*).

L'imaging RM *multiparametrico* qui descritto è utilizzato per identificare i siti da sottoporre a biopsia nei pazienti a rischio (PSA >2,5 ng/ml) e per ristadiare i pazienti dopo le terapie (specie nei casi di recidiva biochimica)[5].

Vie spermatiche e vescichette seminali

La patologia neoplastica primitiva a carico di queste strutture è rara, tuttavia è molto frequente il loro coinvolgimento da parte del carcinoma prostatico e della prostatite, ben valutabile sia con la TC sia con l'RM. Questi esami consentono di studiare anche il decorso delle vie spermatiche; ma non danno informazioni sulla loro pervietà, che può però essere indagata iniettando al loro interno del mezzo di contrasto per via transcutanea ed eseguendo dei radiogrammi in proiezione antero-posteriore ed obliqua (*deferento-vescicolografia* e *deferento-epididimografia*). Queste ultime metodiche sono utilizzate nello studio dell'infertilità maschile[6].

Testicolo



Criptorchidismo. Il testicolo ectopico è localizzato sotto il grasso sottocutaneo


Idrocele visto in ecografia

Lo scroto è valutabile in prima battuta mediante l'ecografia ed in seconda battuta mediante la RM.


Orchiepididimite vista mediante ecografia doppler. L'organo appare diffusamente ipoecogeno ed ingrandito. La vascolarizzazione risulta incrementata al color-doppler

In ecografia il testicolo normale si presenta di forma ovale ed omogeneo, con evidenza di una sottile stria iperecogena a livello dell'ilo e circondato da una parete spessa circa 6 mm. L'epididimo si presenta di norma come una stria poco iperecogena rispetto al testicolo localizzata in sede postero-laterale rispetto a questo. Nel criptorchidismo è agevole non rilevare il testicolo in sede mediante l'ecografia, mentre la RM può essere utile per esplorare le regioni corporee ove potrebbe essere localizzato l'organo non esplorabili mediante gli ultrasuoni. Nell'adolescente il testicolo ritenuto ha di solito aspetto quasi normale (solo



Neoplasia testicolare. La lesione appare solida, ipoecogena, disomogenea ed a margini irregolari

dimensioni di poco ridotte), mentre nell'adulto spesso appare ipotrofico e/o atrofico e può essere sede di neoplasie (per tale ragioni l'organo affetto va sottoposto a regolare follow-up)[7].



Varicocele visto all'ecografia doppler

Nelle orchiti l'ecografia è l'indagine diagnostica radiologica di primo livello, che evidenzia spesso ipoecogenicità e dimensioni incrementate del testicolo affetto. Nel caso frequente di interessamento anche dell'epididimo (orchiepididimite) si può osservare anche ingrandimento di quest'ultimo. È evidente inoltre aumentata vascolarizzazione al color-doppler ed inspessimento della parete intorno all'organo a cui spesso si associa idrocele[8].

L'idrocele in ecografia è ben evidente come un accumulo di liquido fra i due foglietti della tunica vaginale, che nelle forme croniche appaiono inspessiti[8].

Il varicocele è ben diagnosticabile mediante il color-doppler e l'ecografia morfologica, che conferma la diagnosi se le vene spermatiche in clinostatismo presentano diametro maggiore di 3 mm. Sono anche da considerare il numero di vene ectasiche rinvenute (anteriori e/o posteriori), il tipo di reflusso (renale-spermatico, ileo-spermatico o misto), l'aspetto della gonade e le modificazioni indotte dalla manovra di Valsalva. Tale metodica è utilizzabile anche in follow-up e nella ristadiazione post-operatoria. Per stadiare il varicocele mediante il color-doppler si utilizza la classificazione di Sarteschi:

- Grado 1: assenza di varici
- Grado 2: piccola dilatazione delle vene del plesso posteriore e limitata alla porzione superiore del testicolo
- Grado 3: la dilatazione è assente in clinostatismo, ma compare in ortostatismo o durante l'esecuzione della manovra di Valsalva
- Grado 4: la dilatazione è presente il clinostatismo ed aumenta in ortostatismo o durante la manovra di Valsalva
- Grado 5: dilatazione presente in clinostatismo che non si modifica in ortostatismo[9].

La torsione del testicolo necessita di una diagnosi rapida per salvare l'organo colpito (entro 6 ore è necessario intervenire) che viene di solito effettuata mediante l'ecografia. Ingrandimento dell'organo si evidenzia solo tardivamente ed è frequente il riscontro di idrocele. Le metodiche color-doppler consentono di ricavare anche il tempo trascorso dall'inizio dell'evento: inizialmente si osserva infatti solo assenza di vascolarizzazione a livello del testicolo colpito, a cui segue evidenza di ecogenicità disomogenea per la presenza di fenomeni necrotici e colliquativi[9].

Le neoplasie testicolari possono essere differenziate da quella extratesticolari e dalle raccolte fluide utilizzando l'ecografia. Un nodo solido rilevato in sede intratesticolare deve sempre far sospettare una neoplasia a tale livello. In caso di neoplasia testicolare l'ecografia consente di stadiare l'estensione locale della malattia. I tumori testicolari appaiono di solito, ipoecogeni, disomogenei ed a margini irregolari, indipendentemente dall'istologia. L'ematoma testicolare ha un aspetto molto simile alle neoplasie, pertanto una corretta anamnesi in questi casi è indispensabile. La stadiazione linfonodale ed a distanza può essere condotta usando la TC, mentre la PET con fluorodesossiglucosio (FDG) può essere utilizzata nella ristadiazione dopo le terapie per il solo seminoma. La RM con mezzo di contrasto e ottenuta mediante

bobine dedicate rappresenta un'indagine di secondo livello per lo studio locale delle neoplasie testicolari, riservato ai casi dubbi all'ecografia, mentre è anch'essa una buona alternativa per lo studio dei linfonodi peritoneali[10].

L'ecografia è anche un presidio indispensabile nella patologia traumatica testicolare, ove consente di evidenziare ematomi, fratture parenchimali ed edema[11].

Pene



Calcificazione nel contesto di un corpo cavernoso rilevata in un paziente affetto da induratio penis plastica



Insufficienza cavernosa rilevata mediante ecografia doppler in un paziente affetto da disfunzione erettile

Le anomalie congenite a livello dell'uretra (stenosi, valvole, ipospadia) possono essere facilmente diagnosticate tramite l'uretrografia retrograda e la cistouretrografia minzionale; la prima di queste due metodiche studia meglio l'uretra anteriore mentre la seconda la porzione posteriore e sono effettuate somministrando del mezzo di contrasto per via transuretrale ed eseguendo dei radiogrammi specifici. Ecografia, TC ed RM sono utilizzate per studiare i pazienti dopo le terapie, nelle patologie congenite, tumorali e nella diagnosi dei diverticoli uretrali. La RM in particolare consente di differenziare le varie componenti tissutali dell'uretra. L'indagine dell'uretra anteriore è spesso condotta dopo somministrazione di prostaglandine, in modo da distendere i corpi cavernosi[12].

Nella induratio penis plastica l'ecografia consente di rilevare i noduli fibrosi e le placche calcifiche tipiche della patologia[12].

Nel carcinoma del pene ecografia ed RM sono utilizzate nello studio dell'invasività locale, mentre la TC e la PET con FDG sono utili per lo studio delle metastasi a distanza (frequenti a livello dei linfonodi inguinali)[13].

L'impotenza causata da problematiche vascolari (50% dei casi) viene studiata dapprima con l'ecografia doppler eseguita a riposo e dopo iniezione di prostaglandine e successivamente mediante arteriografia e cavernosografia (iniezione del mezzo di contrasto per via percutanea direttamente nei corpi cavernosi) o se possibile mediante Angio TC o Angio RM[14].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 687-689.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 689-690.
3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 690-691.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 691-692.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 692-693.
6. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 693-694.
7. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 695-696.

8. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 696.
9. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 696-697.
10. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 697.
11. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 687-688.
12. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 698.
13. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 698-699.
14. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 700.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Voci correlate

- Radiologia dell'addome

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_dell%27apparato_genitale_maschile&oldid=126482744"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 mar 2022 alle 09:25.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radiologia del peritoneo e retroperitoneo

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **radiologia dell'addome** utilizza la radiografia, l'ecografia, la tomografia computerizzata (TC) e l'imaging a risonanza magnetica (RM) per studiare l'addome ed i visceri contenuti al suo interno.

In questa voce si parlerà prevalentemente della patologia a carico della cavità addominale (peritoneo e retroperitoneo).

Metastasi peritoneali da carcinoma gastrico rilevate mediante TC come aree variamente iperdense rispetto al grasso omentale. Confronto con immagini ottenute mediante laparoscopia

Indice

Peritoneo
Retroperitoneo
Note
Bibliografia
Altri progetti

Peritoneo

Le tecniche più accurate per studiare il peritoneo sono la TC e la RM. La radiologia tradizionale (radiografia dell'addome) ha l'importante ruolo di rilevare l'eventuale presenza di aria libera nella cavità addominale (*pneumoperitoneo*, sempre localizzato nelle porzioni meno declivi), segno importante secondario alla perforazione di un viscere cavo. L'ecografia, mediate sonde che lavorano a 3,5 MHz è invece l'esame di primo livello ner rilevare l'eventuale presenza di falde liquide libere in addome, che di solito si localizzano a livello delle porzioni più declivi (tasca di Morrison, in sede periepatica e perisplenica e lungo il cavo del Douglas); utilizzando sonde da 7,5 MHz è possibile anche la visualizzazione dei foglietti peritoneali per la ricerca di eventuali impianti neoplastici.

Mediante la TC è possibile osservare in modo dettagliato e con un ottimo contrasto gli spazi ed i recessi peritoneali se sono pieni di liquido, la cui presenza è spesso da riferire ad una patologia (in condizioni normali questi spazi sono cavità virtuali e quindi non sono visibili alla TC). Utilizzando il mezzo di contrasto iniettato per via endovenosa è possibile mettere in risalto gli impianti neoplastici (*carcinosi peritoneale*), mentre dando da bere del mezzo di contrasto orosolubile (polietilenglicole) è possibile migliorare la visualizzazione distendendo le anse intestinali.

La RM eseguita eseguita con sequenze ultraveloci pesate in T2 mette anch'essa in risalto le falde liquide a livello peritoneale.

Le principali patologie a livello peritoneale sono di eziologia infiammatoria (peritonite), si manifestano radiologicamente come accumulo di liquido e possono avere varia eziologia (infettiva, traumatica, neoplastica, ecc...)

L'emoperitoneo (accumulo di sangue nella cavità peritoneale) è invece dovuto a rotture di vasi sanguigni o di organi molto vascolarizzati come la milza ed il fegato, come pure di angiomi o lesioni da epatocarcinoma. Anche la pancreatite acuta può evolvere in emoperitoneo. Tale quadro clinico si presenta all'ecografia in modo disomogeneo, mentre alla TC il sangue appare dapprima iperdenso per poi diventare col tempo ipodenso.

In seguito a peritonite è possibile anche la formazione di raccolte purulente (ascessi). Gli ascessi sono visibili sia in ecografia che in TC e sono caratterizzati dalla presenza di bolle d'aria o di un livello idro-aereo, a cui si associa in ecografia disomogeneità del liquido interno per la presenza di materiale corpuscolato. Un ascesso maturo è caratterizzato da una parete spessa. Il mezzo di contrasto somministrato per via orale è utile per distinguere gli ascessi dalle anse intestinali alla TC.

La carcinosi peritoneale può essere dovuta a primitività originanti da tutti gli organi addominali (più spesso stomaco ed ovaio) ed è visibile come raccolte fluide associate ad impianti peritoneali ben concentranti il mezzo di contrasto e più spesso localizzati a livello del cavo del Douglas, della porzione inferiore del mesentere, dal mesosigma e dalla doccia parieto-colica destra. Un interessamento massivo è definito *omental cake*. I tumori primitivi del peritoneo sono rari e rappresentati essenzialmente dal mesotelioma, tipico delle persone esposte all'asbesto.

Lo pseudomixoma del peritoneo è invece dovuto all'accumulo di muco ed è tipicamente causato da neoplasie mucinose dell'ovaio o da rotture di un mucocele dell'appendice vermiforme.

Il mesentere può essere inoltre sede di linfoadenopatie di varia eziologia, così come di neoplasie primitive (lipoma, teratoma, carcinoide, liposarcoma). Le linfodenopatie da linfoma non Hodgkin spesso avvolgono i vasi mesenterici (segno del Sandwich), mentre i carcinoidi sono spesso associati ad una reazione desmoplastica che appare come strie che tendono l'ansa su cui la lesione aderisce. In alcuni casi la lesione da carcinoide può contenere una calcificazione

La TC è inoltre molto utile nella ricerca dell'aria libera dovuta a perforazioni coperte, allo stesso modo TC ed RM sono utili per cercare raccolte liquide profonde che possono sfuggire all'ecografia.

È possibile inoltre rilevare raccolte di bile o urina in caso di perforazioni a livello dell'albero biliare o dell'apparato urinario, tuttavia non è possibile distinguere con le metodiche radiologiche il tipo di liquido[1].

Retroperitoneo

Le raccolte ascessuali in retroperitoneo possono essere sospettate all'esame radiografico diretto dell'addome quando non si osserva più l'ombra dei muscoli ileo-psoas o dei reni (se è presente perinefrite). Se il processo infiammatorio coinvologe anche le vertebre è possibile osservare lesioni osteolitiche oppure degli addensamenti "a bisacca" o "a goccia". Ecografia e soprattutto TC ed RM sono invece dirimenti[2].

Nella fibrosi retroperitoneale la placca fibrosa coinvolge l'aorta fra le origini delle arterie renali e delle iliache comuni. In ecografia è spesso visibile dilatazione delle vie escretrici renali ed a volte il manicotto di tessuto fibroso causale; tale tessuto è sempre ben visibile in TC ed RM. Alla RM la fibrosi risulta ipointensa nelle sequenze T1 pesate e a intensità mista in quelle T2 pesate (iperintensa in zone affette da edema o in stadio iniziale). All'Uro-TC gli ureteri di solito presentano il tipico restringimento a livello del loro terzo inferiore ("a punta di matita")[3].

Nelle emorragie retroperitoneali (spesso post traumatiche) TC ed RM consentono di evidenziare sia l'estensione del processo sia la sua origine. All'RM il segnale nei primi giorni è identico a quello del liquido, ma dopo 2-4 giorni si evidenzia iperintensità nelle sequenze T1 pesate in seguito al metabolismo

dell'emoglobina che viene degradata a metamoglobina. L'esame radiografico diretto in questi casi può evidenziare scomparsa o traslocazione delle ombre degli organi adiacenti, mentre ecografia e TC sono anche utili per pianificare un drenaggio percutaneo[4].

Le neoplasie retroperitoneali primitive o l'invasione in retroperitoneo da parte di primitività da organi adiacenti sono sospettabili all'esame diretto dell'addome se questo evidenzia calcificazioni o opacità di densità parenchimatosa, come anche dislocazione degli organi adiacenti. L'ecografia in tali casi non è sempre di facile esecuzione per via dell'aria contenuta nelle anse intestinali, motivo per cui si ricorre a TC (utile anche per pianificare una biopsia) ed RM (che consente di studiare molto bene l'invasione locale e caratterizzare il tessuto tumorale)[5].

Il ganglioneurinoma si evidenzia come una massa lobulata, ben definita e che circonda i grossi vasi addominali. Dopo somministrazione del mezzo di contrasto endovena la lesione appare ipodensa alla TC rispetto ai tessuti intorno, mentre in RM basale si osserva iperintensità sia sulle sequenze T1 che T2 pesate (a seconda della prevalenza di componente mucosa). Dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico il potenziamento è omogeneo e ritardato a causa del materiale mixoide contenuto che ne ritarda lo stravaso[6].

Il ganglioneuroblastoma presenta invece aspetto più vario, a volte è capsulato e spesso contiene calcificazioni granulari. Il neuroblastoma invece non è capsulato, spesso infiltra gli organi adiacenti e contiene calcificazioni grossolane, mentre in RM presenta segnale variabile sia nelle sequenze T1 pesate che in quelle T2 pesate; dopo somministrazione di mezzo di contrasto mostra intenso enhancement[6].

Il paraganglioma alla TC mostra un'area necrotico/emorragica al centro con spesso associato un livello fluido; dopo somministrazione di mezzo di contrasto presenta intenso enhancement. Alla RM appare iperintenso ed omogeneo nelle sequenze T2 pesate. Questo tumore può raramente rompersi e dare emorragie[7].

I tumori delle guaine nervose alla TC sono evidenti come masse ben circoscritte, ovalari e con cisti e calcificazioni puntiforme o curvilinee nel loro contesto disposte lungo il bordo. Dopo somministrazione del mezzo di contrasto appaiono omogenei ad eccezione delle zone cistiche. In RM appaiono ipointensi nelle sequenze T1 pesate e disomogenei in quelle T2 pesate; dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico sono più evidenti le aree cistiche. Le forme benigne non sono radiologicamente distinguibili dalle maligne[7].

Il neurofibroma si presenta poco iperdenso alla TC con mezzo di contrasto per via dell'alto contenuto di lipidi, mentre in RM la porzione periferica è iperintensa nelle sequenze T1 pesata ed ipointensa in quelle T2 pesate (in quanto al centro è presente tessuto nervoso ed in periferia tessuto mixoide)[7].

Il liposarcoma appare spesso alla TC come una massa disomogenea di densità adiposa con aree necrotiche e calcifiche. Nelle forme più maligne con maggior componente mesenchimale la lesione è più iperdensa ed è difficilmente distinguibile da altre forme di sarcoma. Il segnale RM è tipico del grasso ed incrementa nettamente dopo somministrazione di mezzo di contrasto[8].

I linfomi a localizzazione retroperitoneale si presentano come masse che avvolgono i grossi vasi. La metodica più adatta per stadiarli è la tomografia a emissione di positroni, eseguita nei reparti di medicina nucleare[9].

Note

1. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 526-532.
2. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 638-639.

3. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 640.
4. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 640-642.
5. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 642-643.
6. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 643.
7. *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 644.
8. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 644-645.
9. ^ *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, p. 645-646.

Bibliografia

- Roberto Passariello e Giovanni Simonetti, *Compendio di radiologia*, Idelson-Gnocchi, 2010, ISBN 9788879475150.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **Radiologia dell'addome (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:X-rays_of_the_abdomen?uselang=it)**

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_del_peritoneo_e_retroperitoneo&oldid=126482596"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 28 mar 2022 alle 09:09.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

DISCIPLINE CORRELATE

Radiologia interventistica

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

> **Questa voce o sezione sull'argomento professioni sanitarie non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti**.

La **radiologia interventistica** (RI) è una branca della radiologia medica che comprende tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuate mediante la guida e il controllo delle metodiche radiologiche, quali fluoroscopia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, ecografia. L'obiettivo della radiologia interventistica è quello di ottenere risultati e mortalità uguali o migliori rispetto ai corrispondenti interventi chirurgici. La radiologia interventistica può essere suddivisa in vascolare ed extra-vascolare. La cosiddetta "chirurgia endovascolare" coincide sostanzialmente con la radiologia interventistica vascolare. La radiologia interventistica è stata anche definita radio-chirurgia o chirurgia radio-guidata.

La radiologia interventistica oggi è una disciplina caratterizzata da un'attenzione clinica sempre maggiore nei confronti dei pazienti; il medico radiologo interventista è un medico specialista capace dunque di garantire non solo procedure mini-invasive, ma anche di seguire il paziente nel periodo pre-operatorio e nel follow-up post-operatorio attraverso ambulatori dedicati.

Indice

Storia

Tecnica, indicazioni, risultati e limiti

Radiologia interventistica vascolare

Radiologia interventistica extra-vascolare

Altri progetti

Storia

La radiologia interventistica ha subito e subisce tuttora un travolgente sviluppo e una rapida evoluzione grazie soprattutto alla tecnologia e alla disponibilità di materiali sempre più sofisticati e dedicati.

Alla base delle procedure di radiologia interventistica in ambito vascolare vi è una tecnica radiologica chiamata angiografia. Per eseguire un'angiografia attualmente l'accesso più frequente risulta essere la puntura dell'arteria femorale, secondo la tecnica di Seldinger da questi ideata negli anni '50. Storicamente vanno ricordati anche Melvin Judkins e Frank Mason Sones per le innovazioni negli approcci percutanei e lo sviluppo delle tecniche coronarografiche.

Nel 1964, Charles Dotter per la prima volta nella storia della radiologia interventistica trattò in modo fortuito una stenosi dell'arteria iliaca semplicemente passandovi dei cateteri progressivamente più grandi per eseguire un'angiografia femorale. La paziente si rese conto che, a distanza di un giorno, la *claudicatio*

intermittens dell'arto inferiore era stata risolta e che poteva camminare senza alcun impedimento, con guarigione dopo alcune settimane.

In Italia, la prima procedura di embolizzazione venne eseguita nel 1972, quando a Roma venne trattata per la prima volta un'emorragia addominale in un carabiniere colpito in una sparatoria. Attraverso cateteri angiografici venne infusa pitressina ed embolizzata con coagulo autologo l'arteria sanguinante.

Tecnica, indicazioni, risultati e limiti

La radiologia interventistica si è affiancata alle tecniche di chirurgia tradizionale e spesse volte, soprattutto negli ultimi anni, le ha sostituite grazie ai peculiari vantaggi che la contraddistinguono:

- nel 90% dei casi viene eseguita in *anestesia locale*;
- richiede tempi di ricovero estremamente brevi e in alcuni casi può essere effettuata anche in regime ambulatoriale, abbattendo i costi di degenza;
- le tecniche di radiologia interventistica sono considerate *mini-invasive* in quanto in più del 90% dei casi vengono eseguite per via percutanea, senza necessità quindi di tomia, ovvero di *esposizione* chirurgica dell'organo da trattare;
- i rischi della metodica, rispetto alla chirurgia, sono decisamente inferiori e, in buona parte dei casi, trascurabili;
- in alcuni casi può essere ripetuto in caso di recidiva della patologia (ad es. bilioplastica, ureteroplastica, angioplastica);
- non impedisce l'eventuale correzione chirurgica.

Gli svantaggi della RI sono sostanzialmente riconducibili a:

- necessità frequente dell'uso di metodiche a raggi X per la guida e il controllo delle procedure, con esposizione al paziente e in parte all'operatore;
- uso di mezzo di contrasto intra-arterioso o intra-venoso;
- operatore-dipendenza: il buon esito della procedura è legato all'esperienza dell'operatore;

Radiologia interventistica vascolare



Ad oggi il 75% delle patologie vascolari può essere trattato tramite procedure interventistiche vascolari. Il medico radiologo interventista, in collaborazione con gli altri specialisti, svolge dunque un ruolo di primo piano nel trattamento della patologia vascolare.

Gli interventi comprendono l'angioplastica, l'embolizzazione, la fibrinolisi ed il posizionamento di filtri cavali e stent, oltre alla rimozione di corpi estranei intravascolari.

Radiologia interventistica extra-vascolare

La radiologia interventistica extra-vascolare comprende interventi di chemioembolizzazione, di alcolizzazione e di termoablazione, le biopsie, i drenaggi percutanei e la vertebroplastica percutanea.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **radiologia interventistica (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interventional_radiology?uselang=it)**

Controllo di autorità	GND (DE) 4242046-5 (https://d-nb.info/gnd/4242046-5)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiologia_interventistica&oldid=125282869"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 25 gen 2022 alle 17:08.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Neuroradiologia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **neuroradiologia** è una specialità della radiologia che si occupa dello studio diagnostico, terapeutico di anomalie sulla fisiologia del sistema nervoso e strutture annesse (cranio, colonna vertebrale) e della relativa ricerca scientifica. Tali interventi si realizzano attraverso l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, ultrasuoni e campi magnetici; in particolare, la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica rivestono un ruolo di prima istanza.

Indice

Neuroradiologia diagnostica
- Risonanza magnetica
- Tomografia computerizzata
- Angiografia
- Radiografia convenzionale
- Ecografia

Neuroradiologia interventistica

Storia

Istituzionalità

Voci correlate

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Neuroradiologia diagnostica

Varie tecniche di imaging, alternative o complementari, sono utilizzate per la ricerca e la conferma diagnostica o per i bilanci pre- e post-operatori. Le principali affezioni indagate dalla neuroradiologia diagnostica sono:

- Malformazioni, congenite o secondarie, del distretto cranio-cerebrale e vertebro-midollare
- Affezioni vascolari (neuroradiologia dell'ischemia, neuroradiologia vascolare, neuroradiologia delle emorragie)
- Patologie infiammatorie o infettive
- Patologie degenerative
- Segni organici di sindromi neurologiche
- Segni organici di patologie neuroendocrine

- Alterazioni encefaliche dell'anziano
- Trauma cranico o del rachide
- Danno da compressione estrinseca (es ernia discale)
- Lesioni occupanti spazio (neuroradiologia dei tumori primitivi cerebrali, neuroradiologia delle metastasi, neuroradiologia delle sequele dei trattamenti antitumorali, neuroradiologia della regione sellare)
- Malattie tossiche e metaboliche

La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica sono le indagini di prima istanza, risolutive nella maggior parte dei casi. Altre indagini, di uso più limitato, sono l'angiografia, la radiografia convenzionale e l'ecografia.

Anche la medicina nucleare può essere utilizzata nello studio del sistema nervoso sia in ambito clinico che di ricerca, in particolare tramite la PET cerebrale, il neuroimaging del sistema dopaminergico e la scintigrafia miocardica con metaiodobenzilguanidina.

Risonanza magnetica

L'imaging di risonanza magnetica (RM) è la tecnica più diffusamente impiegata in neuroradiologia. Attraverso l'eccitazione dei nuclei atomici sottoposti a intensi campi magnetici è possibile ottenere immagini dettagliate dell'anatomia del sistema nervoso centrale. A seconda del treno di impulsi di radiofrequenza (la "sequenza") somministrato è possibile ottenere un differente segnale di ritorno e quindi differenti informazioni anatomiche o funzionali della regione studiata.
Ha un'alta risoluzione di contrasto intrinseca, elevata sensibilità nella definizione spaziale e multiplanarietà, caratteristiche che permettono di mostrare strutture (meningi, nuclei della base, nervi cranici) e dettagli anatomici non altrimenti visualizzabili mediante le altre metodiche di imaging: è in grado di fornire immagini molto dettagliate del parenchima e delle strutture ventricolari, consentendo una ricostruzione tridimensionale molto vicine all'anatomia effettiva, utili per gli interventi neurochirurgici. Permette inoltre studi funzionali, sia della componente motoria che sensitiva, tramite la tecnica integrata *fMRI* (dall'inglese "functional magnetic resonance imaging"), la quale studia l'attivazione delle aree cerebrali tramite l'ossigenazione o il moto termico generato dai fluidi. Infine, una particolare tecnica, l'angio-RM permette di eseguire studi angiografici con o senza l'utilizzo del mezzo di contrasto.
Gli impieghi della RM in neuroradiologia sono piuttosto ampi, ma trova particolare efficacia nello studio della patologia neoplastica, demielinizzante, infiammatoria/infettiva, degenerativa e cerebrovascolare. La scarsa sensibilità al tessuto osseo fa sì che non si presentino artefatti ossei ma abbia un'efficacia limitatissima nelle affezioni delle che colpiscono tale tessuto. Rappresentano controindicazioni assolute per l'applicazione di tale tecnica:

- Presenza di metalli non RM compatibili (frammenti post-traumatici, clip o protesi, ecc.);
- Protesi di cristallino impiantata nei primi anni '80[1]

Anche a livello midollare risulta un esame fondamentale, in grado di distinguere il midollo spinale, i suoi involucri meningei e gli spazi liquorali. V'è un maggior ricorso all'uso del mezzo di contrasto e risulta fondamentale nelòla valutazione delle malformazioni vertebro-midollari o vascolari, delle compressioni midollari o radicolari secondarie a processi espansivi o erniazioni discali.

Tomografia computerizzata

La tomografia computerizzata (TC) è una tecnica fondamentale nell'imaging neurologico, impiegata prevalentemente nello studio in urgenza: ciò perché, pur avendo una definizione minore rispetto alla risonanza magnetica, associa ad un'efficacia elevata rapidità di esecuzione, una diffusione più capillare e costi più contenuti. È inoltre più efficace della RM nel rilevare l'emorragia in fase acuta e per lo studio delle alterazioni ossee (quest'ultimo esclusivo appannaggio della TC). L'impiego in elezione è molto limitato, principalmente alle situazioni in cui non sia possibile ricorrere alla RM: ricerca di calcificazioni e studio delle strutture ossee. È in grado di differenziare la sostanza grigia, quella bianca e gli spazi liquorali ed alla valutazione di segni patologici (edemi, necrosi, ecc.). Anch'essa permette lo studio angiografio (angio-TC) e la ricostruzione tridimensionale, abbastanza fedele, del distretto cranio-rachideo; questa, però, trova impiego soprattutto nella chirurgia maxillo-facciale.
A livello colonnare trova impiego spesso in associazione alla risonanza magnetica, non cvonsentendo, se non con utilizzo di mezzo di contrasto (*Mielo-TC*), la dimostrazione del midollo e dell'involucro meningeo. Trova utilizzo principalmente nei traumatismi acuti e nell'individuazione di alterazioni morfologiche, primarie o secondarie, del canale midollare.

Angiografia

L'angiografia a sottrazione digitale (DSA) per cateterismo è una tecnica di seconda istanza per lo studio diagnostico delle strutture vascolari. Per via percutanea transfemorale si fanno navigare dei cateteri (piccoli tubicini) all'interno del sistema vascolare arterioso o venoso fino a raggiungere il vaso di interesse; qui si somministrano piccole dosi di mezzo di contrasto iodato e si acquisiscono radiografie seriate per lo studio dinamico del flusso. La scelta delle arterie da iniettare (carotide interna, carotide esterna, arteria vertebrale) dipende dal lato e dalla sede della lesione.
Sebbene sia ormai diffuso l'uso di metodiche meno invasive (angio-TC e angio-RM), l'angiografia rimane talvolta insostituibile per le maggiori informazioni dinamiche e funzionali che è in grado di fornire (circoli di compenso, tempi di transito, iniezione vascolare selettiva); ha impiego soprattutto nel bilancio preoperatorio tumorale e malformativo e nella valutazione dell'attacco ischemico transitorio, trombosi venosa ed emorragia intraparenchimale. Trova un impiego maggiore nella neuroradiologia interventistica.

Radiografia convenzionale

Le indicazioni allo studio con gli strumenti della radiologia convenzionale a raggi X sono ormai limitati a pochi esami. Essa infatti non fornisce immagini dirette delle strutture encefaliche ma solo informazioni "indirette", legate ad alterazioni ossee o calcificazioni. Mantiene una sua importanza per la semplicità, rapidità, economicità e facile reperibilità; una conoscenza basilare, inoltre dei segni neuroradiologici può avere importanza nella rilevazione casuale di tali elementi durante indagini effettuate per altri motivi.
Per quanto riguarda il cranio, è possibile effettuare tre *proiezioni di base* ("sagittale occipito-nasale", "laterale" e "assiale submento-vertice"), le quali compongono l'esame standard, due *proiezioni complementari* ("semiassiale antero-posteriore", "sagittale occipito-buccale") e varie *proiezioni speciali*, rivolte ad evidenziari particolari strutture (es. canale ottico, rocca petrosa, ecc.). L'analisi della forma, e della struttura ossea, delle suture e dei solchi vascolari potranno evidenziare anomalie secondarie o producenti sintomatologia neurologica.
La radiografia trova un maggior, seppur modesto, impiego in presenza di sintomatologia neurologica a livello del rachide. Può essere effettuata tramite quattro proiezioni ("antero-posteriore", "latero-laterale", "obliqua destra" e "obliqua sinistra"), sotto carico (stazione eretta) o senza carico (decubito supino) e, ancora, in studio dinamico ("iperflessione", "iperestensione"). Permette di discriminare lesioni scheletriche, discali o neuro-vascolari. Con la tecnica definita *mielografia opaca*, che sfrutta il passaggio di mezzo di contrasto iodato, tramite puntura lobare, nel canale midollare, è possibile visualizzare il decorso del midollo spinale.

Ecografia

L'ecografia, in ambito neurologico, ha un ruolo marginale rispetto ad altre metodiche. La tecnica ecotomografica ha utilizzo esclusivo in ambito pediatrico, ove la sottigliezza della teca cranica e la presenza delle fontanelle permette una discreta valutazione ultrasonografica delle strutture encefaliche. Nel bambino è possibile valutare lesioni intracerebrali, emorragie e ectasie del sistema ventricolare; ha un utilizzo, inoltre, nella neuroradiologia interventistica.
La tecnica doppler può essere invece utilizzata per la valutazione dei vasi del collo e del circolo intracranico, sia arteriosi che venosi, anche nell'adulto. Pur essendo riportando immagini meno definite, ha il vantaggio di consentire il monitoraggio in tempo reale del circolo intracranico.

Neuroradiologia interventistica

Mediante le medesime metodiche di imaging, e in particolar modo con l'utilizzo dell'angiografia è possibile effettuare delle procedure *percutanee*, endovascolari ed extravascolari, offrendo un'alternativa meno invasiva rispetto alla neurochirurgia convenzionale o fornendo una terapia per alcune patologie non aggredibili chirurgicamente, oppure ancora essendo d'ausilio alla neurochirurgia o alla radioterapia. Una delle principali metodiche utilizzate in neuroradiologia interventistica per la chiusura degli aneurismi cerebrali per via endovascolare, prevede il posizionamento, mediante l'utilizzo di cateteri con tecnica Seldinger, di spirali in platino distaccabili di Guglielmi.[2][3]
L'ecotomografia è utilizzata come guida intraoperatoria nelle manovre di posizionamento degli shunt ventricolari nei bambini con idrocefalia e ne permette il follow up.

Storia

Le potenzialità della radiologia applicate alla neurologia vennero intuite fin dall'inizio: già nel 1896, pochi mesi dopo la scoperta dei raggi x, il neurologo russo Vladimir Bechterev, durante una presentazione alla "Clinica delle patologie del sistema nervoso centrale" dell'Accademia Medica Militare Kirov di San Pietroburgo, intuì il possibile utilizzo della radiologia nello studio delle alterazioni scheletriche del cranio e della colonna vertebrale nella diagnosi delle patologie neurologiche[4]. Ma fu nel 1905 che il neuropsichiatra austroungarico Arthur Schüller, considerato il padre della neuroradiologia pubblicò il libro "*La base cranica sul radiogramma*"[5]. In italia, il primo testo di neuroradiologia fu "*lezioni di craniologia Roetgen*" del medico torinese Mario Bertolotti, considerato il fondatore della disciplina in Italia[6]. Il primo reparto di neuroradiologia italiano risale al 1964, istituito all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli mentre, la prima riforma ospedaliera che permette l'inserimento della neuroradiologia nell'elenco delle discipline ospedaliere, per le quali si prevede la possibilità dell'istituzione di reparti indipendenti, risale al 1969[7]

Istituzionalità

La neuroradiologia si è storicamente caratterizzata per avere sentito, rispetto alla radiologia classica, l'esigenza di un approccio dedicato al sistema nervoso, con una visione clinica delle patologie che lo interessano e del paziente da esse affetto, senza disconoscere per questo la fondamentale importanza di una conoscenza specialistica sia delle metodiche di imaging che delle cognizioni anatomiche-morfologiche-patologiche tipicamente appannaggio della radiologia classica.Il termine neuroradiologia è diventato pertanto ormai improprio in quanto concettualmente restrittivo, anche perché la neuroradiologia non utilizza solo radiazioni ionizzanti ma è ancora diffusamente utilizzato per convenzione. La disciplina è riconosciuta come specialità solo in alcuni Paesi e la sua regolamentazione varia a seconda dello stato:

- Cile: è considerata un postgrado riservato agli specialisti in radiologia, ottenibile dopo due anni di corsi[8];

- Germania: è previsto un corso di uno o due anni riservato agli specialisti in radiologia[7];
- Italia: dal 2005 il neuroradiologo è uno specialista di radiologia che ha seguito corsi specifici ma non v'è un diploma specifico attestante l'indirizzo seguito[7]
- Messico: è considerata un postgrado riservato agli specialisti in radiologia, ottenibile dopo due anni di corsi[9];
- Portogallo: riconosciuta come specialità a sé stante[7];
- Svezia: Riconosciuta come specialità a sé stante[7];
- Stati Uniti: esiste un *Certificate of Added Qualification in Neuroradiology* che riconosce una cultura specifica ma non garantisce un percorso formativo, peraltro limitato alla sola neuroradiologia diagnostica[7].

Voci correlate

- Neuroanatomia RM normale

Note

1. ^ *Nei primi anni ottanta e solo per una breve stagione e su un numero limitato di pazienti, fu utilizzato il filo di tantalio per la fissazione iridea delle protesi intraoculari*, su *fermononrespiri.com*. URL consultato il 24 maggio 2018.
2. ^ Guglielmi G e coll: Electrothrombosis of saccular aneurysms via endovascular approach. Part 1: Electrochemical basis, technique, and experimental results. J Neurosurg 75:1-7, 1991.
3. ^ Guglielmi G e coll: Electrothrombosis of saccular aneurysms via endovascular approach. Part 2: Preliminary clinical experience. J Neurosurg 75:8-14, 1991.
4. ^ *History of neuroradiology in Russia*, su *springer.com*. URL consultato il 24 maggio 2018.
5. ^ *Arthur Schüller: pioneer of neuroradiology.*, su *ajnr.org*. URL consultato il 24 maggio 2018.
6. ^ *A History of Neuroradiology in Italy* (**PDF**), su *ainr.it*. URL consultato il 24 maggio 2018 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2018).
7. *Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia*, su *camera.it*.
8. ^ http://medicina.udd.cl/postgrado/postitulo-de-subespecialidad-en-neurorradiologia/
9. ^ http://neurocampus.cuaed.unam.mx/neurorradiologia.php

Bibliografia

- Sandro Sassaroli, *Neuroradiologia*, Roma, Abruzzini Editore, 1950.
- Gianni B. Badrac, *Elementi di neuroradiologia 2/ed.*, Minerva Medica, 1994.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **neuroradiologia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Neuroradiology?uselang=it)**

Collegamenti esterni

- *Associazione Italiana Neuroradiologia - Sito ufficiale*, su *ainr.it*.

- *American Journal of Neuroradiology*, su *ajnr.org*.

Controllo di autorità	LCCN (EN) sh85090932 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85090932) · GND (DE) 4041899-6 (https://d-nb.info/gnd/4041899-6)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroradiologia&oldid=123656785"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 ott 2021 alle 19:56.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

WIKIPEDIA

Medicina nucleare

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **medicina nucleare** è quella branca della medicina che utilizza sostanze radioattive (radiofarmaci) a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Le metodiche diagnostiche consistono nello studio della fissazione di un radionuclide legato a una molecola *carrier* (vettore), che "mima" l'attività metabolica di un tessuto o si fissa a quest'ultimo mediante l'interazione con opportuni recettori, come ad esempio l'utilizzo di un anticorpo monoclonale che lega ad esso un radionuclide.

La terapia radiometabolica si effettua impiegando sostanze che, legandosi ai tessuti patologici con meccanismi simili ai farmaci usati in campo diagnostico, consentono di colpirli in maniera selettiva e con un'alta dose di radiazioni ad alto LET (come le particelle β^- o α) risparmiando in larga misura i tessuti sani. Per approfondire gli aspetti fisici, biologici e radioprotezionistici che riguardano le interazioni della radiazioni con la materia si raccomanda la lettura delle voci radiazioni ionizzanti, radiobiologia e radioprotezione.

Medicina nucleare

Procedura diagnostica

Una gamma camera per esami di medicina nucleare

MeSH	D009683 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D009683)

Negli ultimi anni si parla sempre di più di radiomica, definita una "nuova scienza in oncologia" e legata all'integrazione delle informazioni provenienti dall'*imaging* radiologico e le conoscenze del medico nucleare, sottolineando la necessità di parametrare i biomarcatori tumorali fra loro per meglio integrare le notizie forniteci (per es., volume della neoplasia, neo-angiogenesi, la cellularità...).[1]

Indice

Radionuclidi

Le apparecchiature

Diagnostica Medico-Nucleare

Terapia radiometabolica

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Radionuclidi



La scintigrafia mostra metastasi ossee da carcinoma prostatico.

Il radionuclide più utilizzato è il tecnezio-99m, che emette radiazioni gamma con energia di 140 keV (ottimali per la gamma camera) ed ha un'emivita di circa 6 ore, compatibile con la durata degli esami ma comunque abbastanza breve da consentire una limitata irradiazione del paziente e della popolazione. Il ^{99m}Tc viene prodotto tramite un generatore ^{99}Mo-^{99m}Tc che ne garantisce un'ottima disponibilità.

Altri radionuclidi di comune utilizzo sono:

- indio-111;
- iodio-123 e iodio-131 (che ha essenzialmente una componente β^- e viene usato principalmente nelle terapie radiometaboliche per la tiroide);
- samario-153 e radio-223 per la terapia delle metastasi ossee;
- renio-186, lttrio-90, lutezio-177 ed erbio-169 per varie terapie radiometaboliche.



Immagini TC e PET sovrapposte

I radiofarmaci β^+ emittenti, per lo studio con la metodica PET, sono in gran parte legati al fluoro-18. Per produrre questo radioisotopo è necessario utilizzare una macchina molto costosa chiamata ciclotrone, che solo poche strutture industriali, ospedaliere o universitarie possono permettersi di mantenere. Per tale ragione gli altri radioisotopi emittenti positroni ottenibili tramite questa macchina sono molto meno utilizzati nella pratica clinica. Il carbonio-11, l'ossigeno-15 e l'azoto-13 infatti hanno emivite brevissime (pochi minuti o secondi) incompatibili con il trasporto dal sito di produzione a quello di utilizzo se queste due strutture sono distanti.

È anche possibile ottenere radioisotopi emittenti positroni usando generatori simili a quelli esistenti per il tecnezio. I generatori di questo tipo più conosciuti sono quello che da come prodotto il rubidio-82 (utilizzabile per lo studio PET di perfusione cardiaca) e soprattutto il generatore germanio-68/gallio-68 che consente di ottenere gallio-68 utile alla marcatura di molti radiofarmaci fra cui gli analoghi della somatostatina,

Le apparecchiature

Le apparecchiature utilizzate per la produzione di immagini (gamma camera e tomografo PET) utilizzano dei cristalli a scintillazione che consentono la visualizzazione delle zone di fissazione del radionuclide all'interno dell'organismo. Tali cristalli emettono luce quando vengono colpiti dalla radiazione gamma, emessa direttamente dal radiofarmaco che viene iniettato al paziente o generata per annichilazione dei positroni emessi dai radiofarmaci per la PET (in quest'ultimo caso vengono ricercati gli *eventi di coincidenza*, per maggiori dettagli consultare la relativa voce). La luce così rilevata è poi convertita in un segnale elettrico-digitale per l'analisi computerizzata. La fissazione del radiofarmaco a livello di determinate zone del corpo può essere misurata anche mediante opportune sonde in grado di contare il numero di radiazioni con cui interagiscono.

Mediante acquisizioni tomografiche è inoltre possibile lo studio tridimensionale dell'organo (PET e SPECT).

Acquisizione SPECT mediante gamma camera

Diagnostica Medico-Nucleare

Qui sotto sono elencate le principali indagini scintigrafiche.

Tomografo PET

- Linfoscintigrafia degli arti
- Neuroimaging del sistema dopaminergico
- Ricerca del linfonodo sentinella
- Scintigrafia con granulociti marcati
- Scintigrafia corticosurrenalica
- Scintigrafia delle ghiandole salivari
- Scintigrafia ossea
- Scintigrafia/Tomoscintigrafia miocardica
- Scintigrafia polmonare
- Scintigrafia renale
- Scintigrafia paratiroidea
- Scintigrafia per la ricerca di angiomi epatici
- Scintigrafia per la ricerca di sanguinamenti occulti
- Scintigrafia per lo studio del fegato e delle vie biliari
- Scintigrafia per lo studio del transito esofago-gastro-duodenale
- Scintigrafia tiroidea
- SPECT cerebrale perfusionale
- Studio scintigrafico della mucosa gastrica eterotopica (ricerca del diverticolo di Meckel)
- Teranostica dei tumori neuroendocrini

Le indagini PET sono illustrate nella relativa voce e, più in dettaglio, nelle seguenti sottovoci:

- Utilizzo della PET in oncologia
- PET cerebrale
- PET cardiaca
- Teranostica dei tumori neuroendocrini
- Studio PET degli adenomi e delle iperplasie paratiroidee

Terapia radiometabolica

La terapia radiometabolica (anche terapia con radionuclidi, radioterapia metabolica) è quella branca della medicina nucleare che si occupa di trattare alcune patologie sfruttando particolari caratteristiche o degli isotopi radioattivi nativi o di alcuni farmaci, che vengono poi marcati con isotopi appropriati (di norma beta-emettitori puri, ma talvolta emettitori alfa o di elettroni Auger). Spesso i radiofarmaci utilizzati per gli studi diagnostici sono essi stessi emettitori di particelle cariche (^{131}I) oppure possiedono delle controparti con emissione gamma (difosfonati, ligandi dei recettori della somatostatina, ecc.), pertanto una terapia radiometabolica può essere guidata e monitorata mediante le immagini medico-nucleari ottenute durante il trattamento o prima di esso (approccio teranostico).

Gli impieghi principali sono:

- Terapia radiometabolica dell'ipertiroidismo: di qualunque origine sia (autoimmune, o uni- e multi-nodulare), tramite ^{131}I.
- Terapia radiometabolica del carcinoma tiroideo differenziato, sfruttando la capacità residua di fissare ^{131}I.
- Teranostica dei tumori neuroendocrini
- Radioembolizzazione intrarteriosa delle neoplasie primitive e delle metastasi epatiche (TARE)
- Terapia radiometabolica delle metastasi ossee dolorose.
- Terapia delle sinoviti croniche ipertrofiche dolorose (*radiosinoviortesi*).
- Radioimmunoterapia dei linfomi CD20 positivi usando *Ibritumomab tiuxetan*, ossia l'unione di un anticorpo chimerico anti-CD20 con ^{90}Y.

Note

1. **^** *Radiomica - Congresso SIRM 2014*, su *ao-pisa.toscana.it*. URL consultato il 13 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 21 dicembre 2016).

Bibliografia

- Duccio Volterrani, Paola Anna Erba e Giuliano Mariano, *Fondamenti di medicina nucleare. Tecniche e applicazioni*, Springer Verlag, 2010, ISBN 9788847016842.
- (**EN**) Review (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17420716) sulla teranostica in medicina nucleare

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **medicina nucleare (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nuclear_medicine?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (**EN**) *Medicina nucleare*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 16209 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=16209) · LCCN (**EN**) sh85093011 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093011) · GND (**DE**) 4042770-5 (https://d-nb.info/gnd/4042770-5) · BNF (**FR**) cb119588690 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119588690) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119588690) · J9U (**EN**, **HE**) 987007536106905171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007536106905171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007536106905171)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicina_nucleare&oldid=126473612"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 27 mar 2022 alle 17:15.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Radioterapia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

> **Questa voce o sezione sugli argomenti procedure mediche e oncologia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti**.

La **radioterapia** è una terapia medica consistente nell'utilizzo di radiazioni ionizzanti. La radioterapia è utilizzata soprattutto nel trattamento di forme di tumore, infatti utilizza un fascio di fotoni penetranti, di 5-10 MeV di energia, per danneggiare il patrimonio genetico delle cellule malate e impedire così che proliferino[1], mentre è poco impiegata in patologie non oncologiche. La radioterapia può essere curativa in un certo numero di tipi di cancro, se confinati in una zona del corpo sulla base della classificazione TNM della lesione stessa.

È prassi comune combinare la radioterapia con la chirurgia, con la chemioterapia, con l'ormonoterapia e l'immunoterapia. Lo scopo esatto del trattamento (curativo-radicale, adiuvante, neoadiuvante, terapeutico o palliativo) dipenderà dal tipo di tumore, dalla posizione e stadio, nonché dalla salute generale del paziente.

Le radiazioni ionizzanti utilizzate in radioterapia sono in grado di danneggiare il DNA del tessuto bersaglio. Le cellule tumorali sono, in genere, scarsamente capaci di riparare i propri danni e quindi vanno incontro a morte cellulare per apoptosi. Per risparmiare tessuti sani, ad esempio pelle o organi che la radiazione deve superare per arrivare al tumore, i fasci delle radiazioni vengono sagomati e rivolti da diverse angolazioni, intersecandosi nel centro della zona da trattare, dove perciò vi sarà un quantitativo di dose assorbita totale superiore che nelle parti adiacenti.

Radioterapia

Procedura medica

Una paziente si sottopone a radioterapia alla pelvi

Classificazione e risorse esterne	
MeSH	D011878 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2022/MB_cgi?field=uid&term=D011878)
MedlinePlus	001918 (https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001918.htm)

Oltre al tumore stesso, i campi di radiazione possono comprendere anche i linfonodi drenanti se sono clinicamente o radiologicamente coinvolti con il tumore, o se si ritiene che possa esserci un rischio di diffusione maligna. È necessario includere un margine di tessuto sano circostante il tumore per consentire le incertezze dovute al posizionamento e al movimento interno degli organi.

L'irradiazione corporea totale (TBI) è una tecnica radioterapica utilizzata per preparare il corpo per ricevere un trapianto di midollo osseo. La brachiterapia, in cui una sorgente di radiazione è posizionata all'interno o vicino alla zona da trattare, è un'altra forma di radioterapia che minimizza l'esposizione del tessuto sano durante le procedure per curare i tumori della mammella, prostata e altri organi.

Indice

Storia

La radioterapia nella cura dei tumori
- TBI
- TSEBI
- Altri trattamenti

Principi di funzionamento

Usi terapeutici
- Team
- Procedure e tecniche
- Frazionamento
- Dosaggio

Classificazione del trattamento

Associazione con altre terapie

Radiobiologia
- Radioprotezione

Effetti collaterali
- Principali effetti collaterali acuti
- Principali effetti collaterali cronici

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Storia

Apparecchio per radioterapia del 1917.

La medicina utilizza la radioterapia come trattamento per il cancro da più di 100 anni, con le sue prime radici tracciate dalla scoperta dei raggi X nel 1895 da Wilhelm Röntgen[2]. Emil Grubbe di Chicago è stato forse il primo medico statunitense ad utilizzare raggi x per curare il cancro, a partire dal 1896[3].

Il campo della radioterapia ha cominciato a crescere nella prima parte del 1900, ciò è stato gran parte dovuto al lavoro pionieristico dello scienziata vincitrice del premio Nobel, Marie Curie (1867-1934), che scoprì la radioattività degli elementi, polonio e radio, nel 1898. In questo modo ha inizio una nuova era nel trattamento medico e della ricerca[2]. Uno dei primi congressi di elettrologia e radiologia medica fu quello svoltosi in Italia nel 1906.[4] Il radio è stato utilizzato in varie forme fino alla metà del 1900, quando la telecobaltoterapia e le unità di cesio hanno iniziato ad usare tale elemento. Infine, gli acceleratori lineari medici sono stati utilizzati come sorgenti di radiazioni dalla fine del 1940.

Con l'invenzione di Godfrey Hounsfield della tomografia computerizzata (CT) nel 1971, la progettazione tridimensionale è diventata una possibilità e ha creato un passaggio da 2D a 3D per la distribuzione della radiazione. La pianificazione basata sulla CT permette ai medici di determinare con maggiore precisione la distribuzione della dose di radiazione, utilizzando immagini tomografiche assiali dell'anatomia del paziente. Le unità di ortovoltaggio e di cobalto sono state in gran parte sostituite da acceleratori lineari a megavoltaggio,

utili per le loro energie penetranti e per la mancanza di sorgenti fisiche di radiazione.

Un moderno acceleratore lineare.

L'avvento di nuove tecnologie della diagnostica per immagini, comprese la risonanza magnetica (MRI) nel 1970 e la tomografia ad emissione di positroni (PET) nel 1980, hanno portato il trattamento dalla radioterapia conformazionale tridimensionale (3D) alla radioterapia a intensità modulata (IMRT), alla radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) e alla tomoterapia. Questi progressi che hanno permesso agli oncologi di radiazione di vedere e colpire meglio i tumori, hanno portato a migliori risultati nel trattamento, con una maggiore conservazione dell'organo e meno effetti collaterali[5].

La radioterapia nella cura dei tumori

La radioterapia come disciplina medica, è rivolta principalmente al trattamento dei tumori.



Trattamento radioterapico presso l'Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano (ca. 1930)

La radioterapia (da sola o in combinazione con la chirurgia e/o la chemioterapia) è uno strumento efficace per il controllo locale dei tumori. Si calcola che circa 1300-1800 pazienti all'anno ogni 750.000 necessitino di un ricorso alla radioterapia.[6]

Si tratta di una pratica medica decisamente consolidata e di comprovata efficacia, ma che ha controindicazioni nei potenziali pericoli dovuti all'impiego delle stesse radiazioni ionizzanti, nei possibili danni da radiazioni e nella probabilità che le stesse inducano l'insorgenza di secondi tumori.

Il meccanismo di interazione tra il fascio di fotoni sfruttati dalla radioterapia e le cellule malate è il seguente: i fotoni dei raggi X colpiscono gli elettroni dei tessuti e li mettono in movimento, questi elettroni “secondari” percorrono zigzagando uno o due centimetri nei tessuti e ionizzano gli atomi delle molecole di DNA nelle cellule che incontrano, disinnescando così il funzionamento dei loro geni.[1]

Due importanti modalità radioterapeutiche sono la **TBI** e la **TSEBI**.

TBI

La **radiazione corporea totale** (*Total Body Irradiation* - TBI), è l'irradiazione totale e simultanea del corpo (in una o più frazioni) utilizzando fasci di fotoni ad alta energia. Consiste in una particolare tecnica radioterapica utilizzata per preparare il paziente a ricevere un trapianto di midollo osseo (TMO o BMT). A seconda delle necessità, questo tipo di intervento può essere eseguito con somministrazioni del tipo *high*

dose, *low dose* o *very low dose*. Nello specifico le finalità di questo trattamento sono due: sopprimere il sistema immunitario per prevenire il rigetto del midollo del donatore familiare o non familiare, eradicare le cellule neoplastiche che residuano ai trattamenti chemioterapici.[7]

TSEBI

Con **TSEBI**, *Total Skin Electron Beam Irradiation*, è indicata l'irradiazione cutanea totale effettuata con fasci di elettroni[8]. Si tratta di una terapia impiegata nel caso di neoplasie cutanee diffuse o in pazienti affetti da micosi fungoide.

Altri trattamenti

Esiste anche una *radioterapia non oncologica*, impiegata nel trattamento di situazioni non oncologiche presenti più frequentemente, ma non esclusivamente, in Geriatria.

Principi di funzionamento

La radioterapia si basa sul principio d'indirizzare la radiazione ionizzante sulle cellule cancerogene per danneggiarne il DNA. Mentre le cellule sane dispongono di meccanismi atti a riparare i danni che possono avvenire sul loro DNA, le cellule cancerogene dispongono di meccanismi molto meno efficienti, per cui un danno è più facilmente letale per questo tipo di cellula. Le radiazioni ionizzanti generano nelle cellule radicali liberi, che danneggiano il patrimonio genetico della cellula ospite non in grado di opporvisi.

La principale limitazione nell'uso di questa tecnica consiste nel fatto che le cellule di tumori solidi risultano essere in debito di ossigeno (ipossia) e questo le rende tanto più resistenti alle radiazioni quanto minore è la presenza di ossigeno. L'ossigeno contribuisce a rendere meno riparabile il danno biologico causato dai radicali liberi generati dalle ionizzazioni, e interagisce con gli atomi di idrogeno H^+ liberi creando ossidanti OHx: questo inibisce la reazione di ritorno che altrimenti si avrebbe (da Hx+OHx ad H_2O).

Tale effetto è più marcato nelle radiazioni a bassa energia (linear energy transfer elevato), tanto che in presenza di ossigeno l'efficacia biologica di tali radiazioni è aumentata di 3 volte.

Sono in sperimentazione tecniche per aumentare l'ossigenazione in fase di trattamento radioterapico, o diminuire l'ossigeno nei tessuti sani antistanti i tumori per limitarne il danno biologico.

Usi terapeutici

La radioterapia è principalmente indicata per il trattamento di neoplasie. In misura minore, viene usata per patologie non tumorali che si giovano dagli effetti indotti dalle radiazioni, come nel caso di esoftalmo endocrino, nella prevenzione dei cheloidi, nella prevenzione delle ossificazioni eterotopiche o come nel trattamento di malformazioni artero-venose intracraniche.

Nel trattamento dei tumori, la radioterapia si prefigge di ottenere la totale distruzione di una neoplasia, senza indurre alterazioni gravi e irreversibili ai tessuti circostanti. Per garantire questo risultato, massimizzando l'intervento nell'area interessata e minimizzando l'esposizione delle zone circostanti, è talora utile utilizzare differenti tipi di radiazioni, sia fotoniche (raggi X o raggi γ) che corpuscolari (elettroni, raggi alfa, protoni, ioni carbonio, ecc.) differentemente distribuite sulla sede neoplastica.

Circa non gli effetti non terapeutici, ma i possibili legami causa-effetto fra la radiazione ionizzante e cancro, utile visionare gli effetti collaterali e la sezione radioprotezione.

Team

In un approccio multidisciplinare (e talora anche multi – istituzionale), che comporta anche controlli ematologici, per quanto riguarda le tecniche radioterapiche dei vari organi ed apparati della anatomia umana, il trattamento radioterapico di una neoplasia coinvolge diverse figure specialistiche:

- Medici specialisti in Radioterapia Oncologica (Radioterapisti Oncologi o Radio-oncologi)
- Fisici Sanitari
- Statistici sanitari
- Ingegneri biomedici
- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica per RT e Dosimetria
- Infermieri dedicati.

Procedure e tecniche



Pianificazione di un trattamento

Fra le procedure programmate sulle macchine di radioterapia vi sono la taratura dei sistemi dosimetrici e la calibrazione dei fasci di terapia.

La prima fase della procedura relativa al paziente consiste invece in un suo posizionamento e negli accorgimenti atti a mantenere la riproducibilità di appositi e comodi accessori di immobilizzazione.

Dette apparecchiature per posizionamento e contenzione del paziente sono solitamente site nell'area cosiddetta "di simulazione".

Si può poi, nel caso, effettuare una 'pre-simulazione rx'; possono essere eseguite registrazioni e fusioni di immagini multimodali; comunque si passa generalmente all'utilizzo della tomografia assiale con l'impiego contemporaneamente di appositi laser che consentono di identificare corrette coordinate di 'centraggio', e vengono lasciati opportuni reperti. L'uso della tomografia assiale con gli appositi laser, serve per le DRR (o radiografie digitali ricostruite), in particolare per poter ricostruire un'immagine tridimensionale dell'area di trattamento; vengono quindi identificate possibili situazioni di criticità e/o di particolare rilevanza clinica ed anche utilizzati eventuali speciali markers ed è possibile effettuare una 'post-simulazione rx' di controllo.

Con questi dati viene steso un TPS , ovvero Treatment Planning System, che identifica le zone da irradiare e gli OAR (Organs At Risk, organi da non irradiare o risparmiare), e da cui si desumono le curve di isodose bidimensionali e ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali oltre agli istogrammi Dose-Volume e le visualizzazioni BEV (Beam Eye View) e REV (Room Eye View).

Le principali tecniche radioterapiche (tranne che per IORT, curieterapia e radioterapia metabolica), per essere eseguite, necessitano di sistemi di localizzazione e controllo, ottenuti con pellicole fotografiche che registrano il posizionamento prima o durante il trattamento ("radiotherapy localization and verification"). I tipi di 'portal radiograph' (appropriate pellicole inserite in apposite cassette) sono differenti: le 'localization', quando l'immagine è acquisita mediante una pellicola 'veloce' esposta per pochi secondi prima di effettuare il trattamento (radiografia di localizzazione); le *verification*, quando l'immagine è acquisita da una pellicola "lenta" esposta al fascio radiante per tutta la durata della seduta (radiografia di verifica). Da ricordare le portal radiograph "a doppia esposizione" quando l'immagine è acquisita da una pellicola 'veloce' sottoposta

a due esposizioni sequenziali di cui la prima corrisponde al campo trattato mentre la seconda a un campo più ampio del primo; ottenute con esposizione di pochi secondi hanno la funzione di rendere fattibile in modo semplice il confronto tra il campo di trattamento e le strutture anatomiche vicine. Ha costituito un valido strumento alternativo ai portal film la modalità di controllo di tipo radioscopico denominato Electronic Portal Imaging Device (EPID), costituita da un braccio meccanico mobile situato sotto la testata dell'acceleratore e con sistema che acquisisce immagini, di seguito elaborate e visualizzate tramite una 'workstation'.

La radioterapia esterna a fascio collimato si fonda sull'utilizzo di un fascio di radiazioni prodotte da sorgenti situate all'esterno del paziente e viene utilizzata sia con radiazioni fotoniche sia con l'utilizzo di elettroni veloci.

- Ortovoltaggio: raggi X di bassa energia (roentgenterapia: 'plesioroentgenterapia' e "roentgenterapia non plesio") da macchine di circa 50-500 kV.
- Altovoltaggio: raggi γ o telecobaltoterapia o TCT, (energia 'media': 1,25 MV), o meglio raggi X (fotoni X) solitamente a partire da 4 MV prodotti da acceleratore lineare per radioterapia.

A seconda del loro potenziale gli acceleratori lineari (che sono spesso 'Dual Energy': 4 MV, 6-18 MV 6-15 MV, 6-10 MV) possono produrre anche elettroni di diversi livelli energetici (MeV). Gli elettroni hanno una modalità di diffusione della dose differente da quella dei raggi X, poiché data la massima dose ad una profondità che dipende dalla loro energia, la dose va poi molto velocemente a pressoché zero e dunque vengono utilizzati per irradiare tessuti più superficiali, risparmiando quelli più profondi.

- *Radioterapia convenzionale*, previa simulazione rx, con l'utilizzo di TCT con collimatori di 'vecchia generazione' a ganascia e split standard o con l'utilizzo di Linac a partire da 6 MV e sistema isocentrico; da segnalare l'apparecchio detto "sagomatore" (per risparmiare irradiazione tessuti sani) +/- ev. 'compensatore';da ricordare il "vecchio" profilatore; da menzionare i filtri a cuneo.
- *Radioterapia conformazionale* con l'ausilio di sagome con massima personalizzazione; radioterapia conformazionale con CCMB (computer-controlled moving bar); da ricordare anche l'ausilio del whole body frame
- *IORT* (radioterapia intraoperatoria) in cui una singola, alta dose di radiazioni è somministrata nel corso dell'intervento chirurgico, e viene utilizzata in interventi con elevata recidività locale (ad esempio pancreas o retto), permettendo l'irradiamento del letto tumorale con elettroni
- Radioterapia robotica
- Panirradiazione corporea o total body irradiation (TBI). La "high dose TBI" e la "not high dose TBI" sono utilizzate rispettivamente nei regimi di condizionamento mieloablativi e nei regimi di condizionamento non mieloablativi per trapianto di cellule staminali ematopoietiche (da midollo osseo o da sangue periferico o da cordone ombelicale). La TBI a dosi molto basse (10-15 cGy per frazione, 1 frazione giornaliera per 2-3 giorni alla settimana, fino a 150-200 cGy totali), pressoché in disuso, è stata impiegata particolarmente nel trattamento di linfomi non Hodgkin a basso grado-alto stadio e refrattari. Da ricordare anche la hemibody irradiation (HBI) utilizzata per lo più nel trattamento di localizzazioni ossee multiple.
- Irradiazione cutanea totale con elettroni o total skin electron irradiation (TSEBI).
- *Irradiazione sterotassica esterna*, che si avvale di archi multipli di trattamento per la distribuzione della dose. Da ricordare anche la *Gamma Knife impiegata per il trattamento di*



Sistema di contenimento personalizzato per mantenere nella stessa posizione il capo del paziente per ogni seduta radioterapica.

lesioni cerebrali.

- *Radioterapia conformazionale con multileaf*, con l'ausilio di collimatori *multileaf*; da ricordare anche la radioterapia conformazionale rotazionale (RCRT) che usa un acceleratore con ‘montato’ un braccio a C. La testata del linac si muove lungo il braccio a C con un angolo massimo solitamente di 60°. La rotazione simultanea del gantry genera una tecnica ‘conica dinamica’ di irradiazione. La radioterapia conformazionale conica dinamica (dyconic CRT) è stata sviluppata combinando la tecnica con un moto continuo di un collimatore multileaf. La dyconic CRT è in grado di "erogazioni" di fasci non complanari senza rotazione del ‘tavolo di trattamento’.
- *IMRT*, cioè la radioterapia a intensità modulata, che permette una differente distribuzione della dose durante l'erogazione del piano di radioterapia attraverso il movimento del multi leaf collimator e l'impiego di fasci di fotoni opportunamente filtrati e modulati allo scopo di ottenere la distribuzione di dose conformata al target; da menzionare l'utilizzo di tecniche di Image-Guided (imaging guidato durante le fase di treatment delivery per la verifica del set-up) e Adaptive Radiotherapy (ripianificazione del trattamento sulla base di variazioni fisiologiche del paziente, quali perdita di peso, o del tumore stesso) e controllo del movimento respiratorio-"Respiratory Gating" in modo da erogare il trattamento in una specifica fase del ciclo respiratorio riducendo al mino la dose agli organi sani limitrofi. Da menzionare i sistemi: IMAT ossia Intensity Modulated Arc Therapy, VMAT ossia Volumetric Modulated Arc Therapy, Rapid Arc ossia Radiotherapy Technology for Volumetric Arc Therapy;(anche di 360°).

Se si escludono la TBI e la meno frequente TSEBI, considerando le diverse tecniche impiegate per il numero dei pazienti, e circa tre "campi" per paziente, il tempo medio di trattamento per paziente, inteso come la durata di permanenza nel "bunker" (sempre sotto osservazione "visiva-televisiva" e con continua possibilità dello 'scambiarsi comunicazioni'), è di 15 minuti e comunque non inferiore ai 10 minuti.

I giorni totali dei trattamenti più frequenti sono: 1, 5, 10, 13, 15, 18, 23, 25, 27, 30, 35, 38; per trattamenti palliativi e radicali.

Protoni, neutroni e ioni carbonio vengono invece impiegati per l'adroterapia. Il nome adroterapia deriva da terapia adronica, si tratta di una terapia che utilizza fasci di adroni, particelle caratterizzate dall'interazione forte. Il vantaggio del loro utilizzo consiste nella capacità di depositare alte dosi di radiazioni nel tumore limitando al massimo le dosi agli organi critici, anche quando questi si trovano molto vicini al 'bersaglio'. Prevede l'utilizzo di un ciclotrone per accelerare le particelle a velocità elevate, impossibili da raggiungere con acceleratori di tipo lineare. Gli ioni di carbonio utilizzati hanno una efficacia biologica superiore ai raggi X ed anche ai protoni.

Non rientrano nella definizione di ‘radioterapia esterna’ la brachiterapia e la radioterapia metabolica, di seguito descritte.

- *Brachiterapia*, (o curieterapia), che consiste nella localizzazione di un'alta dose in un volume molto piccolo, riducendo la tossicità del trattamento, può essere:
  - endocavitaria
  - endoluminale
  - endovascolare
  - interstiziale
  - da contatto

La brachiterapia (o curieterapia) fino ad ora impiegata può essere classificata come low-dose rate (LDR), medium-dose rate (MDR), high-dose rate (HDR) e pulsed-dose rate (PDR).

Gli isotopi maggiormente usati sono: iridio 192, iodio 125, stronzio 89, cesio 137, palladio 103, oro 198.

- *Selective Internal Radiotherapy Therapy*, (SIRT): con apposite microsfere vengono trasportate delle particelle radioattive, ad esempio, direttamente nel fegato attraverso l'arteria epatica.
- *Radioterapia metabolica*, (vedi anche: Medicina nucleare) in questa metodica si utilizzano delle sorgenti radioattive non sigillate, introdotte nell'organismo per via orale o parenterale, per poter ottenere un'irradiazione omogenea e selettiva dei tessuti tumorali.

La radioterapia può essere fatta pertanto anche con radionuclidi in tecniche apparentate con la medicina nucleare, per esempio la radioterapia della tiroide con Iodio-131, o quella con stronzio, samario o renio per le metastasi ossee. Da menzionare anche tecniche di *radioembolizzazione* e la *radioterapia recettoriale* (ad esempio con ittrio-90).

Frazionamento

L'intensità di dose, definita come la dose ricevuta nell'unità di tempo, è chiamata meglio tasso di dose[9]; in ogni caso assume importanza notevole, rispetto alla maggioranza dei trattamenti, il frazionamento. Il trattamento radiante esterno è infatti abitualmente non continuo, ma frazionato e viene eseguito seguendo due principali schemi di frazionamento (o somministrazione) della dose:

- *convenzionale*: la terapia viene eseguita con non più di una frazione giornaliera;
- *ipofrazionato*: anche qui la terapia viene eseguita con non più di una frazione giornaliera;
- *iperfrazionato*: la terapia viene eseguita con più di una frazione giornaliera solitamente a non meno di 6 ore l'una dall'altra.

A tasso e frazionamento di dose, volume irradiato e dose totale erogata sono in parte correlabili la tossicità e controllo locale dei trattamenti radioterapici con ottimizzazione dosimetrica e radiobiologica.

Il metodo di somministrare dosi piccole e frequenti è utilizzato specie quando utile a permettere alle cellule e ai tessuti sani di riparare i danni indotti dalle radiazioni, senza alterare l'efficacia sul tumore.

Dosaggio

La radioterapia, come del resto la farmacoterapia, ha ovviamente effetti biologici e la dose totale, erogata ed assorbita, è importante anche in relazione al frazionamento scelto (che si correla al concetto di dose somministrata nel tempo). Il frazionamento come già espresso è suddivisibile in convenzionale e ipofrazionato (non più di una frazione al giorno) ed iperfrazionato (più di una frazione al giorno).

La somministrazione dell'irradiazione esterna, convenzionalmente, è una volta al giorno per 5 giorni consecutivi per una dose settimanale di 9-10 Gray = Gy (comunque non inferiore a circa 7,75 Gy e non superiore a circa 11,85 Gy, ovvero 775-900-1000-1185 centigray = cGy). La dose per frazione giornaliera (1 Gy = 100 cGy) è, non considerando un megafrazionamento, usualmente di:

- 1,8-2 Gray (comunque non inferiore a 1,5-1,6 e non superiore a 2,2-2,5 Gray) per il frazionamento convenzionale (un frazionamento utilizzato nel passato in alcuni paesi era di 2,67-2,75 Gy al giorno);
- uguale o superiore a 2,51-2,91 e non superiore a 3,5-3,75 Gray per l'ipofrazionamento cosiddetto moderato;
- uguale o superiore a 3,76 e non superiore a 5-5,5 Gray, comunque non superiore a 7,5-8 Gray, per un ipofrazionamento superiore al moderato;

- 1-1,6 Gray per l'iperfrazionamento.

Generalmente l'irradiazione esterna viene dunque effettuata giornalmente (per un massimo di 5 frazioni settimanali) e la dose varia in relazione agli intenti (radicali/sintomatico-palliativi), al tipo di tumore, all'affiancamento ad essa di altre terapie quali la chemioterapia, la chirurgia o l'utilizzo di altre modalità. Nei casi di trattamenti radicali (in cui si vuole eradicare il tumore), la dose totale tipica fornita ai tumori epiteliali solidi varia dai 46-50-54 ai 60-70 Gray (Gy) o più; per i linfomi le dosi sono comprese fra 20-32,5 e 45 Gy.

Classificazione del trattamento

Spesso la *radioterapia*, senza chemioterapia oppure integrata alla chemioterapia (*radiochemioterapia*), va inquadrata secondo altre terapie: o come trattamento "singolo" o come trattamento precauzionale di "consolidamento post chemio" nei linfomi, oppure, nei tumori 'solidi', come trattamento quando inoperabili, (es. cancro della vescica localmente avanzato), o per poter facilitare l'operazione e ridurre i rischi al paziente o per rendere l'intervento meno mutilante, (es.adenocarcinoma del retto), o per migliorare il risultato terapeutico (es.cancro dell'esofago). La radioterapia è in grado anche di consentire la conservazione o la preservazione d'organo oppure una minor mutilazione d'organo.

La *radioterapia* può essere classificata come:

- *Trattamento curativo*, volto alla eradicazione del tumore, con obiettivo la cura loco-regionale e la guarigione del paziente.
- *Trattamento esclusivo*, quando viene utilizzata solo la radioterapia per eliminare il tumore; eseguita per patologie virtualmente localizzate e radioresponsive, ad esempio in alcune casistiche di tumori prostatici, tumori del distretto ORL-cervico-facciale, tumori ginecologici, linfoma non aggressivo e a basso stadio
- *Trattamento alternativo* alla chirurgia, quando la chirurgia sarebbe preferibile ma non è fattibile per motivi medici/chirurgici
- *Trattamento adiuvante*, quando è in relazione ad altri trattamenti:
  - *Trattamento neoadiuvante*, quando questa terapia verrà poi seguita da operazione chirurgica (+/- altri trattamenti)
  - *Trattamento intradiuvante* (IORT), quando la radioterapia viene eseguita durante l'operazione chirurgica, per poter avere un'azione più diretta e localizzata della radioterapia
  - *Trattamento postadiuvante*, quando questa terapia viene eseguita a seguito di operazione chirurgica, (+/- altri trattamenti), assumendo una funzione integrata e complementare per la risoluzione locale della malattia.
  - *Trattamento adiuvante pre e post-operatorio* o a ‘sandwich‘.
- *Trattamento precauzionale*: la radioterapia viene eseguita, quando, in seguito a trattamento/i radicale/i, si è ottenuta la cura con risoluzione locale di un tumore che, tuttavia, ha un'alta probabilità di ricaduta in sedi virtualmente radio-responsive che per l'appunto vengono sottoposte a radioterapia precauzionale; per converso da segnalare la radioterapia di salvataggio che viene eseguita, quando, dopo aver ottenuta la cura con risoluzione locale del tumore grazie a trattamenti radicali, il tumore si ripresenta nella medesima sede, con una ricaduta virtualmente radiotrattabile.
- *Trattamento palliativo*, (l'obiettivo è il controllo della malattia locale e la terapia può essere funzionale ad una cronicizzazione con miglioramento della qualità di vita percepita); *trattamento sintomatico* e *trattamento antalgico*.

Associazione con altre terapie

Oltre che con la chirurgia, molto spesso la radioterapia viene associata a trattamenti di chemioterapia con antineoplastici. In questi ultimi anni, si sta inoltre affermando come valida associazione alla radioterapia, il trattamento di ipertermia oncologica. Tale terapia, riconosciuta dal sistema sanitario nazionale italiano (codice prontuario 9985.2), risulta in un potenziamento dell'effetto della radioterapia consentendo la riduzione delle dosi di radiazioni alle quali si deve sottoporre il paziente con evidenti benefici in termini di riduzione degli effetti collaterali. La radioterapia viene anche combinata con immunoterapia e con terapia con anticorpi monoclonali.

Radiobiologia

La radiobiologia è una branca delle scienze bio-mediche, che studia gli effetti provocati dalle radiazioni quando esse interagiscono con un sistema biologico (sole, o in associazione).

Essa ha diversi campi applicativi, correlati all'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, quali la *vecchia* radioterapia non oncologica, la radioprotezionistica, l'imaging, e particolarmente l'oncologia clinico-radioterapeutica e radiochemioterapica.

Per la valutazione delle radiazioni ionizzanti l'unità di misura più utilizzata è il gray, cioè la dose di energia assorbita per unità di massa. Il LET, l'Energia Lineare di Trasferimento, è l'energia rilasciata dalla radiazione per unità di lunghezza. Per quanto riguarda i tessuti biologici (specie dal punto di vista radioprotezionistico), si può parlare di *dose equivalente* e di *dose efficace*. Qui l'unità di misura è il Sievert (Sv). La *dose equivalente* viene calcolata moltiplicando la dose assorbita per un fattore di peso che dipende dal tipo di radiazione. La *dose efficace* rappresenta la sommatoria delle dosi equivalenti; sommatoria moltiplicata per un fattore di ponderazione tissutale, ovvero per pesi relativi ai vari organi e tessuti; questi ultimi pesi tengono conto della diversa sensibilità alle radiazioni degli organi e dei tessuti irradiati.

Radioprotezione

Tecnica atta a ridurre la dispersione delle radiazioni, ed a ridurne gli effetti collaterali.

Effetti collaterali

La radioterapia è un metodo di cura praticamente indolore di per sé. Nei casi in cui vengano utilizzati trattamenti palliativi risulta inoltre avere anche effetti collaterali minimi (ad esempio, modeste irritazioni cutanee della zona 'bombardata'). Nei casi in cui invece vengano utilizzati trattamenti radicali si possono indurre vari tipi di effetti collaterali che si manifestano durante o nelle settimane successive il trattamento stesso (effetti collaterali di tipo precoce) oppure nei mesi o anni direttamente successivi al trattamento (effetti collaterali di tipo tardivo). Uno di questi effetti collaterali è la fibrosi, un indurimento dei tessuti e delle ghiandole linfatiche nella zona sottoposta a trattamento radiante.

La natura degli effetti collaterali dipende dall'organo trattato, da frazionamento, tasso di dose, tempo totale di trattamento, intervalli nel trattamento, volume irradiato, tipo di tecnica utilizzata. Ogni individuo può presentare delle reazioni proprie, rispetto alla quantità di dose assorbita; inoltre trattamenti successivi su stessi siti trattati in precedenza possono causare particolari problemi: ogni tessuto presenta una tolleranza massima alla radiazione, quindi trattare in periodi diversi dei tessuti, organi o apparati che hanno ricevuto la massima dose anche anni prima può causare vari problemi come effetti collaterali a lungo termine anche a distanza di diversi anni.

Una volta escluse grazie ad apposite e rigorose procedure osservazionali e preventive le possibilità di incidenti, uno degli obiettivi principali della moderna radioterapia è quello di ridurre al minimo gli effetti collaterali, e di aiutare i pazienti a capire e accettare quegli effetti collaterali che non sono eliminabili. Gli effetti collaterali si dividono in acuti e cronici; vi sono state nel tempo diverse definizioni, da diversi autori, circa quando definire acuti o cronici gli effetti collaterali. Si sono definite complicanze immediate quelle entro il primo giorno; danni acuti quelli a partire dal primo giorno successivo all'inizio del trattamento e fino a 180 giorni; danni tardivi o cronici quelli dopo 180 giorni. Effetti collaterali tardivi o cronici sono stati definiti da altri quelli che si verificavano dopo 90 giorni dall'inizio del trattamento ed ancora quelli comparsi 90 giorni dopo la fine del trattamento o quelli non guariti entro 90 giorni dalla fine del trattamento. Dopo lo scritto di Bentzen SM, Overgaard J.,(Clinical manifestations of normal-tissue damage), del 1997, il cut-off più utilizzato per distinguerli sono i 3 mesi (acuti nei primi tre mesi post-trattamento, cronici dopo i tre mesi dal trattamento).

Molti effetti collaterali sono previsti ed attesi. Vi è stata comunque una evoluzione della loro identificazione basata sull'osservazione clinica con follow-up sempre maggiore, correlabile anche con lo svilupparsi delle apparecchiature e delle tecniche di radioterapia e con la modellistica radio-biologica interpretativa, descrittiva e previsionale, (a partire dai modelli utilizzanti un formalismo del modello LQ e nei quali un alfa/beta di 3 è tipico per gli effetti collaterali cronici ed un alfa/beta di 10 è invece tipico per gli effetti collaterali acuti come anche per il controllo tumorale), ma soprattutto sugli studi anatomopatologici e fisiologici.

Di conseguenza ne sono derivate varie classificazioni, le principali delle quali sono dovute a:

- **RTOG** Radiation Therapy Oncology Group (USA)
- **EORTC** European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EU)
- **ECOG** Eastern Cooperative Oncology Group (USA)
- **NCI** National Cancer Institute (USA)

Le classificazioni che più si sono affermate sono dunque:

- **RTOG/EORTC-Acute** (1984)
- **RTOG/EORTC-Late** (1984)
- **LENT** (Late Effects of Normal Tissues) dell'RTOG (1995)
- **SOMA** (Subjective symptoms, Objective signs, Management, and Analytical measures) dell'EORTC (1995)
- **LENT SOMA scales for all anatomic sites** del 1995, (Int J Radiat Oncol Biol Phys.;31 1049-91,1995)
- **CTC** o Common Toxicity Criteria for early morbidity del 2000, (Trotti A, Byhardt R, Stetz J et al, Common toxicity criteria: version 2.0, an improved reference for grading the acute effects of cancer treatment: impact on radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 47:13–47,2000)
- **CTCAE** (Common Terminology Criteria for Adverse Events) version 3.0 (ovvero: NCI,comprehensive, multimodality grading system to include both acute and late effects, of cancer treatments) del 2006 e relativa agli effetti collaterali acuti e cronici sia della radioterapia che della chemioterapia. L'ultimo aggiornamento della classificazione CTCA è disponibile dall'1-10-2010.

Principali effetti collaterali acuti

- Leucopenia; danneggiamento dei tessuti epiteliali (radiodermiti e mucositi precoci)
- Infiammazione ed edema della zona irradiata
- Affaticamento

Principali effetti collaterali cronici

Questi effetti possono risultare anche minimi, e dipendono dal tessuto che riceve il trattamento:

- Radiodermiti tardive e fibrosi
- Perdita dei peli o capelli nelle aree irradiate
- Secchezza delle fauci
- Secondi tumori radioindotti o chemioradioindotti
- Lesioni del midollo spinale (rare, e solitamente a livello cervicale e toracico)
- Infertilità
- Radionecrosi

Note

1. Ugo Amaldi, Sempre più veloci: Perché i fisici accelerano le particelle: la vera storia del bosone di Higgs, Zanichelli editore, 2012
2. "University of Alabama at Birmingham Comprehensive Cancer Center, History of Radiation Oncology (http://University%20of%20Alabama%20at%20Birmingham%20Comprehensive%20Cancer%20Center,%20History%20of%20Radiation%20Oncology) Archiviato (https://web.archive.org/web/20170220175602/http://acn.com.ve/) il 20 febbraio 2017 in Internet Archive." (from the Wayback Machine). Archived from the original (http://www3.ccc.uab.edu/show.asp?durki=68504) Archiviato (https://web.archive.org/web/20080105043216/http://www3.ccc.uab.edu/show.asp?durki=68504) il 5 gennaio 2008 in Internet Archive. on 2008-01-05
3. ^ "Pioneer in X-Ray Therapy". Science (New Series) 125 (3236): 18–19. 4 January 1957. Bibcode:1957Sci...125U (http://adsabs.harvard.edu/abs/1957Sci...125U..18)..18. doi:10.1126/science.125.3236.18. (jstor stable link (https://www.sciencemag.org/content/125/3236/18))
4. ^ Congrès international d'electrologie et de radiologie médicales. 3d, Milan, 1906
5. ^ "History of Radiation Therapy: The Evolution of Therapeutic Radiology (http://www.rtanswers.com/aboutus/history.aspx) Archiviato (https://web.archive.org/web/20120301041554/http://www.rtanswers.com/aboutus/history.aspx) il 1º marzo 2012 in Internet Archive.". Rtanswers.com. 2010-03-31. Retrieved 2012-04-20.
6. ^ Se si considera l'incidenza media di nuovi pazienti con tumore per anno ogni 100.000 individui nei diversi Paesi (con esclusione dei tumori della cute-non melanomi), e considerando la necessità per questi stessi pazienti di una "copertura terapeutica da Radioterapia" (a scopo radicale, adiuvante, profilattico o palliativo) di circa il 41-61% nel primo approccio (in relazione allo stadio in cui si presentano, nei diversi Paesi, ed in base alla tipologia di presidi di radioterapia ivi presenti), tenendo inoltre conto del fatto che è possibile un ritrattamento (compreso, a seconda della patologia, in un range del 9%-39% circa).
7. ^ *Irradiazione Corporea Totale (TBI)*, su *gemelli-art.it*, Policlinico Agostino Gemelli (archiviato dall'url originale il 10 agosto 2014).
8. ^ *Irradiazione Totale della Pelle (TSI)*, su *gemelli-art.it*, Policlinico Agostino Gemelli (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014).
9. ^ Alcune volte indicato erroneamente con il lemma *rateo di dose*, traduzione scorretta del termine anglosassone *rate*, rapporto, tasso o velocità.

Bibliografia

- R. Corvò, F. Grillo Ruggieri, P. Ricci, *La Radioterapia Oncologica. Ruolo, Indicazioni, Evoluzione Tecnologica*, Genova, Omicron Editrice, 2008. ISBN non esistente

Voci correlate

- Radiazioni ionizzanti
- Cancro (medicina)
- Radionecrosi
- Acceleratore di particelle
- Acceleratore lineare
- Radioterapia intraoperatoria
- Telecobaltoterapia
- Total skin electron beam irradiation
- Chemioterapia
- Lista di anticorpi monoclonali approvati per uso clinico
- Ipertermia oncologica
- Laser - Terapia fotodinamica
- Neuroradiologia delle sequele dei trattamenti antitumorali

Altri progetti

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «**radioterapia**»
- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file sulla **radioterapia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radiation_therapy?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (**EN**) *Radioterapia*, su *Enciclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (**EN**) *Opere riguardanti Radioterapia*, su *Open Library*, Internet Archive.
- *Recupero lesioni croniche nel malato oncologico* (**DOC**), su *snamid.org*. URL consultato il 26 novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 20 febbraio 2009).
- *(Sperimentazione clinica e radioterapia: profilo etico, radioprotezionistico e specialistico)* (**PDF**), su *iss.it*.
- *(Towards evidence-based guidelines for radiotherapy infrastructure and staffing needs in Europe: the ESTRO QUARTS project;ESTRO = European Society for Therapeutic Radiology and Oncology;QUARTS = QUAntification of Radiation Therapy Infrastructure and Staffing Needs)* (**PDF**), su *cancer.iaea.org*.
- *(Accident prevention in radiotherapy,with lessons learned from major radiotherapy accidents including Therac-25 accidents)* (**PDF**), su *biij.org*. URL consultato il 21 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2011).
- *(Quality Assurance in Radiotherapy)* (**PDF**), su *www-naweb.iaea.org*. URL consultato il 21 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 21 maggio 2011).
- *(Protection of the Patient in Radiation Therapy,Abstract)*, su *icrp.org*.
- *ICRU, sito della International Commission on Radiation Units*, su *icru.org*.

- [1] (http://www.unboundmedicine.com/medline/ebm/journal/Radiotherapy_and_oncology) (sito di Unbound MEDLINE results for Radiotherapy and oncology)

Controllo di autorità	Thesaurus BNCF 23636 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=23636) · LCCN (EN) sh00005896 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00005896) · GND (DE) 4057833-1 (https://d-nb.info/gnd/4057833-1) · BNF (FR) cb11941666h (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941666h) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11941666h) · J9U (EN, HE) 987007292717405171 (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007292717405171) (topic) (https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007292717405171) · NDL (EN, JA) 00563532 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00563532)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioterapia&oldid=125366877"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 30 gen 2022 alle 02:56.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

NUOVE PROSPETTIVE

WIKIPEDIA

Radiomica

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Per **radiomica** si intende l'analisi delle immagini mediche volta a ottenere, tramite opportuni metodi matematici e l'uso dei computer, informazioni di tipo *quantitativo* da queste non rilevabili tramite la loro semplice osservazione visiva da parte dell'operatore.[1]

La radiomica nasce per sviluppare strumenti di supporto decisionale e implica la combinazione di dati ricavati dall' *imaging* medicale con altre caratteristiche del paziente, quando disponibili, per aumentare la potenza dei modelli di supporto decisionale. I dati quantitativi estratti dalle immagini possono venir integrati in modelli predittivi multidisciplinari per la gestione del paziente, anche mediante l'utilizzo di metodiche di machine learning e di intelligenza artificiale. In genere le immagini biomediche contengono informazioni che riflettono la fisiopatologia sottostante e queste relazioni possono essere rivelate tramite l'analisi quantitativa dell'immagine. La radiomica comporta la gestione delle immagini mediche digitali sotto forma di grandi matrici di dati con lo scopo di estrarre un elevato numero di caratteristiche morfologiche e predittive mediante algoritmi e metodi più o meno automatici.[1] Queste caratteristiche morfologiche e predittive, possono essere suddivise in diversi gruppi: dimensioni e caratteristiche basate sulla morfologia, descrittori delle relazioni tra i pixel o voxel che compongono l'immagine. Le definizioni matematiche di queste relazioni, chiamate "descrittori", sono indipendenti dalla modalità di imaging. In genere mostrano come i valori numerici presenti all'interno delle immagini siano distribuiti spazialmente all'interno del tessuto studiato.[2][3] Questo tipo di analisi è perciò spesso anche denominata **analisi della tessitura** o **texture analysis**.[4][5] La distribuzione nello spazio dei valori di grigio (a ogni intensità di grigio in un'immagine digitale in bianco e nero corrisponde un valore numerico ben preciso) nelle strutture esaminate con queste tecniche è influenzata da diversi fattori, che dipendono dal tipo di metodica utilizzata per ottenere le immagini. Nelle immagini TC ad esempio l'intensità delle immagini è proporzionale alla radiopacità dei tessuti. La distribuzione nello spazio di questo parametro, all'interno di una lesione tumorale, può essere ad esempio influenzata dalla presenza di necrosi o di calcificazioni; tutti parametri che possono essere correlati con l'aggressività della malattia.

Informazioni di tipo differente possono essere ottenute usando la stessa matematica di base anche analizzando immagini ecografiche[6], di risonanza magnetica[7][8] o ottenute mediante la PET[9] e la SPECT.[10] Mentre le immagini ottenute mediante tecniche di radiodiagnostica hanno come grosso vantaggio l'elevata risoluzione (che consente di campionare tanti voxel o pixel, fornendo un'elevata numerosità nella stima dei descrittori, che sono variabili di tipo statistico), le tecniche medico-nucleari hanno tendenzialmente una migliore risoluzione di contrasto e consentono di studiare più in dettaglio i processi biologici a carico delle lesioni sospette; tuttavia la bassa risoluzione spaziale di queste ultime metodiche può costituire un problema nello studio delle lesioni di piccole dimensioni.

In letteratura e in oncologia, spesso i descrittori ottenuti utilizzando queste tecniche sono stati correlati con l'analisi genetica delle lesioni valutate mediante le immagini prima della loro asportazione; rilevando come in molti casi la differente struttura di queste correli con differenti mutazioni a carico delle cellule tumorali che le costituiscono. Tale approccio è denominato *radiogenomica*.

Indice

La matematica alla base della texture analysis
- Texture di primo ordine
- Texture di ordine superiore
  - Grey Level Co-occurrence Matrix
    - Gruppo del contrasto
    - Descrittori legati all'ordine
    - Descrittori statistici della GLCM
  - Neighborhood Grey-Level Difference Matrix
  - Grey-Level Run Length Matrix
  - Grey-Level Zone Length Matrix
- Texture map

Note

Bibliografia

La matematica alla base della texture analysis

I descrittori delle texture possono essere calcolati a partire dai valori *nativi* delle immagini. In tali casi si parla di *texture di primo ordine* e il calcolo dei vari descrittori è effettuato a partire dall'istogramma che in ascissa presenta i singoli valori di grigio presenti nella regione studiata, mentre in ordinata il numero di volte che questi compaiono in essa. Descrittori che invece analizzano i rapporti fra due o più pixel/voxel dell'immagine sono definiti di *secondo*, *terzo* o di ordini superiori a seconda del numero di elementi presi in considerazione. In questi ultimi casi le immagini non sono analizzate direttamente, ma da queste vengono invece ricavate della matrici che sono poi analizzate usando appositi descrittori.

Texture di primo ordine

Sono ricavate a partire dall'istogramma che descrive la distribuzione dei valori di grigio all'interno della lesione. I descrittori ricavabili sono i seguenti:

- il valore *massimo* di intensità, che corrisponde al valore più alto presente a livello della regione studiata. Tale parametro è quello più comunemente utilizzato in PET clinica (esprimendo l'immagine come una mappa di SUV, cioè Standardized Uptake Value, il cui calcolo è descritto nella relativa voce) ed è espressione, nel caso si utilizzi il fluorodesossiglucosio come radiofarmaco, dell'aggressività delle lesioni, in quanto rappresenta il punto col maggior metabolismo glicidico nella regione esaminata. Tale metabolismo correla direttamente con l'aggressività della malattia. Ha inoltre l'enorme vantaggio di essere l'unico parametro quasi operatore-indipendente, oltre che intuitivo. Come pecca principale ha la sua enorme variabilità. Inoltre non riflette direttamente la struttura interna della lesione studiata.
- Il valore *minimo* di intensità
- Il valore *medio* di intensità, che da un'idea generale del comportamento della lesione
- La deviazione standard delle intensità, che correla con la disomogeneità delle lesioni
- La simmetria, che riflette quanto i valori sono simmetrici nell'istogramma (dividendolo idealmente a metà fra i valori alti e quelli bassi)
- La kurtosi che indica quanto l'istogramma differisce da una distribuzione normale

- L'entropia che indica il grado di disordine nella lesione (aumenta quanto più i valori di grigio sono distribuiti in modo casuale invece che seguendo delle regole).
- L'Energia è un indice di uniformità dell'immagine.

Texture di ordine superiore

I descrittori di questo tipo riflettono relazioni fra elementi vicini. Sono ricavati ottenendo dalle immagini delle matrici che riflettono queste relazioni. Tali matrici di solito non sono ricavate a partire dai valori di grigio nativi, ma questi sono di solito scalati usando un valore minimo e un valore massimo come limiti su cui dividere tutta la scala di grigi, per un numero di intervalli definito. Tale approccio è necessario non solo per ridurre la potenza di calcolo utilizzata nell'elaborazione, ma anche per far studiare l'immagine in modo appropriato. Nelle differenti matrici inoltre il numero di eventi inseriti in ogni cella viene diviso per il numero di eventi totali, in modo che, a ogni coppia di coordinate della matrice, sia associata una probabilità di eventi (che può variare solo da 0 a 1). Questo approccio consente di confrontare fra loro matrici ricavate da dati con differente numerosità campionaria.

Grey Level Co-occurrence Matrix

La **Grey Level Co-occurrence Matrix** (spesso abbreviata in **GLCM**, che si può tradurre in italiano come **Matrice di Co-occorrenza**) è una matrice che riflette le varie frequenze con cui ogni intensità di grigio appare accanto ad altre a una distanza definita (tale distanza è definita *offset*.[11] L'offset è pari a 1 se ci si riferisce all'elemento immediatamente adiacente, mentre è maggiore di 1 se man mano si considerano elementi più distanti). Tale matrice viene calcolata per tutte le direzioni dello spazio 2D o 3D, escludendo quelle contrapposte (in quanto mostrano risultati identici). È possibile poi ricavare i singoli descrittori per ogni singola direzione oppure unendo i dati di tutte. Al bordo dell'immagine ovviamente non è più possibile trovare un elemento adiacente a quello studiato, quindi gli elementi che dovrebbe avere un "compagno" (per l'offset scelto) fuori dall'immagine vengono scartati dall'analisi.

Dalla matrice così ottenuta è possibile ricavare alcuni descrittori:

Gruppo del contrasto

Riflettono la differenza fra coppie di valori. Sono i seguenti:

- *Contrasto* (detto anche *somma delle varianze quadratiche* o *inerzia*). Riflette quanto le coppie di valori differiscono fra loro ed è calcolato facendo la sommatoria dei ogni elemento della matrice moltiplicato per la differenza fra le due coordinate a cui si riferisce l'elemento al quadrato. Questo comporta che solo i valori fuori dalla diagonale che interseca la matrice possono contribuire al risultato (i valori nella diagonale corrispondono a coppie di valori identici, quindi senza contrasto, che portano se presenti il risultato verso lo zero)
- *Dissimilarità*. Riflette quanto le coppie di valori differiscono fra loro ed è calcolata facendo la sommatoria di ogni elemento della matrice moltiplicato per il valore assoluto della differenza fra le due coordinate dell'elemento.
- *Omogeneità*. Si calcola facendo la sommatoria di ogni elemento della matrice diviso per la differenza delle due coordinate al quadrato sommata a uno. Aumenta quanto più le coppie di valori sono simili.

Descrittori legati all'ordine

Riflettono quanto le coppie di valori sono rappresentate in modo ordinato, cioè non disposte casualmente all'interno dell'immagine:

- *Momento angolare* o *ASM*: È la sommatoria dei singoli elementi della matrice elevati al quadrato (aumenta all'aumentare dell'ordine).
- *Energia*: È la radice quadrata del momento angolare (si comporta come il momento angolare e spesso si preferisce a quest'ultimo)
- *Entropia*: È la sommatoria dei singoli elementi della matrice moltiplicati per il logaritmo naturale di loro stessi moltiplicato per -1. Aumenta all'aumentare del disordine fra le coppie di valori.

Descrittori statistici della GLCM

Analizzano come sono distribuite le frequenze di coppie di valori:

- *Media*. È la media di tutti gli elementi della matrice
- *Deviazione standard*. Definisce quanto la frequenza delle coppie di valori è disomogenea nell'immagine
- *Correlazione*. Definisce quanto i valori degli elementi delle coppie siano correlati linearmente fra loro.

Neighborhood Grey-Level Difference Matrix

La **Neighborhood Grey-Level Difference Matrix** (abbreviata in **NGLDM**, traducibile come **Matrice delle differenze dei livelli di grigio nel vicinato** descrive le differenze esistenti fra ogni elemento dell'immagine e quelli immediatamente confinanti (gli 8 elementi attorno a un pixel di un'immagine 2D o i 26 voxel adiacenti a un elemento di un'immagine 3D).[12] Da questa matrice è possibile estrarre 3 descrittori:

- *Grossolanità*. Descrive come variano i cambiamenti di intensità dei grigi nello spazio.
- *Contrasto*. Indica quanto differiscono fra loro i livelli di grigio di regioni vicine.
- *Attività*. È proporzionale alla frequenza spaziale dei cambiamenti di intensità.

Grey-Level Run Length Matrix

La **Grey-Level Run Length Matrix** (abbreviata in **GLRLM** e traducibile come **Matrice della lunghezza delle run dei livelli di grigio**) è creata mettendo in un asse della matrice le differenti intensità di grigio, mentre nell'alto le possibili lunghezze delle "*run*". Per "*run*" si intende la presenza di elementi nell'immagine con la stessa intensità di grigio uno in fila all'altro.[13] Questa matrice riporterà quindi con quale frequenza nell'immagine è possibile osservare "file" di elementi con una certa lunghezza e con una certa intensità; ed è utilizzata di solito per lo studio dei parenchimi. Questa matrice consente di stimare numerosi descrittori:

- *Short-Run Emphasis* e *Long-Run Emphasis* descrivono la presenza nelle immagini di *run* corte o lunghe rispettivamente.
- *Low Gray-level Run Emphasis* e *High Gray-level Run Emphasis* descrivono la presenza nell'immagine di *run* poco o molto intense rispettivamente.
- *Short-Run Low Gray-level Emphasis*, *Short-Run High Gray-level Emphasis*, *Long-Run Low Gray-level Emphasis* e *Long-Run High Gray-level Emphasis* sono combinazioni delle caratteristiche illustrate nei punti precedenti.

- *Gray-Level Non-Uniformity for run* e *Run Length Non-Uniformity* descrivono quanto i valori di grigio nelle *run* e la loro lunghezza sono omogenei.
- *Run Percentage* è un indice di omogeneità delle *run* omogenee.

Grey-Level Zone Length Matrix

La **Grey-Level Zone Length Matrix** (abbreviata in **GLZLM** e traducibile come **Matrice della lunghezza delle zone dei livelli di grigio** è concettualmente simile alla precedente ed è anch'essa progettata per lo studio dei parenchimi. A differenza della GLRLM però non considera la lunghezza delle *run* come riferimento, ma invece studia la numerosità di elementi adiacenti con la stessa intensità di grigio nelle 3 dimensioni.[14] Anche i parametri stimati da questa matrice hanno nomi simili a quella precedente e sono di fatto stimate allo stesso modo:

- *Short-Zone Emphasis* e *Long-Zone Emphasis* stimano la distribuzione degli aggregati piccoli e grandi rispettivamente
- *Low Grey-level Zone Emphasis* e *High Grey-level Zone Emphasis* stimano la distribuzione degli aggregati poco intensi e molto intensi rispettivamente
- *Short-Zone Low Grey-level Emphasis*, *Short-Zone High Grey-level Emphasis*, *Long-Zone Low Grey-level Emphasis* e *Long-Zone High Grey-level Emphasis* sono combinazioni delle caratteristiche illustrate nei punti precedenti.
- *Grey-Level Non-Uniformity for zone* e *Zone Length Non-Uniformity* stimano quanto i valori di grigio negli aggregati e la grandezza di questi sono omogenei
- *Zone Percentage* misura l'omogeneità nelle zone omogenee

Texture map

Gli indicatori sopra descritti, oltre che tramite un approccio VOI-based, possono essere calcolati per ogni voxel dell'immagine considerando per ognuno di questi un Volume di Interesse comprendente anche i voxel intorno entro un certo raggio. Tale volume è detto *kernel*. In questo modo è possibile ottenere immagini parametriche dove per ogni voxel dell'immagine è mostrato il valore "locale" del descrittore scelto, consentendo anche una valutazione *qualitativa* dei dati ottenibili con le metodiche proprie della radiomica. Questo tipo di elaborazione tuttavia richiede molte risorse e tempo-macchina, motivo per cui di solito non è eseguita su tutta l'immagine ma solo su una porzione di essa. Altro importante limite di questo approccio è dato dal diametro del *kernel*; un diametro troppo piccolo infatti restituirà valori dei descrittori molto "rumorosi" e poco affidabili, mentre uno troppo grande ridurrà molto la risoluzione spaziale dell'immagine (dando però anche dati più affidabili e con maggiore risoluzione di contrasto)[15].

Note

1. Philippe Lambin, Emmanuel Rios-Velazquez e Ralph Leijenaar, *Radiomics: Extracting more information from medical images using advanced feature analysis*, in *European journal of cancer (Oxford, England : 1990)*, vol. 48, n. 4, 2012-3, pp. 441–446, DOI:10.1016/j.ejca.2011.11.036. URL consultato il 16 giugno 2018.
2. ^ Virendra Kumar, Yuhua Gu e Satrajit Basu, *QIN "Radiomics: The Process and the Challenges"*, in *Magnetic resonance imaging*, vol. 30, n. 9, 2012-11, pp. 1234–1248, DOI:10.1016/j.mri.2012.06.010. URL consultato il 16 giugno 2018.
3. ^ Robert J. Gillies, Paul E. Kinahan e Hedvig Hricak, *Radiomics: Images Are More than Pictures, They Are Data*, in *Radiology*, vol. 278, n. 2, 2016-2, pp. 563–577, DOI:10.1148/radiol.2015151169. URL consultato il 16 giugno 2018.

4. ^ (EN) M. Amadasun e R. King, *Textural features corresponding to textural properties*, in *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 19, n. 5, 1989, pp. 1264–1274, DOI:10.1109/21.44046. URL consultato il 16 giugno 2018.
5. ^ Depeursinge, Adrien., Al-kadi, Omar S. e Mitchell, J. Ross., *Biomedical texture analysis : fundamentals, tools and challenges*, Academic Press, 2017, ISBN 9780128123218, OCLC 1002195690.
6. ^ Radhika Sivaramakrishna, Kimerly A. Powell e Michael L. Lieber, *Texture analysis of lesions in breast ultrasound images*, in *Computerized Medical Imaging and Graphics: The Official Journal of the Computerized Medical Imaging Society*, vol. 26, n. 5, 2002-9, pp. 303–307. URL consultato il 16 giugno 2018.
7. ^ Sean D. McGarry, Sarah L. Hurrell e Amy L. Kaczmarowski, *Magnetic Resonance Imaging-Based Radiomic Profiles Predict Patient Prognosis in Newly Diagnosed Glioblastoma Before Therapy*, in *Tomography : a journal for imaging research*, vol. 2, n. 3, 2016-9, pp. 223–228, DOI:10.18383/j.tom.2016.00250. URL consultato il 16 giugno 2018.
8. ^ Elizabeth J. Sutton, Erich P. Huang e Karen Drukker, *Breast MRI radiomics: comparison of computer- and human-extracted imaging phenotypes*, in *European Radiology Experimental*, vol. 1, n. 1, 2017, DOI:10.1186/s41747-017-0025-2. URL consultato il 16 giugno 2018.
9. ^ (EN) Gary J. R. Cook, Musib Siddique e Benjamin P. Taylor, *Radiomics in PET: principles and applications*, in *Clinical and Translational Imaging*, vol. 2, n. 3, 2014-06, pp. 269–276, DOI:10.1007/s40336-014-0064-0. URL consultato il 16 giugno 2018.
10. ^ Vishwa Parekh e Michael A. Jacobs, *Radiomics: a new application from established techniques*, in *Expert review of precision medicine and drug development*, vol. 1, n. 2, 2016, pp. 207–226, DOI:10.1080/23808993.2016.1164013. URL consultato il 16 giugno 2018.
11. ^ (EN) Hall-Beyer, Mryka, *GLCM Texture: A Tutorial v. 3.0 March 2017*, 2017-03. URL consultato il 16 giugno 2018.
12. ^ (EN) *Textural features corresponding to textural properties - IEEE Journals & Magazine*, su *ieeexplore.ieee.org*. URL consultato il 16 giugno 2018.
13. ^ Dong-Hui Xu, Arati S Kurani e Jacob Furst, *Run-length encoding for volumetric texture*, in *The 4th IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing*, 1º gennaio 2004. URL consultato il 16 giugno 2018.
14. ^ (EN) *Advanced Statistical Matrices for Texture Characterization: Application to Cell Classification - IEEE Journals & Magazine*, su *ieeexplore.ieee.org*. URL consultato il 16 giugno 2018.
15. ^ LifeX Texture User Guide, pp. 19.

Bibliografia

- https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2018-02-20/radiomica-e-radiogenomica-frontiera-diagnostica-immagini-131403.php?uuid=AEXJzE3D
- (EN) Software gratuito (https://www.lifexsoft.org/) (previa registrazione) per eseguire della radiomica su immagini mediche (all'interno è presente un dettagliato manuale su come sono calcolati i vari descrittori che consente di utilizzare)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiomica&oldid=124897561"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 5 gen 2022 alle 23:01.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

Teranostica

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Per **teranostica**, in senso lato, si intende l'integrazione di un metodo diagnostico con uno specifico intervento terapeutico.[1]Tale definizione, molto ampia, che include numerosi approcci diagnostico-terapeutici (ad esempio la radioterapia guidata dalle immagini, l'uso della PET con FDG per valutare la risposta alle terapie o lo studio dell'espressione di oncogeni su preparati istologici per guidare le terapie a bersaglio molecolare) è però di solito ristretta a quelle tecniche in cui il metodo diagnostico è sviluppato in contemporanea con l'intervento terapeutico oppure è lui stesso tale metodo. Tali metodiche sono storicamente state sviluppate nell'ambito della medicina nucleare; ma le ultime innovazioni nel campo delle nanotecnologie (nanomedicina) stanno permettendo di creare anche mezzi di contrasto con caratteristiche terapeutiche (dando quindi anche al campo della radiodiagnostica un'impronta terapeutica ulteriore a quella della radiologia interventistica).[1][2][3][4]

Indice

Teranostica in ambito medico-nucleare

Teranostica in ambito radiologico

Note

Bibliografia

Teranostica in ambito medico-nucleare

La medicina nucleare è stata la disciplina in cui il termine teranostica è stato coniato; infatti, quando questo termine ancora non esisteva, la prima sostanza utilizzata (ancora oggi) per lo studio diagnostico e il trattamento del tumore della tiroide è stato l'isotopo 131 dello iodio (Terapia radiometabolica del carcinoma tiroideo differenziato). Tuttavia questa disciplina include numerose altre sostanze che sia da sole sia in coppie possono essere usate a tale scopo (molecole marcate con isotopi gamma o positrone emittenti per la diagnostica possono essere marcate anche con isotopi alfa o beta meno emittenti per la terapia). Tali sostanze possono essere dei ligandi di recettori presenti sul bersaglio da trattare o sostanze, come lo iodio, che sono internalizzate dal bersaglio tramite processi metabolici. Mediante questi meccanismi è quindi possibile sia localizzare i tessuti patologici con le immagini sia distruggerli con dosi elevate e mirate di radiazioni.

Teranostica in ambito radiologico

Sebbene non siano ancora in uso clinico, sono ormai da anni in sviluppo numerosi mezzi di contrasto che possiedono anche proprietà terapeutiche. Ad esempio tali preparati sono progettati per rilasciare localmente, a livello del bersaglio visualizzato con le immagini e in risposta a uno stimolo fornito dall'operatore, un chemioterapico normalmente somministrato per via sistemica. Tale approccio in teoria dovrebbe aumentare l'efficacia del trattamento e ridurne gli effetti collaterali. Mezzi di contrasto di questo tipo sono stati sviluppati ad esempio per l'ecografia e sono costituiti da microbolle, che, accumulandosi nei tessuti

ipervascolarizzati e rompendosi a contatto con l'onda sonora prodotta dall'ecografo rilasciano il principio attivo solo nella zona scelta dall'ecografista. Un altro approccio consiste invece nel legare degli anticorpi monoclonali (anche in grado di colpire diversi bersagli molecolari) a una nanoparticella. In questo modo da un lato si riesce ad aumentare l'affinità e la specificità del farmaco verso il bersaglio e dall'altro a visualizzare la zona colpita dal trattamento (ad esempio utilizzando particelle di ossidi di ferro con proprietà *superparamagnetiche* che possono essere rilevate mediante l'imaging a risonanza magnetica). Tali particelle poi possono essere anche progettate per rilasciare un chemioterapico solo nella zona in cui si legano, producendo anche un effetto sinergico locale con l'azione degli anticorpi. L'integrazione di queste metodiche con quelle medico-nucleari (che producono immagini con una maggiore sensibilità) può aiutare a individuare i bersagli e a monitorare i trattamenti.

Note

1. *Peter Dobson: Theranostic, a combination of diagnostics and therapy* (**PDF**), su *ema.europa.eu*.
2. **^** Joseph Lau, Kuo-Shyan Lin e François Bénard, *Past, Present, and Future: Development of Theranostic Agents Targeting Carbonic Anhydrase IX*, in *Theranostics*, vol. 7, n. 17, 26 settembre 2017, pp. 4322–4339, DOI:10.7150/thno.21848. URL consultato il 22 giugno 2018.
3. **^** Jin Xie, Seulki Lee e Xiaoyuan Chen, *Nanoparticle-based theranostic agents*, in *Advanced drug delivery reviews*, vol. 62, n. 11, 30 agosto 2010, pp. 1064–1079, DOI:10.1016/j.addr.2010.07.009. URL consultato il 22 giugno 2018.
4. **^** *Emanuele Neri, Radiologia Diagnostica e Interventistica Università di Pisa: Teranostica e radiologia* (**PDF**), su *storage.mzcongressi.com*. URL consultato il 22 giugno 2018 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2018).

Bibliografia

- (**EN**) Review (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17420716%7C) sulla teranostica in ambito medico-nucleare
- (**EN**) Review (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18373419%7C) sulla teranostica in radiodiagnostica

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teranostica&oldid=105976744"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 24 giu 2019 alle 01:28.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.